

**Zeitschrift:** Entomologica Basiliensia  
**Herausgeber:** Naturhistorisches Museum Basel, Entomologische Sammlungen  
**Band:** 3 (1978)

**Artikel:** Materiali per una revisione dei Leptothorax neotropicali appartenenti al sottogenere Macromischa Roger, n. comb. (Hymenoptera: Formicidae)  
**Autor:** Urbani, C. Baroni  
**Kapitel:** Indice  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-980702>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 01.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Indice

Nell'indice seguente sono elencati tutti i nomi specifici di Formicidi citati nel testo. Sono invece esclusi tutti i nomi sopraspecifici, i nomi di piante ospiti e quelli di altri organismi saltuariamente citati nel testo. I sinonimi sono citati in *corsivo*. Le pagine in cui si trova la descrizione particolareggiata di un taxon sono citate in **grassetto**.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| acervorum Fabricius           | 399, 556; Fig. 13   |
| aculeata Mayr                 | 557   |
| aculeatum Mayr                | 402, 405, 557   |
| <i>affinis</i> Mann           | 501   |
| affinis Mayr                  | 501   |
| africana Mayr                 | 557   |
| africanum Mayr                | 557   |
| aguayoi Wheeler               | <b>409, 410, 411, 428, 429, 500, 501, 534, 546, 549;</b><br>Fig. 22, 76, 160, 171, 183, 199, 205, 220 |
| alayoi Baroni Urbani          | <b>411, 412, 536; Fig. 26, 83</b>   |
| albispina Wheeler             | <b>413, 414, 434, 460, 483, 542, 544, 552; Fig. 68, 108,</b><br>150                                   |
| allardycei Mann               | 397, 399, 415, 416, 422, 522, 532, 540, 551; Fig. 9, 62,<br>98, 416                                   |
| <i>androsana</i> Wheeler      | 416   |
| androsanus Wheeler            | 416, 420, 541, 545, 547, 550, 552; Fig. 70, 112, 114,<br>163, 166, 189, 206, 218                      |
| anemicus Baroni Urbani        | 420, 421, 534, 549  |
| <i>annectens</i> Wheeler      | 399   |
| annectens Wheeler             | 421   |
| annexus Baroni Urbani         | 397, 399, 401, 421, 422, 470, 539, 551; Fig. 5, 47, 128   |
| <i>archeri</i> Wheeler        | 409, 410, 411, 428  |
| <i>atrinodis</i> Mann         | 508, 512  |
| augusti Baroni Urbani         | 399, 401, 423, 443, 460, 538, 541, 544, 552; Fig. 7, 57,<br>101, 138                                  |
| <i>azteca</i> Wheeler         | 425   |
| aztecus Wheeler               | 422, 425, 427, 470, 538, 544, 546, 551; Fig. 46, 127,<br>145, 162, 167, 180, 192, 200, 214            |
| barbouri Aguayo               | 427, 428, 512, 537, 549; Fig. 34, 81  |
| barroi Aguayo                 | 428, 500, 501, 534, 549   |
| bermudezi Wheeler             | 420, 421, 429, 430, 534, 549; Fig. 23, 118  |
| beyrichi Mayr                 | 557   |
| <i>bierigi</i> Santschi       | 409, 410  |
| <i>brasiliensis</i> Borgmeier | 557   |
| bruneri Mann                  | 431, 440, 441, 470, 540, 551; Fig. 51, 95   |
| <i>brunneipes</i> Wheeler     | 496   |
| bucheti Santschi              | 399; Fig. 6   |
| <i>chloana</i> Wheeler        | 439, 440, 441   |
| ciferrii Menozzi e Russo      | 414, 433, 434, 442, 452, 483, 520, 541, 552; Fig. 69,<br>115  |
| colettae Santschi             | 556   |
| creightoni Mann               | 402, 434, 436, 512, 537, 544, 549; Fig. 31, 78, 136   |
| creolus Baroni Urbani         | 437, 438, 538; Fig. 44, 94  |
| cressoni André                | 558   |
| <i>culebrensis</i> Wheeler    | 414   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>curvispinosus</i> Mayr           | 556   |
| <i>darlingtoni</i> Wheeler          | 438, 445, 470, 477, 508, 536, 549; Fig. 35, 84  |
| <i>darlingtoni</i> Wheeler          | 470   |
| <i>dissimilis</i> Aguayo            | 431, 439, 440, 441, 539, 551; Fig. 45, 129  |
| <i>finzii</i> Menozzi               | 556   |
| <i>flavidula</i> Wheeler e Mann     | 441   |
| <i>flavidulus</i> Wheeler e Mann    | 441, 452, 541, 544, 522; Fig. 72, 105, 151  |
| <i>flavitaris</i> Mann              | 401, 512, 513, 516  |
| <i>floridana</i> Wheeler            | 415   |
| <i>foridanus</i> Wheeler            | 415, 416  |
| <i>foreli</i> Aguayo                | 423   |
| <i>foreli</i> Santschi              | 423   |
| <i>fuscata</i> Mann                 | 422   |
| <i>fuscatus</i> Mann                | 442, 539, 551; Fig. 53, 93  |
| <i>gibbifer</i> Baroni Urbani       | 444, 445, 538, 550; Fig. 56, 132  |
| <i>goesswaldi</i> Kutter            | 556   |
| <i>goniops</i> Baroni Urbani        | 445, 446, 521, 542, 552; Fig. 65, 110   |
| <i>gracilis</i> Aguayo              | 420   |
| <i>gracilis</i> Mayr                | 420   |
| <i>gundlachi</i> Wheeler            | 401, 446, 447, 500, 534, 549; Fig. 20, 77   |
| <i>haytiana</i> Wheeler e Mann      | 490, 493, 494   |
| <i>hispaniolae</i> Baroni Urbani    | 398, 448, 451, 539, 545, 547, 551; Fig. 50, 97, 135, 155, 173, 186, 196, 201, 211                               |
| <i>huehuetenangoi</i> Baroni Urbani | 451, 542, 552; Fig. 64, 106   |
| <i>hyperisabellae</i> Baroni Urbani | 453, 454, 459, 537, 548, 549; Fig. 38, 88   |
| <i>imitatrix</i> Wheeler            | 431, 432  |
| <i>iris</i> Roger                   | 454, 456, 534, 549; Fig. 19, 75   |
| <i>isabellae</i> Wheeler            | 404, 438, 453, 454, 456, 459, 465, 470, 504, 537, 543, 546, 548, 549; Fig. 39, 87, 157, 170, 181, 188, 207, 216 |
| <i>ixili</i> Baroni Urbani          | 425, 459, 460, 541, 552; Fig. 67, 111   |
| <i>jaumei</i> Santschi              | 480, 481  |
| <i>kutteri</i> Buschinger           | 556   |
| <i>laeta</i> Wheeler                | 501, 502  |
| <i>laevissima</i> Wheeler           | 512, 513, 516   |
| <i>latispina</i> Wheeler            | 480, 481  |
| <i>laurae</i> Emery                 | 556   |
| <i>leucacanthus</i> Baroni Urbani   | 460, 462, 542, 543, 552; Fig. 61, 103, 149  |
| <i>longinoda</i> Latreille          | 402, 403; Fig. 15   |
| <i>longipilosus</i> Santschi        | 399; Fig. 12  |
| <i>longispinosus</i> Roger          | 399; Fig. 11  |
| <i>lucayensis</i> Forel             | 471, 474, 475   |
| <i>luciliae</i> Mann                | 512, 516  |
| <i>lugens</i> Roger                 | 407, 423, 424, 425, 426   |
| <i>maerens</i> Wheeler              | 501, 502  |
| <i>manni</i> Wheeler                | 530   |
| <i>manni</i> Wheeler                | 530   |
| <i>maya</i> Wheeler                 | 425, 427  |
| <i>megalops</i> Hamann e Klemm      | 556   |
| <i>melanocephala</i> Wheeler        | 467   |
| <i>melanocephalus</i> Emery         | 467   |
| <i>monardi</i> Santschi             | 405   |
| <i>mortoni</i> Aguayo               | 462, 463, 464, 505, 535; Fig. 29, 126   |
| <i>mutabilis</i> Wheeler            | 429, 430, 431   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>mutica</i> Smith            | 464   |
| <i>muticus</i> Smith           | 459, 464, 533, 548, 549; Fig. 40, 86  |
| <i>myersi</i> Wheeler          | 399, 400, 402, 403, 412, 465, 466, 488, 531, 537, 549;<br>Fig. 2, 14, 15, 25, 122   |
| <i>natenzoni</i> Aguayo        | 409, 410, 411   |
| <i>nigra</i> Santschi          | 523, 525  |
| <i>nigricans</i> Baroni Urbani | 414, 467, 541, 543, 552; Fig. 66, 129, 148  |
| <i>nigrinodis</i> Mann         | 512   |
| <i>nigripes</i> Santschi       | 454, 455  |
| <i>nigronodis</i> Mann         | 512   |
| <i>obscurior</i> Forel         | 495   |
| <i>ocarinae</i> Baroni Urbani  | 469, 470, 538, 551; Fig. 58, 131  |
| <i>opaciceps</i> Wheeler       | 470   |
| <i>opacinoda</i> Wheeler       | 490, 493, 494   |
| <i>opalina</i> Wheeler         | 470   |
| <i>opalinus</i> Wheeler        | 470, 536, 549   |
| <i>ornatipes</i> Wheeler       | 431, 432  |
| <i>pallipes</i> Wheeler        | 413, 414, 434   |
| <i>pastinifer</i> Emery        | 398, 420, 470, 474, 475, 499, 532, 537, 543, 546, 550;<br>Fig. 42, 116, 142, 161, 168, 179, 190, 211, 222                             |
| <i>pastinifera</i> Emery       | 398, 470, 471   |
| <i>pastoris</i> Baroni Urbani  | 475, 476, 499, 537, 550   |
| <i>petiolata</i> Forel         | 406, 423  |
| <i>petiolata</i> Mayr          | 423, 558  |
| <i>petiolatus</i> Forel        | 399, 401, 423   |
| <i>petri</i> Aguayo            | 527, 528, 530   |
| <i>platycnemis</i> Wheeler     | 476, 477, 536; Fig. 32, 79  |
| <i>poeyi</i> Wheeler           | 430, 477, 489, 534, 549; Fig. 18  |
| <i>polita</i> Smith            | 478   |
| <i>politus</i> Smith           | 478, 479, 541, 552; Fig. 54, 104  |
| <i>porphyritis</i> Roger       | 401, 404, 407, 464, 466, 480, 481, 488, 531, 535;<br>Fig. 27, 125   |
| <i>porphyritis</i> Roger       | 530   |
| <i>procera</i> Emery           | 558   |
| <i>proxima</i> Wheeler         | 431, 432  |
| <i>pulchella</i> Emery         | 482   |
| <i>pulchellus</i> Emery        | 398, 420, 482, 483, 484, 518, 531, 542, 545, 550, 551,<br>552; Fig. 73, 113, 143  |
| <i>punicans</i> Roger          | 398, 407, 484, 485, 533, 548; Fig. 16, 26, 117  |
| <i>purpurata</i> Roger         | 398, 399  |
| <i>purpuratus</i> Roger        | 399, 412, 481, 486, 488, 536, 543, 548, 550; Fig. 1, 30,<br>124, 141  |
| <i>rottenbergii</i> Emery      | 397, 399, 406, 588; Fig. 8  |
| <i>rudis</i> Mayr              | 558   |
| <i>rufithorax</i> Wheeler      | 454, 455, 456   |
| <i>rugeinodis</i> Mann         | 512   |
| <i>rugiceps</i> Wheeler        | 430, 478, 489, 534, 549; Fig. 119   |
| <i>rugosostriata</i> Mayr      | 406, 558  |
| <i>rugosostriatus</i> Mayr     | 558   |
| <i>russula</i> Nylander        | 489   |
| <i>sallei</i> Guérin           | 398, 401, 404, 405, 427, 451, 470, 489, 490, 493, 494,<br>538, 544, 547, 550, 551; Fig. 48, 130, 134, 156, 174,<br>186, 191, 203, 221 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>salvini</i> Forel               | 397, 399, 443, 494, 495, 505, 538, 539, 551; Fig. 3, 52, 92  |
| <i>scabripes</i> Mann              | 496, 527, 535, 536, 549, 550; Fig. 37  |
| <i>scandens</i> Mann               | 558  |
| <i>schwarzi</i> Mann               | 497, 499, 537, 545, 550; Fig. 43, 90, 146  |
| <i>schwebeli</i> Forel             | 399; Fig. 10   |
| <i>senectutis</i> Baroni Urbani    | 499, 500, 534, 549; Fig. 24, 121   |
| <i>similis</i> Baroni Urbani       | 501, 522, 523, 540, 551; Fig. 49, 96   |
| <i>skwarrae</i> Wheeler            | 399, 401, 495, 503, 504, 505, 539, 545, 551; Fig. 4, 55, 91, 140   |
| <i>smithi</i> Baroni Urbani        | 557  |
| <i>splendens</i> Wheeler           | 404, 439, 445, 477, 496, 505, 508, 527, 535, 536, 545, 547, 549, 550; Fig. 36, 85, 133, 150, 175, 187, 197, 208, 217           |
| <i>squamifer</i> Roger             | 427, 428, 436, 508, 527, 537, 544, 547, 549; Fig. 33, 82, 137, 154, 176, 178, 125, 209, 215                                    |
| <i>squamifera</i> Roger            | 398, 508, 512, 550   |
| <i>subditiva</i> Wheeler           | 512  |
| <i>subditivus</i> Wheeler          | 397, 401, 512, 515, 516, 518, 540, 545, 547, 552; Fig. 60, 100, 147, 164, 165, 185, 193, 204, 219                              |
| <i>tenuisculptus</i> Baroni Urbani | 462, 479, 517, 518, 542, 552; Fig. 59, 99  |
| <i>terricola</i> Mann              | 400, 518   |
| <i>terricolus</i> Mann             | 434, 483, 518, 542, 545, 552; Fig. 74, 114, 152  |
| <i>torrei</i> Aguayo               | 446, 468, 483, 520, 542, 552; Fig. 71, 107   |
| <i>totonicapani</i> Baroni Urbani  | 521, 540, 551; Fig. 64, 102  |
| <i>tristis</i> Wheeler             | 454, 455, 456  |
| <i>tunetina</i> Santschi           | 399; Fig. 6  |
| <i>umbratipes</i> Wheeler          | 522, 523, 540, 551   |
| <i>versicolor</i> Roger            | 407, 478, 523, 525, 526, 534, 543, 546, 548, 549; Fig. 17, 120, 153, 169, 182, 198, 202, 223                                   |
| <i>villarensis</i> Aguayo          | 531  |
| <i>violacea</i> Mann               | 526  |
| <i>violaceus</i> Mann              | 445, 526, 537, 549; Fig. 41, 89  |
| <i>wheeleri</i> Mann               | 398, 404, 409, 410, 411, 447, 500, 501, 527, 530, 534, 544, 547, 548, 549, 557; Fig. 21, 80, 139, 159, 172, 177, 194, 210, 213 |
| <i>wheeleri</i> Smith              | 557  |
| <i>williami</i> Baroni Urbani      | 466, 530, 531, 535, 543; Fig. 28, 123  |

Indirizzo dell'autore:

Dr. C. Baroni Urbani, Naturhistorisches Museum  
Augustinergasse 2, CH-4051 Basel