Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel

Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel

Band: 16 (1966)

Heft: 4-6

Artikel: Coenonympha oedippus Fabricius : sous-espèce senonica Varin nova

dans le département du Loiret (France)

Autor: Varin, G.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1042798

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

COENONYMPHA OEDIPPUS FABRICIUS, SOUS-ESPECE SENONICA VARIN NOVA DANS LE DEPARTEMENT DU LOIRET (FRANCE)

G. Varin

Dans le Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse, No de janvier-février 1965, page 16, notre collègue Monsieur VARLET, de La Flèche (Sarthe) a publié une note de chasse sur C. oedippus Fabr., espèce qu'il avait capturée en compagnie de nos collègues, Messieurs RAYNAL, d'Issyles-Moulineaux, et COQUELET, de la Flèche (Sarthe), à la limite des communes de Corbeilles-en-Gâtinais et de Sceaux-du-Gâtinais dans le département du Loiret.

C'est Monsieur RAYNAL qui m'avait communiqué, il y a une douzaine d'années, les renseignements qui me permirent d'obtenir de nombreux C. oedippus Fabr. de Serrières-de-Chautagne en Savoie, près du Rhône, et de décrire cette population sous le nom de sous-espèce <u>rhodanica (Bull.</u> Soc. Linn. de Lyon, No 3, mars 1963). Il eut ensuite l'idée de repérer sur la carte d'état-major l'emplacement des prairies marécageuses du Loiret, et c'est ainsi que fut découverte la localité de ce département, très éloignée des autres localités françaises où vole C. oedippus Fabr.

Dans la revue L'Amateur de Papillons, Vol. I, juin 1922, CHRETIEN signalait qu'en 1829, DUPONCHEL avait capturé C. oedippus Fabr. en abondance dans un bois marécageux dépendant des propriétés de Monsieur RIPPERT situées dans le Loiret. Il y a une centaine d'années, BERCE dans son Catalogue et MAURICE SAND dans son Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne signalaient cette espèce de la Sologne et de Beaugency (Loiret). LEON LHOMME dans le Catalogue des Lépidoptères français confirme ces renseignements, qui semblent tous avoir la même origine. Mais ces localités n'ont plus été confirmées depuis longtemps par aucune capture. Un exemplaire femelle de C. oedippus Fabra enfin été pris, il y a une vingtaine d'années, par notre collègue, Monsieur BERNARDI, dans une prairie marécageuse près de Marlotte au sud de la Forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne.

Des recherches opérées par moi-même entre-temps dans les prairies marécageuses bordant le Loing n'ont donné aucun résultat positif, ce qui ne signifie pas qu'oedippus Fabr. n'y vole pas.

Monsieur FAILLIE, de la Flèche, qui s'interesse également aux <u>C. oedip-pus Fabr.</u>, m'envoya un certain nombre d'exemplaires de cette espèce récoltés sur le territoire environnant Corbeilles-en-Gâtinais dans le Loiret provenant des collections VARLET, RAYNAL, COQUELET et de la sienne, capturés en 1961, 1962 et 1964, afin que je puisse en observer les caractères comparativement aux exemplaires des sous-espèces que j'ai déjà décrites:

des Deux-Sèvres et d'une partie de la Charente-Maritime, aquitanica de la Charente, l'autre partie de la Charente-Mari-

time, Gironde, Landes et Basses-Pyrénées,

herbuloti de l'Isère et

rhodanica de la Savoie et de l'Ain.

C. oedippus a été décrit par FABRICIUS de Russie méridionale en 1787 (Mantissa Insectorum V. 8). Les C. œdippus Fabr. de Russie sont d'une teinte brun-noir sur le dessus des ailes chez les males, et plus clair chez les femelles, avec les dessous ocre vif dans les deux sexes.

Si l'on examine une série de <u>C. oedippus Fabr.</u> du Loiret et la compare avec les spécimens des quatre sous-espèces ci-dessus, on constate qu'ils diffèrent nettement de ces derniers. Tout d'abord, les exemplaires du Loiret sont d'une envergure plus petite que celle des autres formes françaises connues; par leurs caractères extérieurs, ils se rapprochent de la ssp. rhodanica.

Description de la nouvelle forme:

MALE: Envergure de l'aile antérieure (de la base de l'aile à l'apex):
18,5 mm environ. Dessus des ailes brun-noir, dessous des ailes variant du gris sombre à l'ocre foncé, toujours semé d'atomes gris. Au revers des ailes antérieures, le nombre d'ocelles est très variable; ils manquent assez souvent. Au revers des ailes postérieures, les ocelles de la bordure marginale ne sont pas séparés, mais soudés et souvent très largement réunis par le cercle qui les entoure.

FEMELLE: Envergure de l'aile antérieure: 19,5 mm. Fonds des ailes, dessus comme dessous, de même couleur que chez le mâle, mais d'une teinte plus claire. Au revers des ailes antérieures, le nombre des ocelles varie de trois à cinq; aux postérieures, les ocelles sont soudés ensemble. La bande argentée située au-dessus de la rangée de ces ocelles est plus ou moins large; parfois il n'en reste que des traces.

En raison des caractères qui les différencient des autres sous-espèces européennes, je donne aux populations de <u>C. oedippus Fabr.</u> du Loiret le nom de

sous-espèce senonica Varin nova

ce nom rappelant celui des Senons qui furent les anciens habitants de la région qui nous intéresse.

Holotype male: Corbeilles/Sceaux du Gâtinais (Loiret), 21.6.61.

Dans ma collection, leg. VARLET.

Allotype femelle: Corbeilles/Sceaux du Gâtinais (Loiret), 21.6.61.

Dans ma collection, leg. VARLET.

Paratypes males et femelles: 1961-62 et 63: Corbeilles/Sceaux du Gatinais (Loiret), dans les coll. VARLET, RAYNAL, FAILLIE, COQUELET et la mienne.

Adresse de l'auteur: G. Varin

39-Vernantois
Jura France

Zusammenfassung

Der Autor beschreibt eine neue französische Unterart von <u>Coenonympha oedippus Fab.</u>: <u>ssp. senonica Varin nova</u> aus dem Département Loiret, und erwähnt die 4 anderen Arten, die er aus Frankreich schon beschrieben hat.