

# Ergänzungen zur Grossschmetterlingsfauna des Naturresevates "Marchauen" bei Marchegg (Niederösterreich)

Autor(en): **Cleve, K.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **25 (1975)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1042469>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ERGAENZUNGEN ZUR GROSSCHMETTERLINGSF AUNA DES NATURRE-  
SERVATES "MARCHAUE N" BEI MARCHEGG (Niederösterreich) \*)

K. Cleve

Durch die erneute freundliche Vermittlung von Herrn Dr. KASY ermöglichte mir der österreichische Stifterverband für Naturschutz, auch im Jahre 1974 in dem dem World Wild-Life Fund anteilig gehörenden Naturreservat "Marchauen" weitere Schmetterlingsbeobachtungen durchzuführen, wofür an dieser Stelle vielmals gedankt sei.

Mein Sohn Karl-Heinz konnte mich auch diesmal dabei unterstützen. Bezüglich der örtlichen Gegebenheiten ist auf die Hauptarbeit zu verweisen. Im Jahre 1974 wurde das Naturreservat vom 1. bis 2. April und vom 2. bis 16. August aufgesucht. Da sich die Beobachtungen alle im Jahre 1974 abspielten, wurde nachstehend diese Jahreszahl fortgelassen.

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

FW: FORSTER-WOHLFAHRT; vor der Nr. aus "Schmetterlinge Mitteleuropas"

K: KOCH; vor der Nr. aus Band IV "Spanner"

L2: Leuchtstelle 2, am Deich bei Marchegg gegenüber der Schlosswiese

L3: Leuchtstelle 3, Marchau, 1 km westlich von Marchegg. Im Wald

L4: Leuchtstelle 4, Waldrand an der Wehrwiese, 3 km NNW von Marchegg

L-D: Leuchtstelle am Deich auf der anderen Seite der Wehrwiese

L-S: Laternen vor Schloss Marchegg

M: Marchauen

N: Nani-Au

Bisher waren 335 Grossschmetterlingsarten aus dem Naturreservat "Marchauen" mitgeteilt worden. In den nachstehenden Ergänzungen werden weitere 66 Arten hinzugefügt. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Arten auf 401 an. Soweit nachstehend keine Angabe über die Häufigkeit gemacht wird, handelt es sich um Einzelbeobachtungen.

Die 66 neu festgestellten Arten verteilen sich wie folgt:

A Tagfalter (Diurna): Bisher 42 Arten, nunmehr 47 Arten

336. (FW: 2) Iphiclides podalirius L. Segelfalter 3.8. N SO-Rand

337. (FW: 17) Anthocaris cardamines L. Aurorafalter 2.4. N mehrfach

338. (FW: 71) Minois dryas Scop. 3.8. M: Deich b. Marchegg, N: Südrand

339. (FW: 100) Inachis io L. Tagpfauenauge 2.4. N mehrfach

340. (FW: 208) Carcharodus alceae Esp. 5.8. M "Spielmais" 2mal

B Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphingides): Bisher 66 Arten, nunmehr 79 Arten

341. (FW: 257) Lymantria dispar L. 5.8. ♂ am Tag, 16.8. ♂ L-D

342. (FW: 270) Eilema pygmaeola Dbld. ssp. pallifrons Z. 2.8. L3

343. (FW: 271) Eilema lutarella L. 16.8. L-D

344. (FW: 310) Panaxia quadripunctaria L. 16.8. L-D

345. (FW: 329) Thaumatopoea processionea L. 14.8. L4 3mal

346. (FW: 344) Drymonia ruficornis Hufn. (chaonia Hbn.) Von der im Mai/Juni fliegenden Art wurde am 14.8. ein vertrocknetes Exemplar im Spinnenweb einer Fensternische bei Schloss Marchegg gefunden.

\*) Vgl. diese Mitteilungen N.F./24. Jahrgang (1974), Nr. 2, S. 37-52.

347. (FW: 365) Clostera curtula L. Erpelschwanz 1.4. L2, 5.8. L-S  
 348. (FW: 396) Zygaena filipendulae L. 3.8. Deich westlich Marchegg  
 WOLFSBERGER det.  
 349. (FW: 431) Tethea duplaris L. 14.8. L4 2mal  
 350. (FW: 458) Trichiura crataegi L. Weissdornspinner 6.8. L4  
 351. (FW: 467) Pachygastris trifolii Schiff. Kleespinner 14.8. L4 3mal  
 352. (FW: 469) Philudoria potatoria L. Grasglucke 2. bis 14.8. L3 und  
 L4 10mal  
 353. (FW: 633) Hepialus sylvina L. 14. und 16.8. L4 und L-D 4mal

C Eulen (Noctuidae): Bisher 127 Arten, nunmehr 156 Arten

354. (FW: 648) Euxoa aquilina Schiff. 5. und 6.8. L-S und L4 je 1mal  
 355. (FW: 701a) Noctua interposita Hbn. 14.8. L4 Schon BOURSIN gab  
 "Baumgarten" als Fundort dieser Art an (Z. Wiener Ent.  
 Ges., Bd. 74, 1963, S. 201).  
 356. (FW: 702) Noctua comes Hbn. (ohne Costalfleck) 2.8. Bei L3 am  
 Köder  
 357. (FW: 744) Naenia typica L. 14.8. L4  
 358. (FW: 770) Mamestra brassicae L. 6.8. L4, 16.8. L-D  
 359. (FW: 784) Hadena rivularis F. (cucubali Schiff.) 2.8. L3  
 360. (FW: 810) Xylomiges conspicillaris L., f. melaleuca View. 1.4. L2  
 361. (FW: 817) Orthosia gracilis Schiff. 1. und 2.4. L2 3mal  
 362. (FW: 818) Orthosia stabilis Schiff. 1.4. L2 2mal  
 363. (FW: 819) Orthosia incerta Hufn. 1.4. L2 4mal  
 364. (FW: 821) Orthosia gothica L. 1. und 2.4. L2 20mal  
 365. (FW: 853) Amphipyra pyramidea L. 14.8. bei L4 ca. 10mal am Kö-  
 der. 2 ♂♂ von M. GERSTBERGER, Berlin, genital be-  
 stimmt.  
 366. (FW: 853a) Amphipyra berbera Rungs 14.8. bei L4 ca. 6mal am  
 Köder. 1 ♂ und 2 ♀♀ von M. GERSTBERGER, Berlin,  
 genital bestimmt. Da nur Exemplare mit kräftigen Ring-  
 makeln gefangen wurden, ist der Anteil von berbera  
 gegenüber pyramidea bei den gefangenen Tieren vermut-  
 lich höher, als es dem wahren Verhältnis entspricht.  
Amphip. berbera wurde erst 1968 als in Mitteleuropa  
 vorkommend erkannt (vgl. URBAHN, Ent. Nachr., Bd.  
 12, 1968, S. 97-102).  
 367. (FW: 857) Amphipyra tragopoginis Cl. 2. bis 14.8. bei L3 und L4  
 18mal am Köder  
 368. (FW: 862) Thalpophila matura Hufn. 6.8. L-S  
 369. (FW: 907) Apamea ophiogramma Esp. 2.8. L3  
 370. (FW: 913) Miana furuncula Schiff. (bicoloria Vill.) 16.8. L-D  
 371. (FW: 937) Hydraecia micacea Esp. 2.8. L-S  
 372. (FW: 978) Athetis lenta Tr. (furvula Hb.) 2.8. L3 2mal WOLFS-  
 BERGER det. Südliche Art, die hier etwa die Nord-  
 grenze ihrer Verbreitung erreicht.  
 373. (FW: 1085) Conistra vaccinii L. 1.4. L2 je 1mal am Licht und Kö-  
 der  
 374. (FW: 1133) Euthales (Bryophila) algae F. 14.8. L4 2mal  
 375. (FW: 1149) Arsilonche albovenosa Goeze 14.8. L-S  
 376. (FW: 1150) Subacronicta megacephala Schiff. 2. bis 14.8. L3 und  
 L4 5mal  
 377. (FW: 1157) Hyboma (Acronycta) strigosa Schiff. 2.8. L3  
 378. (FW: 1159) Pharetra auricoma Schiff. 6. und 14.8. L4 4mal

379. (FW: 1163) Craniophora ligustri Schiff. 2. und 6.8. L3 und L4  
9mal; darunter 1 Stammform, 2 Uebergangsformen und  
4 f. nigra Tutt.
380. (FW: 1229) Catocala nupta L. Rotes Ordensband. 2. bis 14.8. Bei  
L3 und L4, 30mal am Köder
381. (FW: 1281) Zanclognatha grisealis Schiff. 2.8. L3
382. (FW: 1288) Hypena rostralis L. 14.8. Bei L4 am Köder

D Spanner (Geometridae): Bisher 100 Arten, nunmehr 119 Arten

383. (K: 12) Chlorissa viridata L. 8.6.1973 L4 URBAHN det.
384. (K: 29) Cosymbia punctaria L. 2. und 14.8. L3 und L4 5mal
385. (K: 55) Sterrha muricata Hufn. 2. und 5.8. L3 und L-S 3mal
386. (K: 81) Ortholita chenopodiata L. (limitata Scop.) 2.8. L3 3mal,  
3.8. N am Tage
387. (K: 99) Nothopteryx carpinata Bkh. 1.4. L2
388. (K:115) Lygris testata L. N 3.8. am Tage. Auf feuchter, moori-  
ger Wiese
389. (K:140) Cidaria designata Hufn. 2.8. L3 5mal
390. (K:189) Cidaria lugdunaria H. -S. 6.8. L4
391. (K:207) Asthenes anseraria H. -S. 14.8. L4 2. Generation
392. (K:228) Eupithecia centaureata Schiff. (oblongata Thnbg) 2. bis  
6.8. L3, L4 und L-S je 1mal
393. (K:245) Eupithecia icterata Vill. (subfulvata Haw.) 2.8. L3
394. (K:274) Anticollix sparsata Tr. 2.8. L3
395. (K:278) Horisme tersata Schiff. 5.8. L-S
396. (K:294) Anagoga pulveraria L. 2. und 6.8. L3 und L4 10mal
397. (K:299) Ennomos autumnaria Wernbg. 16.8. L-S
398. (K:304) Selenia bilunaria Esp. 1.4. L2 2mal, 2.8. L3
399. (K:315) Plagodis dolabraria L. 2.8. L3
400. (K:342) Erannis marginaria Bkh. 1.4. L2
401. (K:348) Lycia hirtaria Cl. 1.4. L-S, 2.4. L2

Bezüglich des Auftretens verdunkelter Formen wurde 1974 festgestellt:  
Tethea or Schiff., die Nr 92 der Hauptarbeit, wurde in 1 Stammform, 5  
Uebergangsformen und 12 f. albingensis Warn. beobachtet. Die vorstehen-  
de Nr. 379, Craniophora ligustri Schiff., trat in 1 Stammform, 2 Ueber-  
gangsformen und 4 f. nigra Tutt. auf.

Adresse des Verfassers:

Dr. Carl Cleve  
Fasanenstr. 39

D-1 B e r l i n 15