Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie

Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève

Band: 2 (1984)

Heft: 2

Artikel: Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de

Lausanne. 3ème contribution

Autor: Aubert, Jacques

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-986191

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BULLETIN ROMAND D'ENTOMOLOGIE, 2 : 85-90

LES LEPIDOPTERES NOCTURNES D'UN JARDIN SUBURBAIN DES ENVIRONS DE LAUSANNE. 3ème CONTRIBUTION

par Jacques AUBERT, Musée zoologique CH-1005 Lausanne

Une nouvelle campagne de captures au piège lumineux a été entreprise en 1983 selon l'horaire :

mars	1	nuit	juillet	8	nuits
avril	4	nuits	août	8	nuits
mai	7	nuits	septembre	16	nuits
juin	10	nuits	octobre	15	nuits
			novembre	5	nuits

soit au total 74 nuits toujours complètes. Il a été noté chaque fois l'état du ciel ainsi que la température le soir et le matin.

1176 Lépidoptères appartenant à 137 espèces ont été capturés :

Nombre	Espèces	Individus
Lymantriidae	2	2
Arctiidae	10	42
Thaumetopoeidae	1	5
Notodontidae	4	10
Cochlidiidae	1	1
Sphingidae	1	2
Thyatiridae	1	1
Drepanidae	1	1
Hepialidae	2	2
Bombyces & Sphinges	23	66
Noctuidae	73	978
	7. PS	(7) (3) (37)
Geometridae	41	132
Total	137	1176

Les 29 espèces dont les noms suivent sont nouvelles pour la liste de Lutry (Aubert 1983) qui compte ainsi 234 espèces connues.

La première colonne donne le numéro d'ordre d'après Forster et Wohlfahrt (1960-1981). La dernière colonne indique le nombre d'exemplaires capturés en 1983.

Lymantriidae

251	Orgyia recens Hbn.	6	VIII	1		
Arctiidae						
278	Systropha sororcula Hbn.	3	- 12 VI	3		
Thau	metopoeidae					
331	Thaumetopoea pityocampa Schiff.	17	VII-16 VIII	5		
Noto	dontidae					
367	Notodonta ziczac L.	30	VI	1		
Nocti	uidae					
853	Amphipyra pyramidea L.	22	VIII	1		
881	Cosmia pyralina Schiff.	10	VII	1		
887	Apamea monoglypha Hfn.	10	VII	1		
966	Spodoptera exigua Hbn.	17	VIII	1		
1055	Allophyes oxyacanthae L.	23	X	1		
1085	Conistra vaccinii L.	20	III	1		
1087	Conistra rubiginosa Scop.	14	XI	1		
1109	Cirrhia icteridia Hfn.	13	X	1		
1119	Chloridea peltigera Schiff.	25	VIII	1		
1150	Subacronicta megacephala Schiff	. 2	VIII	1		
1186	Nycteola rewayana Scop.	25	VII	1		
1192	Earias chlorana L.	22	VIII	1		
1252	Ectypa glyphica L.	5	VI - 28 VII	3		
1256	Lygephila lusoria L.	8	VI	1		
1287	Bolomocha crassalis F.	14	VII	1		
1288	Hypena rostralis L.	2	IX	1		
Geometridae						
1300	Alsophila aescularia Schiff.	20	III	1		
1314	Thalera fimbrialis Scop.	2	VII	1		
1315	Hemistola chrysoprasaria Esp.	28	VII	1		
1397	Rhodometra sacraria L.	13	IX, 3 X	2		
1448	Lygris prunata L.	10	VII	1		

1461	Thera cognata Thbg.	21	VII	1
1499	Lampropteryx ocellata L.	25	VIII, 2 IX	2
1531	Diactinia silaceata Schiff.	21	VII	1
1547	Perizoma alchemillata L.	26	VII	1

Courbes de vol annuelles

On peut présenter les courbes de vol annuelles qui donnent un profil de l'activité des Lépidoptères nocturnes au cours de l'année sous forme d'histogrammes.

Celui de la figure l montre l'évolution des captures en comptant pour chaque nuit le nombre total des individus capturés. L'influence des facteurs météorologiques y apparaît très nettement. Après un bon démarrage en mars, qui a été relativement chaud, l'activité des Lépidoptères a été pratiquement nulle en avril, très faible en mai; les captures de juin et même de juillet sont anormalement peu nombreuses malgré un début d'été très chaud. L'influence de deux fortes perturbations au début d'août et dans la première moitié de septembre se




Fig. 1 Histogramme montrant les captures journalières de 1983 en nombre d'individus.

traduit par une forte diminution des captures. Le maximum se situe dans la seconde moitié d'août avec un retard de près d'un mois sur la normale et de deux semaines par rapport à 1982 (Aubert 1983).

L'histogramme de la figure 2 montre l'évolution des captures en comptant pour chaque nuit le nombre des espèces. L'influence des facteurs météorologiques est identique mais moins nette. Le nombre des espèces reste un peu supérieur à 20 du début de juin à la fin d'août et il n'y a pas de maximum bien apparent.




Fig. 2 Histogramme montrant les captures journalières de 1983 en nombre d'espèces.

Les deux premières captures de l'année datent du 10 mars: Un Eupsilia transversa Hfn. et un Orthosia gothica L. Les dernières, du 13 novembre sont un Scotia ipsilon Hfn. et un Phlogophora meticulosa L. Le piégeage a été arrêté après le 13 novembre et l'on a encore vu voler aux fenêtres quelques exemplaires de Operophthera brumata L. par quelques nuits douces du début de décembre. Ainsi la "saison morte", s'il en existe réellement une pour quelques espèces de Lépidoptères hivernaux, est très courte et ne dépasse guère les deux mois de janvier et de février.

Migrateurs

La proportion des migrateurs est toujours élevée dans nos captures par rapport aux résidents. Il faut évidemment faire une réserve du fait qu'il ne nous est pas possible de distinguer ce qui est "en migration" de ce qui est "résident" pour les espèces communes telles que Scotia ipsilon ou Amathes c-nigrum. Mais si l'on admet que toutes nos captures concernent des individus en migration, on a le tableau suivant :

19	65-1973	1982	1983
Scotia segetum Schiff. Scotia exclamationis L. Scotia ipsilon Hfn.	45	46 55 66	43 30 139
Noctua pronuba L.	1	26	15
Amathes c nigrum L.	36	132	138
Mamestra brassicae L.	3	23	20
Mythimna albipuncta Schiff.	19	32	32
Phlogophora meticulosa L.		47	24
Autographa gamma L.	18	172	92
TOTAL :	122	599	533
8	21	47	45

Ne sont pas comptés dans ce tableau quelques Noctuelles migratrices (<u>Noctua fimbriata Schr., Chloridea peltigera Schiff.</u>, etc) et quelques Géometrides qui sont peu communes dans nos captures.

Les captures de la première colonne (1965-1973) ne sont pas très significatives du fait que les piégeages avaient été faits de manière irrégulière. Par contre, celles de 1982 et 1983 peuvent être comparées et montrent que les espèces migratrices constituent près de la moitié de ce qui vole la nuit dans le jardin suburbain de Lutry.

Microlépidoptères

En 1982 et 1983, les Microlépidoptères ont été simplement comptés. Il ne nous a pas été possible de les identifier par espèces. Le tableau suivant résume les captures faites jusqu'ici à Lutry:

1965 -	1973	1982	1983	Total
Aubert	1962	Aubert 1963		

Macrolépidoptères 562 22,1% 1259 29,4% 1176 27% 2997 26,8% Microlépidoptères 1979 77,9% 3025 70,6% 3175 73% 8179 73,2%

On constate que la proportion des Microlépidoptères est toujours très élevée, en moyenne 73,2%, soit pratiquement les trois quarts des captures totales de Lépidoptères.

Les Microlépidoptères sont beaucoup plus nombreux à Lutry qu'au Bois de Chênes et au col de Bretolet (Aubert 1962):

	Breto	let	Bois de Chênes		Lutry	
Macrolépidoptères	124045	74,4%	70938	35,8%	2997	26,8%
Microlépidoptères	42599	25,6%	127021	64,2%	8179	73,2%

Nous avions supposé (Aubert 1982) que cette surabondance de Microlépidoptères à Lutry serait due au fait que le piège s'y trouve dans une zone de jardins, de vergers et de vignobles. On pourrait préciser qu'il se trouve en plein agro-écosystèmes et qu'il manque à Lutry des écosystèmes naturels comme ceux qui dominent au Bois de Chênes ou au col de Bretolet et qui sont plus riches en Hétérocères et plus pauvres quantitativement sinon qualitativement en Microlépidoptères.

Bibliographie

- Aubert J. 1982. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. Bull. rom. Entomol. 1: 113-124.
- Aubert J. 1983. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne, 2ème contribution. Bull. rom. Entomol. 1: 177-187.
- Forster W., Wohlfahrt A. 1960 1981. Die Schmetterlinge Mitteleuropas. III. Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges) 1960. IV. Eulen (Noctuidae) 1971. V. Spanner (Geometridae) 1981.