

**Zeitschrift:** Bulletin romand d'entomologie  
**Herausgeber:** Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève  
**Band:** 2 (1984)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois. 2, Noctuidae  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-986194>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.03.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

CATALOGUE DES LEPIDOPTERES DU BASSIN GENEVOIS (2) :  
NOCTUIDAE.

Société entomologique de Genève  
Muséum, CH-1211 Genève 6

Introduction

Dans cette deuxième partie du catalogue des Lépidoptères du bassin genevois que nous avons entrepris l'an dernier de publier, nous avons choisi la vaste famille des Noctuelles. Après les Rhopalocères ou Papillons de jour, nous entrons ainsi dans le groupe des Hétérocères avec une famille très importante et dont les déterminations ne sont pas toujours faciles. Si elle ne contient pas de papillons aussi spectaculaires que les Arctides, on peut y trouver de fort beaux papillons comme les Catocala ou les Plusia par exemple, ou des groupes taxonomiquement ou biologiquement intéressants comme les Agrotis ou les Cucullia.

Les captures se feront essentiellement au piège lumineux, mises à part quelques espèces crépusculaires (parmi les Plusiinae par exemple) et les Catocala qui se capturent à la miellée. Cela implique plusieurs conséquences : ces papillons, comme la plupart des Lépidoptères nocturnes, sont attirés par les sources lumineuses et il conviendra de choisir des lieux de chasse hors d'atteinte d'autres lumières fortes; d'autre part, l'éclairage public de plus en plus envahissant perturbe chaque nuit le vol de ces insectes et peut avoir une responsabilité dans le recul général de la faune lépidoptérologique des régions fortement habitées telles notre canton.

Cependant, et nous avons déjà attiré l'attention de nos lecteurs sur ce point dans la première partie de ce catalogue, les Lépidoptères dont nous n'avons pas d'indications de captures postérieures à 1970 (précédés d'un signe - dans notre liste) n'ont pas pour autant disparu de notre région avec certitude. Ils ont dû se raréfier ou se retirer dans des endroits très localisés où les chasseurs actuels n'ont pas pu aller les dénicher.

D'autre part, et cela est particulièrement réjouissant pour notre faune, quelques chasseurs assidus de notre bassin genevois, Mme Maier de Sézenove (en collaboration avec M. Rezbanyai-Reser du Natur-Museum de Lucerne), M. Hächler (de la Station fédérale de Recherches agronomiques de Changins) et M. Perret, ont enrichi la liste de 1958 (Martin et Rehfoos) d'une bonne trentaine d'espèces, nouvelles donc pour notre faune. De plus, quelques indications de rareté ont pu être supprimées. Je suis tout particulièrement reconnaissant à ces personnes d'avoir bien voulu me communiquer le résultat de leurs chasses, permettant ainsi une mise à jour réelle et importante de cette liste. Je ne saurais oublier dans ces remerciements M. Rezbanyai-Reser du Natur-Museum de Lucerne, M. de Bros du Muséum de Bâle et M. Martin du Muséum de Genève pour l'aide et tous les renseignements qu'ils m'ont fournis.


Les Noctuelles sont un groupe passionnant et plusieurs de ces espèces n'ont plus été capturées depuis longtemps. Ce sont ces espèces-là qu'il serait le plus intéressant de débusquer. Mais il reste de toute façon beaucoup à faire pour cataloguer complètement notre faune de Lépidoptères. De nombreuses localités manquent, le Vuache et les Voirons ont été peu prospectés. Un exemple parmi beaucoup d'autres, *Xestia c-nigrum* n'est mentionné que du sommet du Salève, du Jura et de plaine, alors qu'il doit se trouver partout. Les indications rapportées ici signifient seulement (et c'est un problème général à tous les travaux de cartographie) que l'espèce en question a été cherchée en cet endroit et qu'on l'y a trouvée, une absence d'indications ne signifiant rien.

Nous espérons que la parution de cette seconde partie de ce catalogue va nous valoir des réactions de la part des lépidoptéristes de la région. La première partie, les Rhopalocères, n'a suscité que peu de réactions; mais des mises au point concernant quelques espèces difficiles, ainsi que des confirmations de captures seront publiées dans ce bulletin.

J. WUEST

Schéma du bassin genevois et des limites naturelles  
utilisées dans ce catalogue

---



..... Frontières politiques

— . — Limites naturelles du bassin genevois  
utilisées dans ce catalogue



Chaînes de montagne

## Liste des abréviations et symboles utilisés dans le catalogue

- \* Exceptionnel (1 à 2 captures)
- Pas de dates de captures postérieures à 1970
  
- R Rare                                      TR Très rare
- L Localisé                                      TL Très localisé
  
- J Jura                                      P Plaine
- S Salève                                      V Voirons
- Vu Vuache (sans indications d'altitude)
  
- ^ Région sommitale des chaînes (au-dessus de 1100 m)
- Zone moyenne (entre 650 et 1100 m)
- ∨ Zone inférieure des chaînes (en-dessous de 650 m)

## Bibliographie

- Dufay C. 1984. Chersotis oreina n. sp., noctuelle méconnue des montagnes de l'Europe occidentale (Noctuidae, Noctuinae). Nota Lepid. 7 : 8-20.
- Forster W. et Wohlfahrt T.A. 1954-1980. Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Frank'sche Verlag Stuttgart. 5 vol.
- Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., 334 p.
- Lhomme L. 1923-1935. Catalogue des Lépidoptères de France et Belgique. 800 p.
- Martin P. et Rehfoos M. 1958. Catalogue des Lépidoptères de la région de Genève (Macrolépidoptères). 22 p. dactylographiées.
- Mouterde R. 1952-1956. Catalogue des Lépidoptères de la région lyonnaise. I. Macrolépidoptères. Bull. Soc. linn. Lyon, vol. 21 à 24 et 26, 128 p.
- Rappaz R. 1979. Les papillons du Valais (Macrolépidoptères). Impr. Pillet, Martigny. 380 p.
- Rehfoos M. et Romieux J. 1948. Liste systématique des Lépidoptères de la région de Genève. 19 p. dactylographiées.
- Remm H. 1983. (Nouvelles espèces de Noctuidae (Lepidoptera) de l'URSS) (en russe). Rev. Ent. URSS 62 : 596-600.
- Rezbanyai L. 1983. Agrochola dujardini Dufay 1976 bona species oder nur subspecies von nitida D. & Sch. 1775? Wissenswertes über die beiden Taxa sowie ihre Verbreitung in der Schweiz (Lep., Noctuidae). Nota Lepid. 6 : 137-174.
- Rezbanyai-Reser L. 1983. Ueber Caradrina-Arten, insbesondere über C. ingrata Staudinger 1897, eine für die Schweiz und für Mitteleuropa neue mediterrane Art (Lepidoptera, Noctuidae). Ent. Ber. Luzern 10 : 99-109.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Angaben zur Morphologie von Mesapamea secalella Remm 1983, der vor kurzem erkannten Zwillingsart von M. secalis Linnaeus 1758, und zu deren Vorkommen in der Schweiz und in Ungarn (Lepidoptera, Noctuidae). Bull. Soc. Ent. Suisse, 57 : 239-250.
- Société entomologique de Genève 1983. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois. Bull. rom. Entomol. 1: 189-203.
- Vorbrodt K. et Müller-Rutz J. 1911-1914. Die Schmetterlinge der Schweiz. Wyss, Bern. 2 vol.

NOCTUOIDEA

NOCTUIDAE

NOCTUINAE

Euxoa Hbn. 1821

|       |                                                                         |       |     |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| 3957  | <u>E. obelisca</u> D. & S. 1775 (389)                                   | J ▽   | S ∨ | P      |
| 3958  | <u>E. tritici</u> L. 1761 (384)                                         | J ▽   | S ^ | P      |
| 3959  | <u>E. nigricans</u> L. 1761 (382)                                       | R J ▽ |     | P      |
| 3963  | <u>E. aquilina</u> D. & S. 1775 (-)                                     | J ▽   |     | P      |
| 3966a | <u>E. decora</u> D. & S. 1775<br>ssp. <u>simulatrix</u> Hbn. 1824 (367) | J -   | S ⚡ | P (19) |
| 3967  | <u>E. birivia</u> D. & S. 1775 (366)                                    |       | S ∨ | P      |
| 3970  | <u>E. recussa</u> Hbn. 1817 (383)                                       | J ▽   | S ^ | P      |

Agrotis O. 1816

|      |                                       |     |         |   |
|------|---------------------------------------|-----|---------|---|
| 3973 | <u>A. cinerea</u> D. & S. 1775 (380)  | J ▽ | S ⚡     | P |
| 3979 | <u>A. segetum</u> D. & S. 1775 (393)  | J ▽ | S ∨ V - | P |
| 3980 | <u>A. clavis</u> Hfn. 1766 (391)      |     | S ⚡     | P |
| 3981 | <u>A. exclamationis</u> L. 1758 (381) | J ⚡ | S ⚡ V ⚡ | P |
| 3983 | <u>A. ipsilon</u> Hfn. 1766 (392)     |     |         | P |
| 3984 | <u>A. puta</u> Hbn. 1803 (378)        |     |         | P |
| 3987 | <u>A. crassa</u> Hbn. 1803 (396)      | TR  |         | P |

Ochropleura Hbn. 1821

|      |                                         |     |  |   |
|------|-----------------------------------------|-----|--|---|
| 3998 | <u>O. praecox</u> L. 1758 (399)         | R   |  | P |
| 4000 | <u>O. flammatrix</u> D. & S. 1775 (358) | TR  |  | P |
| 4001 | <u>O. musiva</u> Hbn. 1803 (357)        |     |  | P |
| 4002 | <u>O. plecta</u> L. 1761 (355)          | J ⚡ |  | P |

Eugnorisma Boursin 1946

|      |                                  |     |     |   |
|------|----------------------------------|-----|-----|---|
| 4004 | <u>E. depuncta</u> L. 1761 (346) | J ▽ | S ∨ | P |
|------|----------------------------------|-----|-----|---|

Rhyacia Hbn. 1821

|      |                                       |        |     |   |
|------|---------------------------------------|--------|-----|---|
| 4010 | <u>R. latens</u> Hbn. 1809 (372)      | J ^    | S ^ |   |
| 4011 | <u>R. grisea</u> F. 1794 (371)        | R J ^  | S   |   |
| 4012 | <u>R. simulans</u> Hfn. 1766 (361)    | TR J ⚡ |     | P |
| 4013 | <u>R. lucipeta</u> D. & S. 1775 (364) | TR J ^ |     | P |

Chersotis Bsdv. 1840

|      |                                         |     |     |      |
|------|-----------------------------------------|-----|-----|------|
| 4017 | <u>C. ocellina</u> D. & S. 1775 (353)   | J ^ | S ^ |      |
| 4018 | <u>C. alpestris</u> Bsdv. 1832 (354)    | J ^ |     |      |
| 4019 | <u>C. multangula</u> Hbn. 1803 (350)    | L   | S ∨ |      |
| 4021 | <u>C. margaritacea</u> Vill. 1789 (348) | R   | S ▽ | P    |
| 4024 | <u>C. cuprea</u> D. & S. 1775 (352)     | J ^ | S ^ |      |
| -    | <u>C. oreina</u> Duf. 1984 (-)          | J ^ |     | (20) |

|                                    |                                          |      |             |    |                         |        |
|------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------|----|-------------------------|--------|
| <u>Noctua</u> L. 1758              |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4026                               | <u>N. pronuba</u> L. 1758 (324)          |      | J $\hat{=}$ | Vu | S ^                     | P      |
| 4027                               | <u>N. orbona</u> Hfn. 1766 (325)         | R    | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| 4029                               | <u>N. comes</u> Hbn. 1813 (326)          |      | J $\hat{=}$ |    |                         | P      |
| 4030                               | <u>N. fimbriata</u> Schreber 1759 (317)  |      | J $\hat{=}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| 4031                               | <u>N. janthina</u> D. & S. 1775 (316)    |      | J $\hat{=}$ |    |                         | P      |
| 4032                               | <u>N. interjecta</u> Hbn. 1803 (-)       |      | J $\hat{=}$ |    |                         | P      |
| <u>Epilecta</u> Hbn. 1821          |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4033                               | <u>E. linogrisea</u> D. & S. 1775 (315)  | TR L | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| <u>Spaelotis</u> Bsdv. 1840        |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4034                               | <u>S. ravida</u> D. & S. 1775 (323)      | R L  |             |    | S ^                     |        |
| <u>Graphiphora</u> O. 1816         |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4037                               | <u>G. augur</u> F. 1775 (320)            |      | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| <u>Eugraphe</u> Hbn. 1821          |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4038                               | <u>E. sigma</u> D. & S. 1775 (314)       |      | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| <u>Paradiarsia</u> McDunnough 1929 |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4041                               | <u>P. sobrina</u> Dup. 1843 (318)        | TR   |             |    | S ^                     |        |
| 4042                               | <u>P. glareosa</u> Esp. 1788 (347)       |      | J $\bar{v}$ |    |                         | P      |
| 4043                               | <u>P. punicea</u> Hbn. 1803 (319)        | R L  | J $\bar{v}$ |    |                         | P      |
| <u>Lycophotia</u> Hbn. 1821        |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4047                               | <u>L. porphyrea</u> D. & S. 1775 (312)   | R    | J $\bar{v}$ |    | S -                     | P      |
| <u>Peridroma</u> Hbn. 1821         |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4048                               | <u>P. saucia</u> Hbn. 1808 (395)         |      | J $\bar{v}$ |    | S ^                     | P      |
| <u>Diarsia</u> Hbn. 1821           |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4049                               | <u>D. mendica</u> F. 1775 (345)          |      | J $\hat{=}$ |    | S $\hat{=}$ V -         | P      |
| 4050                               | <u>D. dahlia</u> Hbn. 1813 (343)         | TR   | J $\bar{v}$ |    |                         | P      |
| 4052                               | <u>D. brunnea</u> D. & S. 1775 (344)     |      | J $\hat{=}$ |    | S $\hat{=}$ V $\bar{v}$ | P      |
| 4053                               | <u>D. rubi</u> Vieweg 1790 (342)         |      | J $\bar{v}$ |    |                         | P      |
| <u>Xestia</u> Hbn. 1818            |                                          |      |             |    |                         |        |
| 4055                               | <u>X. sincera</u> H.-S. 1851 (-)         |      | J ^         |    |                         | (21)   |
| 4057a                              | <u>X. speciosa</u> Hbn. 1813             |      |             |    |                         |        |
|                                    | ssp. <u>modesta</u> Warn. 1962 (335)     |      | J $\hat{=}$ |    |                         | P (22) |
| 4060                               | <u>X. c-nigrum</u> L. 1758 (337)         |      | J $\hat{=}$ |    | S ^                     | P      |
| 4061                               | <u>X. ditrapezium</u> D. & S. 1775 (338) |      | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |
| 4062                               | <u>X. triangulum</u> Hfn. 1766 (332)     |      | J $\bar{v}$ |    | S $\hat{=}$             | P      |
| 4063a                              | <u>X. ashworthii</u> Dbld. 1855          |      |             |    |                         |        |
|                                    | ssp. <u>candelarum</u> Stgr. 1871 (336)  |      | J ^         |    | S $\bar{v}$             | (23)   |
| 4064                               | <u>X. baja</u> D. & S. 1775 (333)        |      | J $\bar{v}$ |    |                         | P      |
| 4065                               | <u>X. rhomboidea</u> Esp. 1790 (339)     |      | J $\bar{v}$ |    | S $\bar{v}$             | P      |



|       |                                                                      |      |     |         |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--------|
| 4066a | <u>X. castanea</u> Esp. 1796<br><u>ssp. neglecta</u> Hbn. 1803 (327) |      | J ✓ | S ✓     | P (24) |
| 4067  | <u>X. ochreago</u> Hbn. 1809 (611)                                   | TR L | J ✓ | S ^     |        |
| 4069  | <u>X. sexstrigata</u> Haw. 1809 (341)                                |      | J ✓ |         | P      |
| 4071  | <u>X. xanthographa</u> D. & S. 1775 (340)                            |      | J ✓ |         | P      |
|       | <u>Naenia</u> Stephens 1827                                          |      |     |         |        |
| 4074  | <u>N. typica</u> L. 1758 (536)                                       | R    |     |         | P      |
|       | <u>Eurois</u> Hbn. 1821                                              |      |     |         |        |
| 4075  | <u>E. occulta</u> L. 1758 (401)                                      | R L  | J ^ | V ✓     | P      |
|       | <u>Anaplectoides</u> McDunnough 1929                                 |      |     |         |        |
| 4076  | <u>A. prasina</u> D. & S. 1775 (400)                                 |      | J ✓ | S ✓     | P      |
|       | <u>Cerastis</u> O. 1816                                              |      |     |         |        |
| 4077  | <u>C. rubricosa</u> D. & S. 1775 (402)                               |      | J ^ |         | P      |
| 4078  | <u>C. leucographa</u> D. & S. 1775 (403)                             | R    | J ✓ | S ✓     | P      |
|       | <u>Mesogona</u> Bsdv. 1840                                           |      |     |         |        |
| 4080  | <u>M. acetosellæ</u> D. & S. 1775 (610)                              | TR   | J ✓ | S ✓     | P      |
| 4081  | <u>M. oxalina</u> Hbn. 1803 (609)                                    |      |     |         | P      |
|       | HADENINAE                                                            |      |     |         |        |
|       | <u>Anarta</u> O. 1816                                                |      |     |         |        |
| 4084  | <u>A. myrtilli</u> L. 1761 (687)                                     | R L  |     | S - V - | P      |
| 4085  | <u>A. cordigera</u> Thnbg. 1788 (688)                                | R TL |     | S ^     |        |
|       | <u>Discestra</u> Hamps. 1905                                         |      |     |         |        |
| 4087  | <u>D. marmorosa</u> Bkh. 1792 (428)                                  |      | J ^ | S ^     | P      |
| 4088  | <u>D. pugnax</u> Hbn. 1824 (427)                                     |      |     | S ^     |        |
| 4089  | <u>D. trifolii</u> Hfn. 1766 (423)                                   |      | J ✓ |         | P      |
|       | <u>Hada</u> Billb. 1820                                              |      |     |         |        |
| 4093  | <u>H. proxima</u> Hbn. 1809 (425)                                    |      | J ✓ |         |        |
| 4094  | <u>H. nana</u> Hfn. 1766 (426)                                       |      | J ^ | S ^     | P      |
|       | <u>Polia</u> O. 1816                                                 |      |     |         |        |
| 4096  | <u>P. bombycina</u> Hfn. 1766 (409)                                  |      | J ^ |         | P      |
| 4097  | <u>P. hepatica</u> Cl. 1759 (410)                                    |      | J ^ | S ^     |        |
| 4098  | <u>P. nebulosa</u> Hfn. 1766 (411)                                   |      | J ✓ | S ✓     | P      |
|       | <u>Pachetra</u> Gn. 1841                                             |      |     |         |        |
| 4100  | <u>P. sagittigera</u> Hfn. 1766 (407)                                |      | J ✓ | S ✓     | P      |
|       | <u>Sideritis</u> Hbn. 1821                                           |      |     |         |        |
| 4102  | <u>S. albicolon</u> Hbn. 1813 (414)                                  | TR   |     | S ✓     | P      |
|       | <u>Heliophobus</u> Bsdv. 1828                                        |      |     |         |        |
| 4104  | <u>H. reticulata</u> Gze. 1781 (429)                                 |      | J ✓ | S ^     | P      |

|                                |                                        |                |                  |   |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---|
| <u>Mamestra</u> O. 1816        |                                        |                |                  |   |
| 4106                           | <u>M. brassicae</u> L. 1758 (412)      | J $\hat{=}$    | S $\checkmark$   | P |
| 4107                           | <u>M. persicariae</u> L. 1761 (413)    | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |
| 4108                           | <u>M. contigua</u> D. & S. 1775 (421)  | J $\checkmark$ | S ^              |   |
| 4109                           | <u>M. w-latinum</u> Hfn. 1766 (418)    | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |
| 4110                           | <u>M. thalassina</u> Hfn. 1766 (420)   | J $\hat{=}$    |                  | P |
| 4111                           | <u>M. suasa</u> D. & S. 1775 (419)     | J $\checkmark$ |                  | P |
| 4112                           | <u>M. splendens</u> Hbn. 1808 (415)    | L              | S $\checkmark$   | P |
| 4113                           | <u>M. oleracea</u> L. 1758 (416)       | J $\checkmark$ |                  | P |
| 4114                           | <u>M. aliena</u> Hbn. 1809 (417)       |                | S $\hat{=}$      | P |
| 4116                           | <u>M. pisi</u> L. 1758 (422)           | J $\hat{=}$    | S ^              | P |
| 4117                           | <u>M. biren</u> Gze. 1781 (424)        | J $\hat{=}$    |                  |   |
| 4118                           | <u>M. bicolorata</u> Hfn. 1766 (432)   | J $\hat{=}$    | S $\checkmark$ V | P |
| 4119                           | <u>M. dysodea</u> D. & S. 1775 (431)   |                | S $\checkmark$   | P |
| <u>Hadena</u> Schrank 1802     |                                        |                |                  |   |
| 4121                           | <u>H. rivularis</u> F. 1775 (443)      | J $\hat{=}$    |                  | P |
| 4122                           | <u>H. perplexa</u> D. & S. 1775 (444)  | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |
| 4125 -                         | <u>H. irregularis</u> Hfn. 1766 (446)  |                |                  |   |
| 4126                           | <u>H. luteago</u> D. & S. 1775 (433)   |                | S $\checkmark$   | P |
| 4127                           | <u>H. compta</u> D. & S. 1775 (441)    | J $\hat{=}$    | S $\hat{=}$      | P |
| 4128                           | <u>H. confusa</u> Hfn. 1766 (440)      | J $\hat{=}$    | S $\hat{=}$      | P |
| 4130                           | <u>H. albimacula</u> Bkh. 1792 (439)   | J $\checkmark$ |                  | P |
| 4131                           | <u>H. bicruris</u> Hfn. 1766 (442)     | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |
| 4133                           | <u>H. magnolii</u> Bsdv. 1829 (438)    |                | S $\checkmark$   | P |
| 4134                           | <u>H. filigrama</u> Esp. 1788 (435)    | J $\checkmark$ | S                | P |
| 4137                           | <u>H. caesia</u> D. & S. 1775 (434)    | J $\hat{=}$    | S ^              |   |
| <u>Eriopygodes</u> Hamps. 1905 |                                        |                |                  |   |
| 4140                           | <u>E. imbecilla</u> Fab. 1758 (570)    | J $\hat{=}$    |                  |   |
| <u>Cerapteryx</u> Curtis 1833  |                                        |                |                  |   |
| 4141                           | <u>C. graminis</u> L. 1758 (404)       | J $\hat{=}$    | S ^              | P |
| <u>Tholera</u> Hbn. 1821       |                                        |                |                  |   |
| 4142                           | <u>T. cespitis</u> D. & S. 1775 (406)  | J $\checkmark$ | S ^              | P |
| 4143                           | <u>T. decimalis</u> Poda 1761 (405)    | J $\checkmark$ |                  | P |
| <u>Panolis</u> Hbn. 1821       |                                        |                |                  |   |
| 4144                           | <u>P. flammea</u> D. & S. 1775 (608)   | J $\hat{=}$    | S ^              | P |
| <u>Egira</u> Dup. 1845         |                                        |                |                  |   |
| 4146                           | <u>E. conspicillaris</u> L. 1758 (662) | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |
| <u>Orthosia</u> O. 1816        |                                        |                |                  |   |
| 4147                           | <u>O. cruda</u> D. & S. 1775 (601)     | J $\hat{=}$    | S $\checkmark$   | P |
| 4148                           | <u>O. miniosa</u> D. & S. 1775 (600)   | J $\checkmark$ | S $\checkmark$   | P |

|                                |                                           |                   |                 |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 4149                           | <u>O. opima</u> Hbn. 1809 (605)           | J $\hat{=}$       |                 | P      |
| 4150                           | <u>O. populeti</u> F. 1781 (602)          | J $\hat{=}$       |                 | P      |
| 4151                           | <u>O. gracilis</u> D. & S. 1775 (606)     | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| 4152                           | <u>O. stabilis</u> D. & S. 1775 (603)     | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| 4153                           | <u>O. incerta</u> Hfn. 1766 (604)         | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| 4154                           | <u>O. munda</u> D. & S. 1775 (607)        | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P      |
| 4155                           | <u>O. gothica</u> L. 1758 (599)           | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| <u>Perigrapha</u> Lederer 1857 |                                           |                   |                 |        |
| 4157                           | <u>P. i-cinctum</u> D. & S. 1775 (599bis) |                   | Vu              |        |
| <u>Mythimna</u> O. 1816        |                                           |                   |                 |        |
| 4153                           | <u>M. turca</u> L. 1761 (569)             | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P      |
| 4159                           | <u>M. conigera</u> D. & S. 1775 (566)     | J $\hat{=}$       | S $\hat{=}$ V - | P      |
| 4160                           | <u>M. ferrago</u> F. 1787 (568)           | J $\checkmark$    |                 | P      |
| 4161                           | <u>M. albipuncta</u> D. & S. 1775 (567)   | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| 4162                           | <u>M. vitellina</u> Hbn. 1808 (565)       | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P      |
| 4163                           | <u>M. unipuncta</u> Hw. 1809 (565bis)     | J $\hat{=}$       |                 | P      |
| 4164                           | <u>M. pudorina</u> D. & S. 1775 (554)     | L J $\checkmark$  | S $\checkmark$  | P      |
| 4165                           | <u>M. straminea</u> Tr. 1825 (558)        |                   | S $\checkmark$  | P      |
| 4166                           | <u>M. impura</u> Hbn. 1808 (555)          | J $\checkmark$ Vu |                 | P      |
| 4168                           | <u>M. pallens</u> L. 1758 (556)           | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P      |
| 4171                           | <u>M. l-album</u> L. 1767 (562)           | J $\hat{=}$       | S $\checkmark$  | P      |
| 4172a                          | <u>M. sricula</u> Tr. 1835                |                   |                 |        |
|                                | ssp. <u>scirpi</u> Dup. 1836 (559)        | TL                | S $\checkmark$  | P (25) |
| 4176                           | <u>M. obsoleta</u> Hbn. 1803 (557)        | L                 | S $\checkmark$  | P      |
| 4177                           | <u>M. comma</u> L. 1761 (560)             | J $\checkmark$ Vu | S $\hat{=}$     | P      |
| 4181 -                         | <u>M. loreyi</u> Dup. 1827 (563)          | TR                |                 | P      |
| <u>CUCULLIINAE</u>             |                                           |                   |                 |        |
| <u>Cucullia</u> Schrank 1802   |                                           |                   |                 |        |
| 4183 -                         | <u>C. absinthii</u> L. 1761 (684)         | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P (26) |
| 4189                           | <u>C. chamomillae</u> D. & S. 1775 (679)  | R                 |                 | P      |
| 4192                           | <u>C. lucifuga</u> D. & S. 1775 (677)     | J $\checkmark$    | V -             | P      |
| 4194                           | <u>C. lactucae</u> D. & S. 1775 (678)     | J $\hat{=}$       |                 | P      |
| 4195                           | <u>C. campanulae</u> Frr. 1828 (676)      | L J $\hat{=}$     | S $\checkmark$  | P      |
| 4196                           | <u>C. umbratica</u> L. 1758 (675)         | J $\checkmark$    | S $\checkmark$  | P      |
| 4197 -                         | <u>C. tanacetii</u> D. & S. 1775 (674)    | TR J $\checkmark$ |                 |        |
| 4200                           | <u>C. asteris</u> D. & S. 1775 (673)      | J $\hat{=}$       |                 | P      |
| 4201                           | <u>C. gnaphalii</u> Hbn. 1813 (681)       | R J $\hat{=}$     |                 |        |
| 4202                           | <u>C. caninae</u> Rbr. 1833 (672)         | TL                |                 | P      |
| 4205                           | <u>C. lychnitis</u> Rbr. 1833 (670)       | R                 |                 | P      |

|        |                                            |    |   |         |   |
|--------|--------------------------------------------|----|---|---------|---|
| 4206   | <u>C. scrophulariae</u> D. & S. 1775 (669) | J  | ✓ |         | P |
| 4207   | <u>C. verbasci</u> L. 1758 (668)           | J  | ✓ | S ✓ V - | P |
|        | <u>Calophasia</u> Stph. 1829               |    |   |         |   |
| 4209   | <u>C. lunula</u> Hfn. 1766 (666)           | J  | ✓ | S ✓     | P |
| 4210   | <u>C. platyptera</u> Esp. 1788 (665)       | R  |   | S ✓     | P |
|        | <u>Cleonymia</u> Berio 1966                |    |   |         |   |
| 4215 - | <u>C. yvanii</u> Dup. 1833 (-)             | TL | R | S ✓     | P |
|        | <u>Omia</u> Hbn. 1821                      |    |   |         |   |
| 4219 - | <u>O. cymbalariae</u> Hbn. 1809 (693)      | L  |   | S ^     | P |
|        | <u>Brachylomia</u> Hamps. 1906             |    |   |         |   |
| 4223   | <u>B. viminalis</u> F. 1777 (447)          | J  | ✓ | S ✓     | P |
|        | <u>Episema</u> O. 1816                     |    |   |         |   |
| 4226   | <u>E. glaucina</u> Esp. 1789 (497)         |    |   |         | P |
| 4228   | <u>E. scoriacea</u> Esp. 1789 (497)        | TL | R |         | P |
|        | <u>Brachionycha</u> Hbn. 1819              |    |   |         |   |
| 4231   | <u>B. sphinx</u> Hfn. 1766 (514)           | J  | ✓ |         | P |
| 4232 - | <u>B. nubeculosa</u> Esp. 1785 (513)       |    |   |         | P |
|        | <u>Dasypolia</u> Gn. 1852                  |    |   |         |   |
| 4233   | <u>D. templi</u> Thnbg. 1792 (511)         |    |   | V       |   |
|        | <u>Calliergis</u> Hbn. 1821                |    |   |         |   |
| 4236   | <u>C. ramosa</u> Esp. 1786 (664)           | J  | ^ | S ^     | P |
|        | <u>Aporophyla</u> Gn. 1841                 |    |   |         |   |
| 4238   | <u>A. lutulenta</u> D. & S. 1775 (499)     | J  | ✓ |         | P |
| 4240   | <u>A. nigra</u> Hw. 1809 (500)             | J  | ✓ |         | P |
|        | <u>Lithomoia</u> Hbn. 1821                 |    |   |         |   |
| 4242   | <u>L. solidaginis</u> Hbn. 1803 (661)      |    |   | V -     |   |
|        | <u>Lithophane</u> Hbn. 1821                |    |   |         |   |
| 4244   | <u>L. semibrunnea</u> Hw. 1809 (651)       | L  | R |         | P |
| 4245   | <u>L. socia</u> Hfn. 1766 (652)            | J  | ✓ |         | P |
| 4246   | <u>L. ornitopus</u> Hfn. 1766 (656)        | J  | ✓ | S ✓     | P |
| 4247   | <u>L. furcifera</u> Hfn. 1766 (653)        | J  | ✓ |         | P |
| 4249 - | <u>L. consocia</u> Bkh. 1792 (654)         | R  | J | S ^     | P |
|        | <u>Xylena</u> O. 1816                      |    |   |         |   |
| 4253   | <u>X. vetusta</u> Hbn. 1813 (659)          | J  | ✓ |         | P |
| 4254   | <u>X. exsoleta</u> L. 1758 (660)           | J  | - | S ✓     | P |
|        | <u>Xylocampa</u> Gn. 1837                  |    |   |         |   |
| 4255   | <u>X. areola</u> Esp. 1789 (663)           | J  | ✓ |         | P |

|                               |                                              |     |          |   |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------|---|------|
| <u>Allophytes</u> Tams 1942   |                                              |     |          |   |      |
| 4258                          | <u>A. oxyacanthae</u> L. 1758 (515)          | J ▽ | V ▽      | P |      |
| <u>Valeria</u> Stph. 1829     |                                              |     |          |   |      |
| 4261                          | <u>V. jaspidea</u> Vill. 1789 (465)          | R   | S -      | P | (27) |
| <u>Dichonia</u> Hbn. 1821     |                                              |     |          |   |      |
| 4262                          | <u>D. aprilina</u> L. 1758 (517)             | J ▽ |          | P |      |
| 4263                          | <u>D. convergens</u> D. & S. 1775 (518)      |     | S ▽      | P |      |
| <u>Lamprosticta</u> Hbn. 1820 |                                              |     |          |   |      |
| 4265                          | <u>L. culta</u> D. & S. 1775 (516)           | R   | J ▽ Vu ▽ |   |      |
| <u>Dryobotodes</u> Warr. 1910 |                                              |     |          |   |      |
| 4266                          | <u>D. eremita</u> F. 1775 (520)              | J ▽ | S ▽      | P |      |
| <u>Blepharita</u> Hamps. 1907 |                                              |     |          |   |      |
| 4271                          | <u>B. satura</u> D. & S. 1775 (473)          | J ▽ |          | P |      |
| 4272                          | <u>B. adusta</u> Esp. 1790 (475)             | J △ | S △      | P |      |
| <u>Trigonophora</u> Hbn. 1821 |                                              |     |          |   |      |
| 4276                          | <u>T. flammea</u> Esp. 1785 (531)            |     |          | P | (28) |
| 4278 -                        | <u>T. crassicornis</u> Ch. Oberthur 1918 (-) |     |          | P |      |
| <u>Polymixis</u> Hbn. 1820    |                                              |     |          |   |      |
| 4282                          | <u>P. flavicincta</u> D. & S. 1775 (504)     | TR  |          | P |      |
| 4283                          | <u>P. rufocincta</u> Gey. 1828 (505)         | J ▽ | S ▽      | P |      |
| 4284 -                        | <u>P. gemnea</u> Tr. 1825 (482)              |     | V        |   | (29) |
| 4285                          | <u>P. xanthomista</u> Hbn. 1819 (507)        | J △ | S △      | P |      |
| 4286 -                        | <u>P. dubia</u> Dup. 1836 (506)              | TL  | S -      |   |      |
| <u>Antitype</u> Hbn. 1821     |                                              |     |          |   |      |
| 4288                          | <u>A. chi</u> L. 1758 (510)                  | J △ | S ^      | P |      |
| <u>Ammoconia</u> Led. 1857    |                                              |     |          |   |      |
| 4289                          | <u>A. caecimacula</u> D. & S. 1775 (501)     | J ▽ |          | P |      |
| <u>Eupsilia</u> Hbn. 1821     |                                              |     |          |   |      |
| 4293                          | <u>E. transversa</u> Hfn. 1766 (650)         | J △ | S ▽      | P |      |
| <u>Jodia</u> Hbn. 1818        |                                              |     |          |   |      |
| 4294                          | <u>J. croceago</u> D. & S. 1775 (641)        |     | S ▽      | P |      |
| <u>Conista</u> Hbn. 1821      |                                              |     |          |   |      |
| 4295                          | <u>C. vaccinii</u> L. 1761 (646)             | J ▽ | S ^      | P |      |
| 4296                          | <u>C. ligula</u> Esp. 1791 (647)             | R   | J ▽      | P |      |
| 4298                          | <u>C. rubiginosa</u> Scop. 1763 (645)        | J ▽ |          | P |      |
| 4300 -                        | <u>C. veronicae</u> Hbn. 1813 (644)          |     |          | P |      |

|      |                                                                         |    |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
| 4303 | <u>C. rubiginea</u> D. & S. 1775 (648)                                  | J  | ∇     | P      |
| 4305 | <u>C. erythrocephala</u> D. & S. 1775 (643)                             | J  | ∇     | P      |
| -    | - <u>C. fragariae</u> Esp. (642)                                        |    |       | P      |
|      | <u>Agrochola</u> Hbn. 1821                                              |    |       |        |
| 4306 | <u>A. circellaris</u> Hfn. 1766 (627)                                   | J  | ∇     | P      |
| 4307 | <u>A. lota</u> Cl. 1759 (625)                                           | J  | ∇     | P      |
| 4308 | <u>A. macilenta</u> Hbn. 1809 (626)                                     | J  | ∇     | P      |
| 4312 | <u>A. nitida</u> D. & S. 1775<br>ssp. <u>dujardini</u> Dufay 1979 (630) | J  | ∇     | P (30) |
| 4313 | <u>A. helvola</u> L. 1758 (628)                                         | J  | ∇ S ^ | P      |
| 4315 | <u>A. litura</u> L. 1751 (633)                                          | J  | ∇     | P      |
| 4317 | <u>A. lychnidis</u> D. & S. 1775 (629)                                  | J  | ∇     | P      |
|      | <u>Parastichtis</u> Hbn. 1821                                           |    |       |        |
| 4320 | <u>P. suspecta</u> Hbn. 1817 (618)                                      | R  |       | P      |
|      | <u>Spudaea</u> Snellen 1867                                             |    |       |        |
| 4321 | <u>S. ruticilla</u> Esp. 1791 (624)                                     |    |       | P      |
|      | <u>Atethmia</u> Hbn. 1821                                               |    |       |        |
| 4322 | <u>A. centrargo</u> Haw. 1809 (622)                                     | J  | ∇     | P      |
| 4323 | <u>A. ambusta</u> D. & S. 1775 (623)                                    |    | S ∇   | P      |
|      | <u>Xanthia</u> O. 1816                                                  |    |       |        |
| 4324 | <u>X. aurago</u> D. & S. 1775 (636)                                     | J  | -     | P      |
| 4325 | <u>X. fulvago</u> Cl. 1759 (635)                                        |    |       | P      |
| 4326 | <u>X. togata</u> Esp. 1788 (637)                                        | J  | ∇     | P      |
| 4327 | <u>X. icteritia</u> Hfn. 1766 (638)                                     | J  | ∇     | P      |
| 4328 | <u>X. gilvago</u> D. & S. 1775 (639)                                    | J  | ∇     | P      |
| 4329 | <u>X. ocellaris</u> Bkh. 1792 (640)                                     |    |       | P      |
| 4330 | <u>X. citrargo</u> L. 1758 (631)                                        | J  | ∇     | P      |
|      | ACRONICTINAE                                                            |    |       |        |
|      | <u>Panthea</u> Hbn. 1820                                                |    |       |        |
| 4331 | <u>P. coenobita</u> Esp. 1785 (291)                                     | TR | J ∇   | P      |
|      | <u>Trichosea</u> Grote 1875                                             |    |       |        |
| 4332 | <u>T. ludifica</u> L. 1758 (292)                                        | R  |       | P      |
|      | <u>Colocasia</u> O. 1816                                                |    |       |        |
| 4333 | <u>C. coryli</u> L. 1758 (294)                                          | J  | ∇ S ^ | P      |
|      | <u>Moma</u> Hbn. 1820                                                   |    |       |        |
| 4340 | <u>M. alpium</u> Osbeck 1778 (293)                                      | J  | ∇     | P      |
|      | <u>Acronicta</u> O. 1816                                                |    |       |        |
| 4341 | <u>A. megacephala</u> D. & S. 1775 (297)                                | J  | ∇ S ∇ | P      |

|        |                                         |     |   |   |   |      |   |
|--------|-----------------------------------------|-----|---|---|---|------|---|
| 4342   | <u>A. alni</u> L. 1767 (298)            | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
| 4343   | <u>A. cuspis</u> Hbn. 1813 (302)        |     |   |   |   | P    |   |
| 4344   | <u>A. tridens</u> D. & S. 1775 (300)    |     |   | S | ✓ | P    |   |
| 4345   | <u>A. psi</u> L. 1758 (301)             | J   | ✓ | S | △ | P    |   |
| 4346   | <u>A. aceris</u> L. 1758 (296)          | J   | ✓ | S | △ | P    |   |
| 4347   | <u>A. leporina</u> L. 1758 (295)        |     |   |   |   | P    |   |
| 4349 - | <u>A. menyanthidis</u> Esp. 1789 (303)  | J   | - |   |   |      |   |
| 4350   | <u>A. auricoma</u> D. & S. 1775 (304)   | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
| 4351   | <u>A. euphorbiae</u> D. & S. 1775 (305) | J   | △ | S | △ | P    |   |
| 4352   | <u>A. rumicis</u> L. 1758 (308)         | J   | ✓ | S | ^ | P    |   |
|        | <u>Craniophora</u> Snellen 1867         |     |   |   |   |      |   |
| 4353   | <u>C. ligustri</u> D. & S. 1775 (309)   | J   | ✓ | S | △ | P    |   |
|        | <u>Cryphia</u> Hbn. 1818                |     |   |   |   |      |   |
| 4357   | <u>C. algae</u> F. 1775 (461)           | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
| 4360   | <u>C. ravula</u> Hbn. 1813 (459)        | J   | ✓ |   |   | P    |   |
| 4362   | <u>C. raptricula</u> D. & S. 1775 (455) |     |   |   |   | P    |   |
| 4365   | <u>C. domestica</u> Hfn. 1766 (463)     | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
| 4366   | <u>C. muralis</u> Forst. 1771 (462)     |     |   |   |   | P    |   |
|        | AMPHIPYRINAE                            |     |   |   |   |      |   |
|        | <u>Pyrois</u> Hbn. 1820                 |     |   |   |   |      |   |
| 4367   | <u>P. cinnamomea</u> Gze. 1781 (598)    | R   | J | ✓ |   | P    |   |
|        | <u>Amphipyra</u> O. 1816                |     |   |   |   | (31) |   |
| 4369   | <u>A. pyramidea</u> L. 1758 (597)       | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
| 4371   | <u>A. perflua</u> F. 1787 (596)         | J   | ✓ |   |   | P    |   |
| 4373   | <u>A. tragopoginis</u> Cl. 1759 (594)   | J   | ✓ | S | ✓ | P    |   |
|        | <u>Mormo</u> O. 1816                    |     |   |   |   |      |   |
| 4375   | <u>M. maura</u> L. 1758 (535)           | J   | ✓ |   |   | P    |   |
|        | <u>Dypterygia</u> Stph. 1829            |     |   |   |   |      |   |
| 4376   | <u>D. scabriuscula</u> L. 1758 (521)    | R L | J | ✓ | S | ✓    | P |
|        | <u>Rusina</u> Stph. 1829                |     |   |   |   |      |   |
| 4377   | <u>R. ferruginea</u> Esp. 1785 (592)    | J   | ✓ | S | △ | V -  | P |
|        | <u>Thalpophila</u> Hbn. 1820            |     |   |   |   |      |   |
| 4381   | <u>T. matura</u> Hfn. 1766 (469)        | J   | ✓ |   |   |      | P |
|        | <u>Trachea</u> O. 1816                  |     |   |   |   |      |   |
| 4384   | <u>T. atriplicis</u> L. 1758 (530)      | J   | ✓ |   |   |      | P |
|        | <u>Euplexia</u> Stph. 1829              |     |   |   |   |      |   |
| 4385   | <u>E. lucipara</u> L. 1758 (532)        | J   | ✓ |   |   |      | P |

|                                |                                          |      |                |                       |        |
|--------------------------------|------------------------------------------|------|----------------|-----------------------|--------|
| <u>Phlogophora</u> Tr. 1825    |                                          |      |                |                       |        |
| 4386                           | <u>P. meticulosa</u> L. 1758 (534)       |      | J $\hat{=}$    | S $\checkmark$        | P      |
| 4387                           | <u>P. scita</u> Hbn. 1790 (533)          | R    | J $\checkmark$ | S $\wedge$            |        |
| <u>Calloplistria</u> Hbn. 1821 |                                          |      |                |                       |        |
| 4390 -                         | <u>C. latreillei</u> Dup. 1827 (528)     |      |                |                       | P      |
| <u>Eucarta</u> Led. 1857       |                                          |      |                |                       |        |
| 4391                           | <u>E. amethystina</u> Hbn. 1803 (722)    | TR L |                |                       | P      |
| <u>Ipimorpha</u> Hbn. 1821     |                                          |      |                |                       |        |
| 4392                           | <u>I. retusa</u> L. 1761 (620)           |      | J $\checkmark$ |                       | P      |
| 4393                           | <u>I. subtusa</u> D. & S. 1775 (621)     |      | J $\checkmark$ | S $\checkmark$        | P      |
| <u>Enargia</u> Hbn. 1821       |                                          |      |                |                       |        |
| 4394                           | <u>E. paleacea</u> Esp. 1788 (617)       |      | J $\checkmark$ | S $\wedge$            | P      |
| 4395                           | <u>E. ypsilon</u> D. & S. 1775 (619)     |      | J $\checkmark$ |                       | P      |
| <u>Dicycla</u> Gn. 1852        |                                          |      |                |                       |        |
| 4396                           | <u>D. oo</u> L. 1758 (612)               | L    | J $\checkmark$ |                       | P      |
| <u>Cosmia</u> O. 1816          |                                          |      |                |                       |        |
| 4397                           | <u>C. affinis</u> L. 1767 (614)          |      |                |                       | P      |
| 4398                           | <u>C. diffinis</u> L. 1767 (615)         |      |                |                       | P      |
| 4399                           | <u>C. trapezina</u> L. 1758 (616)        |      | J $\checkmark$ | S $\checkmark$        | P      |
| 4400                           | <u>C. pyralina</u> D. & S. 1775 (613)    |      | J $\checkmark$ |                       | P      |
| <u>Hyppa</u> Dup. 1845         |                                          |      |                |                       |        |
| 4401                           | <u>H. rectilinea</u> Esp. 1788 (522)     |      | J $\hat{=}$    | V                     | P      |
| <u>Auchmis</u> Hbn. 1821       |                                          |      |                |                       |        |
| 4402                           | <u>A. deterosa</u> Esp. 1791 (523)       |      | J $\checkmark$ | S $\hat{=}$ V         | P      |
| <u>Actinotia</u> Hbn. 1821     |                                          |      |                |                       |        |
| 4403                           | <u>A. polyodon</u> Cl. 1759 (525)        |      | J $\checkmark$ | S $\wedge$            | P      |
| 4404                           | <u>A. radiosa</u> Esp. 1798 (524)        |      | J $\hat{=}$    | S $\wedge$ V $\wedge$ | P      |
| 4405                           | <u>A. hyperici</u> D. & S. 1775 (526)    | R    |                | S $\checkmark$        | P      |
| <u>Apamea</u> O. 1816          |                                          |      |                |                       |        |
| 4406                           | <u>A. monoglypha</u> Hfn. 1766 (484)     |      | J $\hat{=}$    |                       | P      |
| 4408                           | <u>A. lithoxylaea</u> D. & S. 1775 (487) |      | J $\checkmark$ | S $\wedge$            | P      |
| 4409                           | <u>A. sublustris</u> Esp. 1788 (488)     |      | J $\hat{=}$    | S $\wedge$            | P      |
| 4410                           | <u>A. crenata</u> Hfn. 1766 (489)        |      | J $\hat{=}$    | S $\checkmark$        | P      |
| 4411                           | <u>A. epomidion</u> Hw. 1809 (490)       |      | J $\checkmark$ | S $\checkmark$        | P      |
| 4412a                          | <u>A. aquila</u> Donz. 1837              |      |                |                       |        |
|                                | ssp. <u>funerea</u> Hein. 1859 (474)     | R    | J $\checkmark$ | S $\checkmark$        | P (32) |
| 4413                           | <u>A. lateritia</u> Hfn. 1766 (486)      |      |                |                       | P      |
| 4414                           | <u>A. furva</u> D. & S. 1775 (480)       |      | J $\hat{=}$    |                       | P      |
| 4417                           | <u>A. rubrarena</u> Tr. 1825 (483)       |      | J $\hat{=}$    |                       |        |



|        |                                         |    |     |         |        |  |
|--------|-----------------------------------------|----|-----|---------|--------|--|
| 4418   | <u>A. platinea</u> Tr. 1825 (477)       | R  | J ▾ | S ⚡     | P      |  |
| 4420   | <u>A. remissa</u> Hbn. 1809 (492)       |    | J ⚡ |         | P      |  |
| 4421   | <u>A. unanims</u> Hbn. 1809 (494)       |    | J - |         | P      |  |
| 4422   | <u>A. illyria</u> Fr. 1852 (495)        |    | J ⚡ | S ^     |        |  |
| 4423   | <u>A. anceps</u> D. & S. 1775 (481)     |    | J ▾ | Vu S ▾  | P      |  |
| 4425   | <u>A. sordens</u> Hfn. 1766 (493)       |    | J ▾ | S       | P      |  |
| 4426   | <u>A. scolopacina</u> Esp. 1788 (491)   |    | J ▾ |         | P      |  |
| 4428   | <u>A. ophiogramma</u> Esp. 1793 (448)   |    | J ▾ |         | P      |  |
|        | <u>Oligia</u> Hbn. 1821                 |    |     |         |        |  |
| 4429   | <u>O. strigilis</u> L. 1758 (450)       |    | J ⚡ |         | P      |  |
| 4430   | <u>O. versicolor</u> Bkh. 1792 (-)      |    | J ⚡ |         | P      |  |
| 4431   | <u>O. latruncula</u> D. & S. 1775 (451) |    | J ▾ |         | P      |  |
|        | <u>Mesoligia</u> Brsn. 1965             |    |     |         |        |  |
| 4433   | <u>M. furuncula</u> D. & S. 1775 (453)  |    | J ▾ | S ▾     | P      |  |
| 4434   | <u>M. literosa</u> Hw. 1809 (449)       |    | J ▾ |         | P      |  |
|        | <u>Mesapamea</u> Heinicke 1959          |    |     |         |        |  |
| 4435   | <u>M. secalis</u> L. 1758 (496)         |    | J ⚡ | S ⚡ V - | P (33) |  |
| -      | <u>M. secalella</u> Remm. 1983 (-)      |    |     |         | P (34) |  |
|        | <u>Photodes</u> Led. 1857               |    |     |         |        |  |
| 4436   | <u>P. captiuncula</u> Tr. 1825 (454)    | TL | J ^ |         | P      |  |
| 4437   | <u>P. minima</u> Hw. 1809 (590)         | R  |     |         | P      |  |
| 4443   | <u>P. pygmina</u> Hw. 1809 (550)        | L  | J ▾ |         | P      |  |
|        | <u>Eremobia</u> Stph. 1829              |    |     |         |        |  |
| 4445   | <u>E. ochroleuca</u> D. & S. 1775 (476) |    |     |         | P      |  |
|        | <u>Luperina</u> Bsdv. 1828              |    |     |         |        |  |
| 4446   | <u>L. testacea</u> D. & S. 1775 (467)   |    | J ▾ | S ▾     | P      |  |
| 4448   | <u>L. dumerilii</u> Dup. 1827 (468)     |    | J ▾ |         | P      |  |
| 4450 - | <u>L. pozzii</u> Curo 1833 (-)          | TR |     |         | P      |  |
|        | <u>Amphipoea</u> Billb. 1820            |    |     |         |        |  |
| 4451a  | <u>A. oculea</u> L. 1761                |    |     |         |        |  |
|        | ssp. <u>nictitans</u> L. 1767 (539)     |    | J ▾ | S ⚡ V ▾ | P (35) |  |
|        | <u>Hydraecia</u> Gn. 1841               |    |     |         |        |  |
| 4456   | <u>H. micacea</u> Esp. 1789 (541)       |    |     |         | P      |  |
| 4457   | <u>H. petasitis</u> Dbld. 1847 (542)    | R  |     |         | P      |  |
|        | <u>Gortyna</u> O. 1816                  |    |     |         |        |  |
| 4459   | <u>G. flavago</u> D. & S. 1775 (543)    |    | J ▾ |         | P      |  |

|        |                                         |      |         |        |
|--------|-----------------------------------------|------|---------|--------|
|        | <u>Celaena</u> Stph. 1829               |      |         |        |
| 4464   | <u>C. leucostigma</u> Hbn. 1808 (538)   |      |         | P      |
|        | <u>Nonagria</u> O. 1816                 |      |         |        |
| 4465   | <u>N. typhae</u> Thnbg. 1784 (545)      | TL   |         | P      |
|        | <u>Archanara</u> Wlk. 1866              |      |         |        |
| 4468   | <u>A. dissoluta</u> Tr. 1825 (547)      |      |         | P      |
| 4469 - | <u>A. neurica</u> Hbn. 1808 (547)       |      |         | P (36) |
|        | <u>Rhizedra</u> Warr. 1911              |      |         |        |
| 4472   | <u>R. lutosa</u> Hbn. 1803 (552)        |      | S ✓     | P      |
|        | <u>Charanyca</u> Billb. 1820            |      |         |        |
| 4480   | <u>C. trigrammica</u> Hfn. 1766 (571)   | J ✓  | S ✓     | P      |
|        | <u>Hoplodrina</u> Brsn. 1937            |      |         |        |
| 4481   | <u>H. alsines</u> Brahm 1791 (584)      | J ✓  | S ✓ V - | P      |
| 4482   | <u>H. blanda</u> D. & S. 1775 (585)     | J -  | S ✓ V - | P      |
| 4483   | <u>H. superstes</u> O. 1816 (582)       | J ✓  | S ✓     | P      |
| 4485   | <u>H. respersa</u> D. & S. 1775 (581)   |      |         | P      |
| 4486   | <u>H. ambigua</u> D. & S. 1775 (586)    | J ✓  | S ✓     | P      |
|        | <u>Atypha</u> Hbn. 1821                 |      |         |        |
| 4487   | <u>A. pulmonaris</u> Esp. 1790 (587)    |      |         | P      |
|        | <u>Spodoptera</u> Gn. 1852              |      |         |        |
| 4489   | <u>S. exigua</u> Hbn. 1808 (572)        | J ✓  | S ✓     | P      |
|        | <u>Caradrina</u> O. 1816                |      |         |        |
| 4492   | <u>C. morpheus</u> Hfn. 1766 (583)      |      | S ^     | P      |
| 4496   | <u>C. aspersa</u> Rbr. 1834 (580)       | R L  | S ✓     | P      |
| 4499   | <u>C. ingrata</u> Stgr. 1897 (-)        | R    |         | P (37) |
| 4500   | <u>C. selini</u> Bsdv. 1840 (575)       | R    | S ✓     | P (38) |
| 4504   | <u>C. clavipalpis</u> Scop. 1763 (573)  |      | S ✓     | P      |
|        | <u>Chilodes</u> H.-S. 1849              |      |         |        |
| 4507   | <u>C. maritimus</u> Tauscher 1806 (549) | R    |         | P      |
|        | <u>Athetis</u> Hbn. 1821                |      |         |        |
| 4508   | <u>A. gluteosa</u> Tr. 1835 (588)       |      |         | P      |
| 4510 - | <u>A. pallustris</u> Hbn. 1808 (589)    | R TL | S ^     | P      |
|        | <u>Elaphria</u> Hbn. 1818               |      |         |        |
| 4519   | <u>E. venustula</u> Hbn. 1790 (713)     |      |         | P      |
|        | <u>Panemeria</u> Hbn. 1823              |      |         |        |
| 4520   | <u>P. tenebrata</u> Scop. 1763 (692)    |      | S ✓     | P      |

HELIOTHINAE

Heliothis O. 1816

|      |                                        |     |     |   |
|------|----------------------------------------|-----|-----|---|
| 4522 | <u>H. viriplaca</u> Hfn. 1766 (695)    | J ✓ | S ✓ | P |
| 4524 | <u>H. ononis</u> D. & S. 1775 (694)    |     |     | P |
| 4525 | <u>H. peltigera</u> D. & S. 1775 (697) | J ^ | S ✓ | P |
| 4527 | <u>H. armigera</u> Hbn. 1808 (698)     |     | S - | P |

Pyrrhia Hbn. 1821

|      |                                 |  |  |   |
|------|---------------------------------|--|--|---|
| 4529 | <u>P. umbra</u> Hfn. 1766 (701) |  |  | P |
|------|---------------------------------|--|--|---|

Axylia Hbn. 1821

|      |                                |     |     |   |
|------|--------------------------------|-----|-----|---|
| 4531 | <u>A. putris</u> L. 1761 (379) | J ✓ | S ✓ | P |
|------|--------------------------------|-----|-----|---|

ACONTIINAE

Metachrostis Hbn. 1820

|      |                                      |      |        |   |
|------|--------------------------------------|------|--------|---|
| 4533 | <u>M. dardouini</u> Bsdv. 1840 (705) | TR L | Vu S ✓ | P |
|------|--------------------------------------|------|--------|---|

Eublemma Hbn. 1821

|      |                                    |     |     |   |
|------|------------------------------------|-----|-----|---|
| 4535 | <u>E. ostrina</u> Hbn. 1808 (708)  | R L | J ✓ | P |
| 4536 | <u>E. parva</u> Hbn. 1808 (709)    | R L | J ^ | P |
| 4540 | <u>E. respersa</u> Hbn. 1790 (581) | L   | S ✓ | P |

Lithacodia Hbn. 1818

|      |                                     |     |         |   |
|------|-------------------------------------|-----|---------|---|
| 4551 | <u>L. pygarga</u> Hfn. 1766 (716)   | J ✓ | S ✓     | P |
| 4552 | <u>L. deceptor</u> Scop. 1763 (715) | J ✓ | S ^ V ✓ | P |

Eustrotia Hbn. 1821

|      |                                 |   |     |   |
|------|---------------------------------|---|-----|---|
| 4554 | <u>E. uncula</u> Cl. 1759 (712) | L | J ✓ | P |
|------|---------------------------------|---|-----|---|

Deltodes Reichenbach 1817

|      |                                        |  |  |   |
|------|----------------------------------------|--|--|---|
| 4555 | <u>D. bankiana</u> F. 1775 (711)       |  |  | P |
| 4556 | <u>D. candidula</u> D. & S. 1775 (714) |  |  | P |

Emmelia Hbn. 1821

|      |                                      |     |     |   |
|------|--------------------------------------|-----|-----|---|
| 4557 | <u>E. trabealis</u> Scop. 1763 (719) | J ✓ | S ✓ | P |
|------|--------------------------------------|-----|-----|---|

Acontia O. 1816

|      |                                  |    |  |   |
|------|----------------------------------|----|--|---|
| 4559 | <u>A. lucida</u> Hfn. 1767 (703) | TR |  | P |
|------|----------------------------------|----|--|---|

SARROTHRIPINAE

Nycteola Hbn. 1822

|      |                                       |     |     |   |
|------|---------------------------------------|-----|-----|---|
| 4562 | <u>N. revayana</u> Scop. 1772 (1251)  | J ✓ | S ✓ | P |
| 4564 | <u>N. degenerana</u> Hbn. 1799 (1252) | J - | S ✓ | P |
| 4565 | <u>N. siculana</u> Fuchs. 1899 (-)    |     |     | P |

## CHLEOPHORINAE

Earias Hbn. 1825

- 4567 E. clorana L. 1761 (1254) J ✓ S ✓ P  
 4568 E. vernana Hbn. 1799 (1253) P

Bena Billb. 1820

- 4570 B. prasinana L. 1758 (1255) J ▽ S ⤴ P

Pseudoips Hbn. 1822

- 4571 P. fagana F. 1781 (-) J ▽ P

## PLUSIINAE

Abrostola O. 1816

- 4574 A. triplasia L. 1758 (725) J - S V ✓ P  
 4576 A. trigemina Wernb. 1864 (723) J ▽ S P

Euchalcia Hbn. 1821

- 4578 E. variabilis  
 Piller & Mitterpacher 1783 (729) J - S ⤴ P  
 4580 - E. modesta Hbn. 1786 (730) TR P

Polychrysia Hbn. 1821

- 4581 P. moneta F. 1787 (728) J ⤴ S ✓ P

Lamprotes Reichenbach 1817

- 4582 - L. c-aureum Knoch 1781 (726) R L P (39)

Panchrysia Hbn. 1821

- 4583 P. deaurata Esp. 1787 (727) TR L J ^ P

Diachrysia Hbn. 1821

- 4585 D. chrysitis L. 1758 (731) J ▽ P  
 4586 D. chryson Esp. 1789 (733) R L J ▽ S ✓ P

Macdunnoughia Kostrowicki 1961

- 4587 M. confusa Stph. 1850 (738) J ▽ S ✓ P

Plusia O. 1816

- 4588 P. festucae L. 1758 (736) L P

Autographa Hbn. 1821

- 4590 A. gamma L. 1758 (741) J ⤴ S ⤴ V ^ P  
 4591 A. pulchrina Hw. 1809 (739) J ⤴ S ✓ V - P  
 4592 A. jota L. 1758 (740) J ▽ S ✓ P  
 4593 A. bractea D. & S. 1775 (734) J ⤴ S ▽ V - P  
 4594 A. aemula D. & S. 1775 (735) J ^

Syngrapha Hbn. 1821

- 4595 S. interrogationis L. 1758 (743) R J ⤴ V -

Trichoplusia McDunnough 1944

- 4599 T. ni Hbn. 1803 (742) R S ✓ P  
 4601 - T. orichalcea F. 1775 (732) P

CATOCALINAE

Catocala Schrank 1802

- 4604 C. sponsa L. 1767 (759) J - P  
 4606 C. fraxini L. 1758 (753) J ✓ S ✓ P  
 4607 C. nupta L. 1767 (757) J ✓ S ^ P  
 4608 - C. elocata Esp. 1788 (755) R P  
 4609 C. promissa D. & S. 1775 (760) R J ✓ P  
 4610 C. electa Vieweg 1790 (754) J ✓ P  
 4613 C. puerpera Giorna 1791 (756) S ✓ V ✓ P

Ephesia Hbn. 1818

- 4618 E. fulminea Scop. 1763 (761) J ✓ P

Minucia Moore 1885

- 4619 M. lunaris D. & S. 1775 (750) J ✓ Vu S ✓ P

Dysgonia Hbn. 1823

- 4622 D. algira L. 1767 (747) TL S ✓ P

Callistege Hbn. 1823

- 4625 C. mi Cl. 1759 (748) L J ✓ S - P

Euclidia O. 1816

- 4626 E. glyphica L. 1758 (749) J ✓ S ✓ P

OPHIDERINAE

Catephia O. 1816

- 4628 C. alchymista D. & S. 1775 (752) R P

Aedia Hbn. 1823

- 4630 A. funesta Esp. 1786 (751) J ✓ S ✓ P

Tyta Billb. 1820

- 4631 T. luctuosa D. & S. 1775 (704) J ✓ S ✓ V ✓ P

Lygephila Billb. 1820

- 4633 L. pastinum Tr. 1826 (766) J ✓ S ^ V - P  
 4634 L. viciae Hbn. 1822 (767) R J ✓ S -  
 4635 L. cracca D. & S. 1775 (768) J ✓ S ✓ P  
 - ?- L. limosa Tr. (769) (40)

Autophila Hbn. 1823

- 4638 A. dilucida Hbn. 1808 (763) R S ✓ P

|      |                                          |                |                               |   |
|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
|      | <u>Apopestes</u> Hbn. 1823               |                |                               |   |
| 4641 | <u>A. spectrum</u> Esp. 1787 (762)       | R              |                               | P |
|      | <u>Scoliopteryx</u> Germar 1811          |                |                               |   |
| 4642 | <u>S. libatrix</u> L. 1758 (720)         | J <sub>✓</sub> | S - V -                       | P |
|      | <u>Calyptra</u> O. 1816                  |                |                               |   |
| 4643 | <u>C. thalictri</u> Bkh. 1790 (721)      |                | Vu S <sub>✓</sub>             |   |
|      | <u>Laspeyria</u> Germar 1811             |                |                               |   |
| 4644 | <u>L. flexula</u> D. & S. 1775 (770)     | J <sub>✓</sub> |                               | P |
|      | <u>Colobochyla</u> Hbn. 1825             |                |                               |   |
| 4645 | <u>C. salicalis</u> D. & S. 1775 (-)     | J <sub>✓</sub> |                               | P |
|      | <u>Parascotia</u> Hbn. 1825              |                |                               |   |
| 4646 | <u>P. fuliginaria</u> L. 1761 (771)      | J <sub>✓</sub> | S ^                           | P |
|      | <u>Epizeuxis</u> Hbn. 1818               |                |                               |   |
| 4648 | <u>E. calvaria</u> D. & S. 1775 (772)    | J <sub>✓</sub> |                               | P |
|      | <u>Phytometra</u> Hw. 1809               |                |                               |   |
| 4650 | <u>P. viridaria</u> Cl. 1759 (718)       |                | S <sub>✓</sub> V <sub>✓</sub> | P |
|      | <u>Rivula</u> Gn. 1845                   |                |                               |   |
| 4651 | <u>R. sericealis</u> Scop. 1763 (717)    |                | S <sub>✓</sub>                | P |
|      | HYPENINAE                                |                |                               |   |
|      | <u>Macrochilo</u> Hbn. 1825              |                |                               |   |
| 4653 | <u>M. cribrumalis</u> Hbn. 1793 (782bis) |                |                               | P |
|      | <u>Polypogon</u> Schrank 1802            |                |                               |   |
| 4655 | <u>P. tentacularia</u> L. 1758 (781)     | J -            | S <sub>✓</sub> V ^            | P |
|      | <u>Pechipogo</u> Hbn. 1825               |                |                               |   |
| 4657 | <u>P. strigilata</u> L. 1758 (783)       |                | S <sub>✓</sub>                | P |
|      | <u>Herminia</u> Lat. 1802                |                |                               |   |
| 4659 | <u>H. tarsipennalis</u> Tr. 1835 (774)   | J <sub>✓</sub> | S <sub>✓</sub>                | P |
| 4660 | <u>H. lunalis</u> Scop. 1763 (773)       |                | Vu                            | P |
| 4661 | <u>H. tarsicrinalis</u> Knoch 1782 (775) | J <sub>✓</sub> | S <sub>✓</sub>                | P |
| 4662 | <u>H. zelleralis</u> Wocke 1850 (777)    | TL             | S <sub>✓</sub>                |   |
| 4664 | <u>H. nemoralis</u> F. 1775 (776)        | R              |                               | P |
|      | <u>Trisateles</u> Tams 1939              |                |                               |   |
| 4665 | <u>T. emortualis</u> D. & S. 1775 (778)  | R J -          |                               | P |
|      | <u>Paracolax</u> Hbn. 1825               |                |                               |   |
| 4666 | <u>P. derivalis</u> Hbn. 1796 (782)      | J <sub>✓</sub> |                               | P |

Hypena Schrank 1802

|      |                                       |    |     |     |   |
|------|---------------------------------------|----|-----|-----|---|
| 4667 | <u>H. crassalis</u> F. 1787 (784)     | TL | J - | V ^ | P |
| 4668 | <u>H. rostralis</u> L. 1758 (788)     |    | J ^ |     | P |
| 4669 | <u>H. proboscidalis</u> L. 1758 (785) |    | J ▾ | S - | P |
| 4671 | <u>H. obesalis</u> Tr. 1828 (786)     |    | J ▾ | S ^ | P |

Hypenodes Dbld. 1850

|      |                                       |  |  |  |   |
|------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 4674 | <u>H. turfosalis</u> Wocke 1850 (791) |  |  |  | P |
|------|---------------------------------------|--|--|--|---|

Schrankia Hbn. 1825

|        |                                            |   |  |  |   |
|--------|--------------------------------------------|---|--|--|---|
| 4676   | <u>S. taenialis</u> Hbn. 1809 (789)        | R |  |  | P |
| 4677 - | <u>S. costaestrigalis</u> Stph. 1834 (790) |   |  |  | P |

## Notes

- (19) L'espèce-type ne se trouve pas dans nos contrées. C'est seulement la sous-espèce mentionnée qui est indigène.
- (20) Cette espèce nouvelle a été décrite en 1984 par Dufay qui l'a séparée de C. alpestris et C. ocellina. Actuellement une seule capture est sûre pour le bassin genevois, elle vient du Crêt de la Neige (coll. de Bros).
- (21) Cette espèce provient de la région du lac des Rousses (coll. Hächler). Le lac des Rousses, biotope humide assez particulier du Jura, est, d'après les limites géographiques assignées à notre travail, en dehors du bassin genevois. Sa faune est assez particulière et l'inclusion de cette espèce dans notre catalogue est peut-être discutable.
- (22), (23), (24), (25) Voir note (19).
- (26) Il est étonnant que cette Cucullia de plaine, qui n'était pas mentionnée comme rare, n'ait plus été trouvée ces dernières années.
- (27) L'espèce V. oleagina figurait sur le premier catalogue de Rehfoos et Romieux. Cela devait être une erreur, car cette espèce est nettement méridionale.
- (28) Parmi les exemplaires de T. flammea du Muséum de Genève, M. Hächler a trouvé un exemplaire appartenant en fait à l'espèce voisine T. crassicornis. Il convient donc de vérifier les déterminations de ce groupe.
- (29) M. de Bros m'indique une référence de capture concernant P. gemmea aux Voirons (1964).
- (30) D'après Rezbanyai (1983), il faut considérer A. dujardini comme une sous-espèce de A. nitida. L'espèce se trouve en Europe orientale et dujardini en est la sous-espèce atlanto-méditerranéenne qui se retrouve à Genève.
- (31) Bien que ne l'ayant pas capturé lui-même, M. de Bros se dit certain que A. berbera svenssoni se trouve dans la région genevoise, confondu avec une autre espèce.
- (32) Voir note (19)
- (33) Dans le catalogue de Martin & Rehfoos (1958), il était mentionné M. struvei qui n'est qu'une sous-espèce selon Vorbrodts de M. secalis. Nous avons donc incorporé les indications de M. struvei dans M. secalis.



- (34) Nouvelle espèce décrite en 1983 par Remm et séparée de M. secalis. Quelques captures au piège lumineux à Sézenove (Mme Maier) sont sûres. Voir Rezbanyai-Reser (1984) pour la situation en Suisse. Il convient donc de redéterminer les séries de M. secalis.
- (35) Voir note (19). D'autre part, dans le même genre, A. fucosa et A. lucens, faisant partie de la faune suisse, pourraient se retrouver dans le bassin genevois (de Bros).
- (36) Cette espèce est mentionnée avec une seule capture de Bel-Air, 1940 (Dr. Morel) dans la liste de Martin et Rehfoos.
- (37) Espèce nouvelle pour la faune suisse signalée par Rezbanyai-Reser (1983) et trouvée à Sézenove (Mme Maier).
- (38) Il se pourrait, selon M. Hächler, que l'espèce C. flavirena, très proche de C. selini, soit présente dans la région. Il conviendrait ici encore de vérifier les déterminations.
- (39) L. c-aureum, infondée au Thalictrum, dont quelques toutes petites stations étaient connues, semble avoir disparu. Si les quelques pieds de la plante nourricière ont disparu, il pourrait s'agir d'un cas de véritable disparition d'une espèce dans notre faune.
- (40) Cette espèce, mentionnée dans le premier catalogue de Rehfoos et Romieux, n'a pas été reprise dans celui de Martin et Rehfoos. Nous la mentionnons quand même, bien que sa capture n'ait plus été rapportée et qu'elle n'ait pas été trouvée au catalogue de Leraut.