

Zeitschrift:	Bulletin romand d'entomologie
Herausgeber:	Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève
Band:	11 (1993)
Heft:	2
Artikel:	Note sur la présence de <i>Xylomya maculata</i> (Meig., 1804) et de <i>Clitellaria ephippium</i> (Fabr., 1775) dans la région neuchâteloise (Diptera: Xylomyidae, Stratiomyidae)
Autor:	Haenni, Jean-Paul
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-986409

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Note sur la présence de *Xylomya maculata* (Meig., 1804) et de *Clitellaria ephippium* (Fabr., 1775) dans la région neuchâteloise (Diptera: Xylomyidae, Stratiomyidae).

par Jean-Paul HAENNI, Musée d'histoire naturelle,
rue des Terreaux 14, CH-2000 Neuchâtel

Abstract On the presence of *Xylomya maculata* (Meig., 1804) and *Clitellaria ephippium* (Fabr., 1775) in the Neuchâtel region (NW Switzerland) (Diptera: Xylomyidae, Stratiomyidae).

These 2 rare and endangered species of large saproxylic Brachycera are reported from the vicinity of Neuchâtel where they have been collected recently at the edge of a thermophilous forest. *X. maculata* is apparently new to the Swiss fauna.

La crête rocheuse dominant le flanc sud du vallon de l'Ermitage et limitant immédiatement la ville de Neuchâtel dans le secteur de la rue G.-A. Matile est encore occupée à son sommet (550 m) par quelques lambeaux de forêt thermophile (chênaie buissonnante) - rappel modeste de la mosaïque de chênaie buissonnante et de garide recouvrant, à quelques centaines de mètres de là, le flanc exposé au sud du vallon de l'Ermitage, localité bien connue des naturalistes neuchâtelois pour sa flore et sa faune riche en espèces subméditerranéennes. Le versant exposé au nord de cette même crête, plus escarpé, entrecoupé de petites parois rocheuses et d'éboulis moussus, est recouvert quant à lui d'une forêt thermophile plus fraîche et plus élevée où prédominent les tilleuls, les chênes et les hêtres avec un sous-bois clairsemé de noisetiers. Restée pratiquement inexploitée depuis fort longtemps, cette bande de forêt recèle de vieux arbres plus ou moins déperissants et paraît héberger une riche faune entomologique saproxylique, comme

en témoignent les captures récentes des deux espèces de Diptères signalées dans la présente note.

Xylomya (= *Solva*) *maculata* (Meigen, 1804)

J'ai capturé un mâle de cette élégante mouche noire et jaune à allure d'Hyménoptère sur la crête sud du vallon de l'Ermitage, en lisière de forêt, en juin 1993. Sa larve, prédatrice, se développe dans les parties vermoulues (en particulier sous les écorces) des feuillus, chênes, ormes, peupliers ou sorbiers (Dušek & Rozkošný, 1963).

L'espèce a une vaste distribution européenne, à l'exclusion des régions méditerranéennes et nordiques, mais elle est devenue très rare et ne subsiste que par îlots dans de vieilles forêts abritant encore une faune saproxylique bien différenciée (Speight, 1989). A ma connaissance, cette espèce de grande taille, aux couleurs et à l'allure frappantes, n'avait jamais encore été signalée de notre pays dans la littérature entomologique et il s'agit donc d'une espèce nouvelle pour la faune de Suisse.

Matériel. Suisse-NE: Neuchâtel (Matile, 61), 561.8/205.5, 550 m, lisière de forêt thermophile (contre une fenêtre) 27.VI.1993, 1 ♂, J.-P. Haenni; (dans la collection de l'auteur, au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, MHNN).

Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775)

A deux reprises, en juin 1991 et en mai 1993, j'ai capturé cette grande et belle espèce noire à ailes enfumées et mesonotum à pilosité rouge, dans la région du vallon de l'Ermitage, la première fois sur le versant exposé au sud, en lisière de chênaie et la seconde fois sur la crête sud du vallon, au même emplacement que *Xylomya maculata*. La larve de cette espèce, à développement très lent, a régulièrement été trouvée dans les nids de la fourmi *Lasius fuliginosus*, construits dans le bois mort ou à la base des vieux arbres.

C. ephippium a une vaste répartition en Europe moyenne mais elle y est devenue aujourd'hui extrêmement rare (Speight, 1989) alors

qu'elle était apparemment répandue il y a un siècle. En Suisse par exemple, Schoch (1889) la cite de plusieurs régions basses de notre pays (Zurich, Genève, Argovie, Grisons) et la donne même comme fréquente au Valais. Blöchliger (1990) mentionne également des captures datant d'un siècle du canton de Thurgovie.

Matériel. Suisse-NE: Neuchâtel (Ermitage), 561.2/205.5, 570 m, lisière de forêt thermophile (au filet), 5.VI.1991, 1 ♀, J.-P. Haenni; Neuchâtel, (Matile 61), 561.8/205.5, 550 m, lisière de forêt thermophile (sur le sol), 25.V.1993, 1 ♀, J.-P. Haenni; (les 2 spécimens dans la collection de l'auteur, MHNN).

Tant *X. maculata* que *C. ephippium* figurent dans la liste des *Espèces d'insectes saproxyliques utiles à l'identification des forêts d'importance internationale dans le domaine de la conservation de la nature* publiée en annexe du travail déjà cité de Speight (1989). Leur découverte à Neuchâtel montre que le versant «oublié» du vallon de l'Ermitage mérite lui aussi l'attention des entomologistes et qu'il est digne de protection au même titre que le versant exposé au sud avec sa cohorte d'espèces méridionales.

Bibliographie

- Blöchliger, H. 1990. Fliegen und Mücken des Kantons Thurgau (Diptera). I. Teil. Mitt. thurg. naturf. Ges. **50** : 105-120.
Dušek, J. & Rozkošný, R. 1963. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der ČSSR I. Acta Soc. ent. Čechoslov. 60 : 201-221.
Schoch, G. 1889. Miscellanea entomologica. II. Prolegomena zur Fauna Dipterorum Helvetiae. Wiss. Beil. Progr. Kantonschule Zürich 1889 : 24-40.
Speight, M.C.D. 1989. Les invertébrés saproxyliques et leur protection. Sauvegarde de la nature 42. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 76 pp.