Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie

Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève

Band: 19 (2001)

Heft: 2

Artikel: Prolongement de la période de vol de certains Odonates en octobre

2001

Autor: Monnerat, Christian

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-986278

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Prolongement de la période de vol de certains Odonates en octobre 2001.

par Christian MONNERAT, Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), Terreaux 14, CH-2000 Neuchâtel christian.monnerat@cscf.unine.ch

Abstract: An extension of the flying period during October 2001 was established for several species, especially for three zygopters: Ischnura elegans, I. pumilio, Enallagma cyathigerum. This is due to the combination of two factors. First, bad weather conditions in September have probably not influenced mortality of individuals. Second, very favorable conditions for Dragonflies were observed in October. Data from 2001 are compared with 4990 observations made between 1989 and 2000, among which 99 were obtained after October 1st.

Résumé: Un prolongement de la période de vol de certaines espèces, notamment de trois zygoptères, *Ischnura elegans*, *I. pumilio*, *Enallagma cyathigerum* au cours du mois d'octobre 2001 a été mis en évidence. Cette situation est liée à deux facteurs conjugués. Premièrement, les mauvaises conditions météorologiques qui ont prévalu du 30 août au 25 septembre n'ont probablement eu que peu de conséquences sur la mortalité des individus. Deuxièmement, des conditions très favorables à l'activité des libellules ont été enregistrées durant l'ensemble du mois d'octobre. Les données de l'année 2001 sont comparées à 4990 données collectées entre 1989 et 2000 dont 99 réalisées dès le 1er octobre.

Introduction

La fin du mois de septembre voit habituellement un appauvrissement marqué du nombre d'espèces d'Odonates. Les espèces

estivales arrivent en fin de vie et peu d'entre elles supportent les premières gelées automnales consécutives.

D'après la synthèse de JÖDICKE (1998) qui concerne l'Europe centrale, 19 espèces de libellules ont été signalées après le 15 octobre et certaines peuvent encore avoir une activité reproductrice jusqu'en novembre.

Matériel et méthodes

Les conditions météorologiques favorables du mois d'octobre 2001 nous ont incité à poursuivre nos visites dans certains sites.

Les observations de l'automne 2001 sont discutées et comparées avec les données de la littérature (JÖDICKE, 1991; JÖDICKE, 1998, STERNBERG & BUCHWALD, 1999; STERNBERG & BUCHWALD, 2000) et celles que nous avons collectées dès 1989 dans le canton du Jura. Entre 1989 et 2000, il s'agit au total de 4990 données, dont 99 réalisées dès le 1^{er} octobre.

Observations 2001

Nous mentionnons l'ensemble des données pour les espèces inhabituelles et ne donnons que le nombre d'observations pour les espèces régulières après le 1.10. Les sites visités se situent en majorité dans le canton du Jura. Nous avons intégré nos observations provenant des cantons de Neuchâtel et Vaud.

Les abbréviations ont les significations suivantes: sba. = immature, ad. = adulte, m. = mâle, f. = femelle, tan. = tandem, acc. = accouplement, pon. = ponte.

Calopteryx s. splendens

Porrentruy JU, Etang Corbat, 430 m: 1 f. le 2.10. Porrentruy JU, Grand'Fin, 430 m: 1 m. le 14.10.

Enallagma cyathigerum

Bonfol JU, Champs de Manche, 440 m: 1 m., 1 tan. le 14.10.

Courfaivre JU, La Graiveratte, mare, 460 m: 3 m. le 13.10.

Damphreux JU, Les Coeudres, 430 m: 1 m. le 6.10; 2 m. le 7.10.

La Brévine NE, Lac des Taillères, 1036 m: 20 m. le 12.10

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 nord, 430m: 50 m., 10 tan. le 2.10; 30 m., 3 tan. le 14.10; 40 m. le 27.10; 1 m. le 3.11.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 sud, 430m: 10 m. le 14.10; 5 m. le 27.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 gouille, 430m: 10 m. le 2.10; 3 m. le 27.10.

Ischnura elegans

Bassecourt JU, La Rouge Eau, 460 m: 5 m., 1 f. le 13.10; 1 m. le 17.10.

Champmartin VD, Trouville, 430 m: 3 m., 2 f. le 16.10.

Coeuve JU, Dos Longeat, 420 m: 2 ad. le 7.10.

Courfaivre JU, La Graiveratte mare, 470 m: 1 m., 1 f. le 13.10; 1 m. le 28.10.

Damphreux JU, Les Coeudres, 430 m: 2 m., 1 acc. le 6.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 nord, 430m: 5 ad. le 2.10; 5 ad. le 14.10; 10 m. le 27.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 sud, 430m: 10 m. le 14.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 gouille, 430m: 10 m. le 2.10; 2 ad. le 5.10; 4 ad. le 14.10; 2 m., 1 f. le 27.10.

Ischnura pumilio

Bassecourt JU, La Rouge Eau, 460 m: 3 m. le 13.10

Porrentruy JU, Grand'Fin, gouilles, 430 m: 2 sba., 15 m., 1 acc. le 2.10; 1 m. le 14.10; 1 m. le 27.10.

Chalcolestes viridis

8 observations concernant 7 sites, dernier le 28.10.

Lestes sponsa

Courfaivre JU, La Graiveratte, 460 m: 3 m. le 13.10.

Les Breuleux JU, Les Chaux, 990 m: 1 m., 1 f. le 11.10.

Sympecma fusca

Encore actif en octobre et début novembre dans trois sites "d'hivernage". Il volait encore le 4.11 à Bonfol JU, En Maitie.

Aeshna cyanea

19 observations dans 17 sites différents, encore 1 m. à moitié dans l'eau le 3.11 à Porrentruy JU, Grand'Fin.

Aeshna grandis

4 observations dans 3 sites différents, encore plus de 10 ad. et quelques pon. le 12.10 à La Brévine NE, Lac des Taillères, 1036 m. Dernier individu le 17.10 à Glovelier JU, Les Montoyes.

Aeshna juncea

11 observations dans 10 sites, encore 1 pon. le 31.10 aux Breuleux JU, Les Chaux, 990 m.

Aeshna mixta

7 observations dans 5 sites, encore 1 pon. le 16.10 à Champmartin VD, Trouville, 430m.

Somatochlora arctica

La Chaux-des-Breuleux JU/ Tramelan BE, La Tourbière, 990 m: 1 ad., 1 acc., 1 pon. le 11.10; 1 ad., 1 m., 1 f. le 17.10.

Orthetrum brunneum

Porrentruy JU, Grand'Fin, gouilles, 430 m: 1 m. le 2.10.

Sympetrum danae

8 observations dans 8 sites, encore 20 m. et 1 tan. le 31.10 aux Breuleux JU, Les Chaux, 990 m.

Sympetrum fonscolombii

Cornol JU, Pré Raisin, 510 m: 1 sba. le 28.10.

Fontenais JU, Le Banné, 500 m: 2 sba. le 2.10, 1 sba. le 27.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 nord, 430m: 5 sba. le 2.10

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 sud, 430m: 2 sba. le 2.10.

Porrentruy JU, Grand'Fin bassin A16 gouille, 430m: 50 sba. le 2.10; 5 sba. le 14.10.

Sympetrum pedemontanum

Porrentruy JU, Grand'Fin, gouilles, 430 m: 1 m. le 14.10; 1 m. le 27.10.

Sympetrum sanguineum

3 observations, les 2 derniers individus le 16.10, pas d'activité de reproduction.

Sympetrum striolatum

30 observations dans 19 sites, encore 1 pon. le 4.11 à Soyhières JU, Les Grands Prés, 470m.

Sympetrum vulgatum

7 observations dans 6 sites, encore 2 m. le 31.10 aux Breuleux JU, Les Chaux, 990 m.

Discussion

Plusieurs espèces de libellules volent en Suisse (MAIBACH & MEIER, 1987) comme en Europe centrale (JÖDICKE, 1991; JÖDICKE, 1998) de manière régulière en octobre et même dans la première quinzaine de novembre. Il s'agit de la majorité des espèces de Sympetrum, de plusieurs espèces du genre Aeshna. A l'exception de certains Lestidae, aucun zygoptère n'est régulier après le mois de septembre.

La liste ci-dessous présente l'ensemble des mentions automnales (dès le 1.10) que nous avons réalisées dans le canton du Jura, entre 1989 et 2000. Elle nous servira d'élément de comparaison avec les données collectées en 2001.

Calopteryx s. splendens

23.10.1999: Courfaivre, Les Petites-Aingles, 465 m, 1 m.

Enallagma cyathigerum

2.10.1995: Glovelier, Etang des Montoyes, 500 m, 3 m., 1 f.

3.10.1990: Coeuve, Dos Longeat, 430 m, 3 ad.

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 3 ad.

23.10.1999: Cornol, Pré Raisin, 520 m, 1 m.

Erythromma viridulum

3.10.1998: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 m.

Sympecma fusca

5.10.1990: Bonfol, Neuf Etang, 440 m, 1 m. 15.10.1999: Cornol, Pré Raisin, 510 m, 1 f.

15.10.1988: Mervelier, La Nou, 660 m, 1 m.

Lestes barbarus

2.10.1999: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 f.

Lestes sponsa

3.10.1990: Coeuve, Dos Longeat, 420 m, 1 m., 1 f.

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 10 m., 5 f.

Chalcolestes viridis

9 données en octobre.

Aeshna cyanea

Avec 19 données entre 1989 et 2000, l'espèce est régulière au cours du mois d'octobre.

Aeshna grandis

2.10.1995: Courfaivre, En Cortio, 470 m, 1 f.

2.10.1995: Glovelier, Les Montoyes, 500 m, 1 f.

2.10. 1995: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 ad.

17.10.1989: Bonfol, Neuf Etang, 440 m, 3 ad.

Aeshna juncea

29.10. 1999: Les Breuleux, Les Chaux, 990 m, 3 pon.

29.10.1999: Courfaivre, La Graiveratte, 470 m, 2 pon.

Aeshna mixta

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 2 m.

4.10.1995: Boécourt, Les Esserts, 500 m, 1 m.

5.10.1990: Bonfol, Les Boulats, 440 m, 1 m.

17.10.1998: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 f.

21.10.1994: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 f.

Anax imperator

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 m.

Crocothemis erythraea

2.10.1999: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 m.

Sympetrum danae

29.10.1999: Les Breuleux, Les Chaux, 990 m, 6 m., 2 acc., 3 pon.

29.10.1999: Courfaivre, La Graiveratte, 460 m, 1 m.

Sympetrum depressiusculum

23.10.1999: Courfaivre, La Graiveratte, 460 m, 1 m.

Sympetrum fonscolombii

3.10.1990: Coeuve, Dos Longeat, 420 m, 15 sba.

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 6 sba.

Sympetrum pedemontanum

17.10.1989: Bonfol, Neuf Etang, 440 m, 1 m.

Sympetrum sanguineum

L'espèce n'est plus noté qu'isolément.

2.10.1999: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 m.

3.10.1990: Damphreux, Les Coeudres, 430 m, 1 ad.

3.10.1990: Coeuve, Dos Longeat, 420 m, 1 ad.

17.10.1989: Bonfol, Neuf Etang, 440 m, 2 m.

Sympetrum striolatum

Avec 30 données entre 1989 et 2000, l'espèce est considérée comme régulière durant tout le mois d'octobre. Accouplements et pontes peuvent être notés jusqu'à la fin octobre et même début novembre, 4.11.2000 à Cornol et Courfaivre.

Sympetrum vulgatum

4 données en octobre.

Comparaison des observations de 2001 avec celles de la période 1989-2000

Dans le canton du Jura, 12 espèces sont considérées comme régulières (tab. 1) après le mois de septembre.

Périodes	1989 - 2000					2001					
Espèces / Décades	01	02	03	N1	N2	01	02	О3	N1	N2	Statut, remarque
Calopteryx s. splendens	-	-	1		-	1	1	-	-	-	exceptionnelle
Enallagma cyathigerum	3	-	1	-	-	4	4	3	1	•	conditions 2001
Erythromma viridulum	1	-	-	-	-		-	•	•	•	exceptionnelle
Ischnura elegans	-	-	-	-	-	5	6	3	•	•	conditions 2001
Ischnura pumilio	-	-	-	-	-	1	2	1	•	-	conditions 2001
Chalcolestes viridis	4	3	2	-	-	4	1	3			régulière
Lestes barbarus	1	-	14	-	-	•	-	-	•	•	exceptionnelle
Lestes sponsa	2	-	-	-	-	-	2	-	•	•	régulière
Sympecma fusca	1	2	-	-	-	1	1	2	2	-	régulière
Aeshna cyanea	9	3	5	-	-	3	7	2	1		régulière
Aeshna grandis	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	régulière
Aeshna juncea	-	-	3	-	•	1	7.	1.	-		régulière
Aeshna mixta	3	1	1	-	-	1	3	-	-	•	régulière
Anax imperator	1	-	-		-		•	-	•	•	exceptionnelle
Somatochlora arctica	-	-	-	-	-	-	2	-	-	•	conditions 2001
Orthetrum brunneum	-	-	•	-	-	1	-	-	•	•	exceptionnelle
Crocothemis erythraea	1	-	-	-	-	-	-	-	•	•	exceptionnelle
Sympetrum danae	-	-	2	-	-	-	4	1	•	•	régulière
Sympetrum depressiusculum	•	-	1		-	-	-	•	-	•	exceptionnelle
Sympetrum fonscolombii	2	-	•	-	-	4	1	2	-	•	régulière
Sympetrum pedemontanum	•	1	-	•	-	-	1	1	•	-	exceptionnelle
Sympetrum sanguineum	3	1	-	•	-	-	1_	-	-	-	régulière
Sympetrum striolatum	9	8	7	2	2	8	11	5	6	•	régulière
Sympetrum vulgatum	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	régulière

<u>Tableau 1.</u> Synthèse du nombre d'observations par décade dans le canton du Jura pour les périodes de 1989-2000 et 2001.

O1-O3 = octobre, N1-N2 = novembre.

Huit espèces ne sont qu'occasionnelles au cours des deux périodes (tab. 1) et les données concernent des individus isolés en fin de vie.

Les observations de Calopteryx s. splendens (23.10.1999), de Erythromma viridulum (3.10.1998) et de Crocothemis erythraea (2.10.1999) sont les plus tardives à notre connaissance en Europe centrale. Celles d'Anax imperator (3.10.1989), et d'Orthetrum brunneum (2.10.2001) sont également très tardives, ces deux espèces estivales ne volent qu'exceptionnellement en octobre.

Au cours du mois d'octobre 2001, *Ischnura elegans*, *I. pumilio* et *Enallagma cyathigerum* étaient encore observés en effectifs importants, certains individus présentant même des comportements reproducteurs. Ces espèces, à l'exception de *E. cyathigerum* noté à 4 reprises en

octobre entre 1989 et 2000, sont en Europe centrale rarement observées en octobre (JÖDICKE, 1998; STERNBERG & BUCHWALD, 1999; STERNBERG & BUCHWALD, 2000). Les données de *I. pumilio* (27.10.2001) et de *E. cyathigerum* (3.11.2001) sont les plus tardives connues pour cette région. Cette situation exceptionnelle s'explique pour ces espèces par le prolongement de la période de vol rendue possible par les conditions météorologiques.

Somatochlora arctica volait encore à 990 mètres d'altitude à La Chaux-des-Breuleux JU/Tramelan BE les 11 et 17.10 et une activité reproductrice a été notée. Il s'agit des données les plus tardives pour la Suisse, les données d'octobre étant exceptionnelles: 1 le 1.10.1997 (WILDERMUTH, 1998) et 2 le 9.10.1988 au Cachot NE (VON BALLMOOS, 1989). L'observation la plus tardive en Europe centrale date du 18.10.1986 (STERNBERG & BUCHWALD, 2000).

Les émergences des 2^{èmes} générations de *Ischnura pumilio* et *Sympetrum fonscolombii* ayant été stoppées durant près d'un mois, elles ont pu se poursuivre avec les températures du début octobre.

L'observation d'individus émergeant de *I. pumilio* en octobre n'a jamais été relatée en Europe centrale. Les adultes sont considérés comme exceptionnel dès le mois de septembre et jusqu'à la première décade d'octobre, mais sans date précise (STERNBERG & BUCHWALD, 1999).

S. fonscolombii est connu pour émerger encore en octobre (LEMPERT, 1997; JÖDICKE, 1998; obs. pers.). L'hypothèse d'un retour des immatures de S. fonscolombii dans le sud de l'Europe comme chez certains Rhopalocères (Vanessa atalanta, V. cardui) a été proposée par LEMPERT (1997). Les observations d'octobre de jeunes adultes dans des secteurs de maturation (friches) comme à Fontenais JU et Cornol JU semblent indiquer que cette situation n'est pas généralisable. Il est probable que ces individus ne survivent pas aux premiers gels.

Ce prolongement de la période de vol trouve deux explications.

Les mauvaises conditions météorologiques qui ont prévalu du 30 août au 25 septembre, caractérisées par des précipitations régulières et

des températures maximales souvent inférieures à 15°C, ont empêché presque toute activité, durant plus de trois semaines, à l'exception de 4 ou 5 demi-journées. Malgré des températures basses, les gels nocturnes ont été exceptionnels, au plus deux à trois nuits non consécutives, même à 1000 mètres d'altitude.

Comme l'a relaté VON BALLMOOS (1989) pour *Sympetrum danae* entre le 28.9. au 2.10.1987 au Cachot (Cerneux-Péquignot NE, 1050 m), des gels consécutifs pendant 4 à 5 jours peuvent rapidement décimer les populations de libellules.

Les mauvaises conditions de septembre n'ont eu probablement que peu de conséquences sur la mortalité des libellules. Nous pensons comme cela a été proposé par WILDERMUTH (1998) que l'explication est d'ordre physiologique. L'activité générale des libellules et les échanges internes ont été fortement réduits vu les basses températures, avec des conséquences probables sur le ralentissement du processus de vieillissement.

D'autre part les températures d'octobre ont été largement audessus de la moyenne saisonnière, avec des records de 17°C à 2000 m, 24°C à 1000 m à La Chaux-de-Fonds et 28°C en plaine le 13 octobre! A la fin octobre (27 au 30.10) les températures de 15 à 17°C étaient encore favorables à l'activité de nombreuses espèces. Sur l'ensemble du mois, les températures ont été supérieures de 3°C à la moyenne saisonnière. Il s'agit du mois d'octobre le plus chaud depuis que des mesures sont effectuées. Les premiers jours de novembre (jusqu'au 5.11) ensoleillés, mais plus frais (11-13°C) étaient encore favorables à l'activité des libellules.

En l'absence de données de marquages, nous ne pouvons avoir une information précise sur l'âge des individus. D'après nos données, à l'exception de deux espèces les émergences ne se sont pas poursuivies en octobre.

Les durées de vie connue pour *I. elegans* sont de 42 à 50 jours et de plus de 39 jours pour *E. cyathigerum* (STERNBERG & BUCHWALD, 1999). Les individus observés à la fin octobre auraient dès lors un âge minimum de 2 mois si l'on considère qu'ils ont émergés au plus tôt à la fin août. Les durées de vie seraient donc de l'ordre de

60 jours minimum pour *I. elegans* et *E. cyathigerum* soit supérieures d'au minimum 10 jours par rapport aux données connues.

Remerciements

Nos remerciements s'adressent à Yves Gonseth pour la relecture critique du texte, à Jean-Paul Haenni pour les corrections et propositions d'amélioration du manuscript et à Anthony Lehmann pour la traduction du résumé en anglais.

<u>Bibliographie</u>

- BISCHOF, A. 1971. Die Odonaten des Kantons Graubuenden. Mitt. Entom. Ges. Basel 21: 1-7.
- JÖDICKE, R. 1991. Herbstphänologie mitteleuropäischer Odonaten. 1. Beobachtungen in Oberbayern, Bundesrepublik Deutschland. Opusc. flum. zool. 62: 1-11.
- JÖDICKE, R. 1998. Herbstphänologie mitteleuropäischer Odonaten. 2. Beobachtungen an Niederrhein, Deutschland. Opusc. flum. zool. 159: 1-20.
- LEMPERT, J. (1997). Die Einwanderung von Sympetrum fonscolombei (Selys) nach Mitteleuropa im Jahre 1996 (Anisoptera: Libellulidae). Libellula 16: 143-168.
- MAIBACH, A. & C. MEIER 1987. Atlas de répartition des libellules de Suisse (Odonata). Doc. faun. helv. 4, 228 pp.
- MONNERAT, C. 1993. Etude faunistique des Odonates du canton du Jura et des zones limitrophes. Extrait des Actes 1993 de la Société jurassienne d'Emulation, 100 pp.
- STERNBERG, K. & R. BUCHWALD (1999). Die Libellen Baden-Württembergs. Bd.1. Ulmer, Stuttgart, 469 pp.
- STERNBERG, K. & R. BUCHWALD (2000). Die Libellen Baden-

- Württembergs. Bd. 2. Ulmer, Stuttgart, 712 pp.
- VON BALLMOOS, C. 1989. Contribution à l'étude des Odonates des tourbières ombrogènes peuplement d'un haut-marais du Jura neuchâtelois (vallée de la Brévine). Travail de licence Univ. Neuchâtel, 162 pp.
- WILDERMUTH, H. 1998. Verlängerte Flugzeiten von Somatochlora flavomaculata (Vander Linden) und S. arctica (Zetterstedt): Folge ungewöhnlicher Wetterverhältnisse? (Anisoptera: Corduliidae). Libellula 17: 45-58.