Zeitschrift: Entomo Helvetica : entomologische Zeitschrift der Schweiz

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 14 (2021)

Artikel: Ebaeus collaris Erichson, 1840, nouvelle espèce pour la Suisse

(Coleoptera, Melyridae, Malachiinae)

Autor: Breitenmoser, Stève

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1033290

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ENTOMO HELVETICA 14: 99 – 104, 2021

Note brève

Ebaeus collaris Erichson, 1840, nouvelle espèce pour la Suisse (Coleoptera, Melyridae, Malachiinae)

STÈVE BREITENMOSER

Chemin de Couvaloup 8, CH-1271 Givrins; steve.breitenmoser@bluewin.ch

Abstract: *Ebaeus collaris* Erichson, 1840, a new species for Switzerland (Coleoptera, Melyridae, Malachiinae). — A male of *Ebaeus collaris* Erichson, 1840, was found in 2020 in the fen of the Bucley Nature Reserve at La Rippe (VD) in Western Switzerland. Morphological criteria to distinguish it from *Ebaeus battonii* Pardo Alcaide, 1962, which is found in Switzerland mainly south of the Alps, are described.

Résumé: Un mâle d'*Ebaeus collaris* Erichson, 1840, a été trouvé en 2020 dans le bas-marais de la Réserve naturelle du Bucley à La Rippe (VD) dans l'ouest de la Suisse. Les critères morphologiques permettant de le distinguer d'*Ebaeus battonii* Pardo Alcaide, 1962, présent en Suisse principalement au sud des Alpes, sont donnés.

Zusammenfassung: Ebaeus collaris Erichson, 1840, eine neue Art für die Schweiz (Coleoptera, Melyridae, Malachiinae). – Ein Männchen von Ebaeus collaris Erichson, 1840, wurde im Jahr 2020 im Flachmoor des Naturschutzgebietes Bucley bei La Rippe (VD) in der Westschweiz gefunden. Die morphologischen Kriterien zur Unterscheidung von Ebaeus battonii Pardo Alcaide, 1962, der in der Schweiz vor allem südlich der Alpen vorkommt, sind nachstehend aufgeführt.

Keywords: soft-winged flower beetle, new records, faunistics, Switzerland

Traitée dans la dernière liste commentée des Cleroidea de Suisse par Chittaro & Sanchez (2019), la sous-famille des Malachiinae comporte cinq espèces du genre Ebaeus Erichson, 1840, faisant partie ou ayant appartenu à la faune de Suisse: Ebaeus battonii Pardo Alcaide, 1962, E. flavicornis Erichson, 1840, E. gibbus (Drapiez, 1819), E. pedicularius (Linnaeus, 1758) et E. thoracicus (Geoffroy, 1785). Parmi celles-ci, seul E. battonii comporte à la fois un pronotum de couleur rouge et l'apex des élytres jaune-rougeâtre (y compris les excitateurs). Une espèce très proche d'E. battonii, E. collaris Erichson, 1840, n'avait par contre pas été retenue, car signalée uniquement de la littérature sans que des spécimens soient présents dans les collections suisses (muséales ou privées).

Au cours d'un suivi consacré aux orthoptères à La Rippe (VD) au printemps 2020, la capture d'un spécimen d'*Ebaeus collaris* permet maintenant d'ajouter cette espèce à la liste nationale des Cleroidea:

• 1 \circlearrowleft , Bucley, La Rippe (VD), 500 192/138 799, 07.05.2020, leg., det. & coll. S. Breitenmoser.




Fig. 1. Ebaeus collaris capturé à La Rippe (VD). a) habitus, b) palpes maxillaires, c) excitateurs situés à l'apex des élytres comprenant les grands et petits appendices. (Photos Laurie Magnin et Stève Breitenmoser)

Ce spécimen (Fig. 1) a été capturé au lieu-dit «Bucley» à La Rippe à une altitude de 576 m, dans un bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale, RS 451.33, Annexe 1, objet n° 1465). La Réserve naturelle du Bucley (convention entre Pro Natura Vaud et la Commune de La Rippe) présente une situation thermophile avec une mosaïque de prairies mi-sèches inscrites à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale, OPPPS, RS 451.37, Annexe 1, objet n° 6466), de prairies humides et de bas-marais d'importance nationale. Ces surfaces sont entourées de milieux boisés mixtes constitués principalement de feuillus (Betula spp., Fagus sylvatica L., Quercus spp., Pinus nigra J. F. Arnold et P. sylvestris L., Salix spp., Populus spp.) et comprenant une certaine quantité de bois mort laissé sur place. Au moyen d'un filet fauchoir, l'exemplaire a été obtenu en fauchant la végétation du bas-marais (Fig. 2) qui présente deux associations végétales, le Primulo-Schoenetum ferruginei et le Cirsio-Molinietum juncetosum (Clot 2009, Baudraz et al. 2015). Malheureusement, il n'est pas possible de préciser avec exactitude la plante sur laquelle se situait le spécimen collecté au vu de la méthode utilisée (filet fauchoir). Cette zone présentait également des bourdaines (Frangula alnus Mill.), des saules (Salix spp.) et des repousses de peuplier (Populus spp.) (Fig. 2).



Fig. 2. Bas-marais au Bucley à La Rippe (VD), lieu de capture d'*Ebaeus collaris*. Vue en direction du sud. (Photo S. Breitenmoser)

Les critères morphologiques fournis par Evers (1979), Pardo Alcaide (1962, 1967) et Plata-Negrache (2009) pour le genre *Ebaeus*, ont permis d'identifier le spécimen récolté. Parmi les huit espèces d'*Ebaeus* du groupe *collaris* comportant un pronotum de couleur rouge et l'apex des élytres jaune-rougeâtre (y compris les excitateurs) en Europe centrale (Evers 1979) et dans le bassin méditerranéen occidental (Plata-Nagrache 2009), seules deux espèces ont à la fois les segments antennaires jaunes et sombres ainsi qu'une pubescence des élytres double jaune et sombre: *Ebaeus collaris* et *E. battonii*.

Le spécimen mâle capturé en 2020 à La Rippe a été attribué à *E. collaris* en fonction des caractères suivants :

- tibias postérieurs de couleur jaune-orangée mais assombris à la base (Fig. 1a),
- dernier segment des palpes maxillaires court, épais et largement tronqué à l'extrémité (Fig. 1a, 1b),
- excitateurs : grand appendice de l'extrémité élytrale avec la dent inférieure en forme de lame, séparée du bord par une excavation marginale ; petit appendice (ou appendice interne) lancéolé et modérément dilaté au milieu (Fig. 1c),
- dernier sternite abdominal arrondi-tronqué à son bord arrière et pygidium profondément échancré (Fig. 1a, 1c).

Comme le mentionnent Chittaro & Sanchez (2019), tous les exemplaires d'*Ebaeus* du groupe *collaris* examinés dans les collections muséales suisses correspondent à

E. battonii. Ils notent encore que les spécimens mentionnés sous E. collaris dans la littérature (Stierlin 1883, Favre 1890, Fontana 1925, Fontana 1947) et qui ont pu être retrouvés dans les collections ont été finalement attribués à E. battonii, dont la description en 1962 est postérieure à ces publications. Tous les exemplaires disponibles examinés proviennent du sud des Alpes (13 exemplaires) à l'exception d'un exemplaire du Valais (1 ex., Martigny (VS), leg. & coll. A. Linder, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETH). Ce dernier a été réexaminé en décembre 2020, tout comme deux autres exemplaires provenant du Tessin de la même collection (1 ex., Mendrisio (TI), 6.1950; 1 ex., Lugano (TI), 4.1959). Ces trois exemplaires femelles correspondent à la description d'Ebaeus battonii donnée par Pardo Alcaide (1962, 1967) et Plata-Negrache (2009) : tibias postérieurs sombres sur la face dorsale et ferrugineux sur la face ventrale ; dernier segment des palpes maxillaires allongé et se rétrécissant vers l'extrémité.

E. collaris est une espèce d'Europe plutôt méridionale, connue du sud-ouest de la France (Constantin 2014), d'Autriche, de Croatie, de Grèce, d'Espagne, du Portugal, de Sardaigne et de Russie (Mayor 2007, Chittaro & Sanchez 2019). A propos de la limite septentrionale de sa distribution, signalons qu'un mâle a été photographié en France par Jean-Pascal Grenier dans une zone humide à 600 m près du Lac de Viremont sur la commune de Valzin-en-Petite-Montagne dans le Jura (F-39) le 18.05.2007 (Insecte.org 2020). La date d'observation ainsi que le milieu sont comparables avec ce qui a été observé sur le site suisse du Bucley. Quant à E. battonii, il est connu de Suisse (Allenspach & Wittmer 1979, Mayor 2007, Chittaro & Sanchez 2019), du Bas-Rhin (Callot 2011) et du sud-est de la France (Constantin 2014), d'Italie (Allenspach & Wittmer 1979, Mayor 2007).

Concernant l'écologie de ces deux espèces, seuls de très rares éléments sont connus et publiés. Cela s'explique principalement par le fait que ces deux espèces sont peu fréquentes et rarement observées. Plata-Negrache (2009) mentionne le fait que les larves de Malachiinae sont prédatrices de larves d'insectes dans le bois mort et que les adultes sont quant à eux plutôt floricoles. Pour E. collaris, Plata-Negrache (2009) mentionne une observation faite à Madrid, où de nombreux adultes ont émergés de planches de bois de chênes (trous d'émergence de 2 mm). Il notait que les planches en chêne avaient dû être attaquées par un autre xylophage et que les larves de ce dernier ont servi de nourriture à celles d'E. collaris, qui les a probablement éliminées. Ainsi, d'après les éléments donnés par Plata-Negrache (2009), la larve d'E. collaris, pourrait être considérée comme faisant partie du cortège des coléoptères saproxyliques selon Speight (1989), à l'instar d'autres espèces de Malachiinae (par exemple Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787) qui est présent sur les listes de coléoptères saproxyliques de Schmidl & Bussler 2004, de Möller 2009 et de Bouget et al. 2019). Cependant, Koch (1989) mentionne que les larves du genre Ebaeus sont commensales d'abeilles solitaires des genres Anthophora Latreille, 1803 et Chalicodoma Lepeletier, 1841 et que les adultes sont floricoles. Ces informations sont reprises par Bouget et al. (2019) qui répertorient E. collaris et E. battonii comme étant des espèces non saproxyliques mais commensales d'abeilles solitaires. Allenspach & Wittmer (1979) notent que E. battonii peut être observé en juin-juillet en battant des buissons ou des chênes et qu'un exemplaire a été capturé au piège lumineux à Minusio (TI) en juin 1965. Plata-Negrache (2009) ne fournit pas plus d'informations sur l'écologie de ce dernier.

Ebaeus collaris est une espèce plutôt méditerranéenne, rare et difficilement observable. Etant thermophile et peut-être lié au chêne, il pourrait donc être trouvé à Genève et dans le bassin lémanique, de part et d'autre de son lieu d'observation de 2020. La découverte d'une nouvelle espèce de coléoptère pour la Suisse dans la Réserve naturelle du Bucley à La Rippe, un «hotspot» reconnu pour sa grande richesse faunistique et floristique (voir par exemple Baudraz et al. 2015) et dont les efforts en terme d'entretien par Pro Natura Vaud et la Direction générale de l'Environnement du Canton de Vaud (N+p 2018) sont considérables pour favoriser la biodiversité, est d'autant plus remarquable!

Remerciements

Un tout grand merci à Yannick Chittaro (info-fauna/CSCF) pour toutes les informations concernant la situation des espèces du genre *Ebaeus* en Suisse, les discussions pour permettre la confirmation de l'identification du spécimen et enfin pour l'amélioration notable du manuscrit. Je remercie vivement Robert Constantin (F-Saint-Lô), Benoît Dodelin (F-Lyon) et Gabriele Franzini (I-Milano) pour leurs informations concernant les critères d'identification et la répartition d'*Ebaeus collaris* et *E. battonii* en France et en Italie. Je remercie également Pro Natura Vaud, en particulier Georges Mermillod et Florian Meier qui m'ont fourni les explications concernant le statut, l'historique et le plan de gestion de la Réserve naturelle du Bucley. Je remercie chaleureusement Michel Sartori, Anne Freitag et Laurie Magnin (Musée cantonal de zoologie, Lausanne) pour l'aimable mise à disposition du matériel photographique et l'aide apportée à la réalisation des photos. Enfin, je tiens à remercier la Direction générale de l'Environnement du Canton de Vaud et particulièrement la Division Biodiversité et Paysage (DGE-Biodiv) pour l'intérêt porté à mes recherches sur les coléoptères saproxyliques dans l'ouest vaudois et pour m'avoir délivré les autorisations de captures nécessaires.

Littérature

- Allenspach V. & Wittmer W. 1979. Cantharoidea, Cleroidea, Lymexylonoidea. Insecta Helvetica 4, 139 pp. Baudraz M., Clot F., Magnin-Gonze J. & Toni M.-M. 2015. La Tropaz et Le Bucley, deux bas-marais de l'Ouest vaudois. Bulletin du Cercle vaudois de botanique 44: 51–56.
- Bouget C., Brustel H., Noblecourt T. & Zagatti P. 2019. Les Coléoptères saproxyliques de France. Catalogue écologique illustré. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, (Patrimoines naturels 79), 744 pp.
- Callot H. 2011. Cantharis paradoxa Hicker, 1960, Ebaeus flavicornis Erichson, 1840 et E. battonii Pardo, 1962, trois espèces probablement nouvelles pour la faune de France. Rappel de la présence d'une autre espèce méconnue, Olibrus gerhardti Flach, 1888, dans les Vosges (Coleoptera Cantharidae, Malachiidae et Phalacridae). L'Entomologiste 67(3): 121–123.
- Chittaro Y. & Sanchez A. 2019. Liste commentée des Cleroidea (Coleoptera) de Suisse. Alpine Entomology 3: 141–167. Clot F. 2009. Bilan de l'impact sur la végétation des mesures de gestion prises dans les bas-marais d'importance nationale de Bercher (commune de Burtigny), Cua Boussan (commune de Burtigny), Bucley (commune de La Rippe). Conservation de la nature du canton de Vaud, 24 pp.
- Constantin R. 2014. Dasytidae, Acanthocnemidae, Prionoceridae, Melyridae, Malachiidae. In: Tronquet M. (Coord), Catalogue des Coléoptères de France, pp. 468-477. Perpignan, Association Roussillonnaise d'Entomologie.
- Evers A.M.J. 1979. Familie Malachiidae. In: Freude H., Harde K. W. & Lohse G. A. (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Diversicornia, pp. 53-69. Goecke & Evers, Krefeld.
- Favre E. 1890. Faune des Coléoptères du Valais et des régions limitrophes. Zurcher, Furrer, 448 pp.
- Fontana P. 1925. Contribuzione alla Fauna coleotterologica ticinese III. Bolletino della Società Ticinese di Scienza Naturali 19: 32–56.
- Fontana P. 1947. Contribuzione alla fauna coleotterologica ticinese. Bolletino della Società Ticinese di Scienza Naturali 42: 16–94.
- Insecte.org. 2020. [Ebaeus collaris] Malachiidae. par «JP Grenier» mercredi 19 septembre 2007, 22:34. https://www.insecte.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=24864&hilit=24795 et https://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-24795.htm (Consultation 04.08.2020).
- Koch K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Band 2. Goecke & Evers, Krefeld, pp. 48-49.
- Mayor A. 2007. Dasytidae, Malachiidae. In: Löbl I. & Smetana A. (Eds), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea Derodontoidea Bostrichoidea Lymexyloidea Cleroidea Cucujoidea, pp. 388–454. Apollo Books, Stenstrup, Danemark.

- Möller G. 2009. Struktur- und Substratbindung holzbewohnender Insekten, Schwerpunkt Coleoptera Käfer. Berlin: Freie Universität Berlin, PhD Thesis, 284 pp.
- N+p. 2018. Synthèse sur la gestion des Marais de l'Ouest vaudois. Le Bucley (La Rippe) 13.04.2018. Pro Natura Vaud, Canton de Vaud, n+p biologie, 9 pp.
- Papi R. & Franzini G. 2018. Catalogo dei Malachiidae e Dasytidae del Massiccio del Pratomagno (Preappennino Toscano) (Coleoptera: Cleroidea). Onychium 14: 145–168.
- Pardo Alcaide A. 1962. Malachiidae del Mediterráneo occidental (Coleoptera). Eos 38(2): 263-298.
- Pardo Alcaide A. 1967. Los *Ebaeus* italianos del grupo del collaris. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 22(1): 5–9.
- Plata-Negrache P. 2009. Descripción de *Ebaeus jperezvalcarceli*, especie nueva de España y estudio de los Ebaeus del grupo *collaris* de la cuenca del Mediterráneo occidental (Coleoptera: Malachiidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa 45: 39–52.
- Schmidl J. & Bussler H. 2004. Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands. Einsatz in der landschaftsökologischen Praxis ein Bearbeitungsstandard. Naturschutz und Landschaftsplanung 36(7): 202–218.
- Speight M.C.D. 1989. Les invertébrés saproxyliques et leur protection. Collection Sauvegarde de la nature, N°42, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 77 pp.
- Stierlin G. 1883. Zweiter Nachtrag zur Fauna coleopterorum helvetica. Neue Denkschriften der schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften 8(3): 1–98.