

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 4 (1902)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LA SOMME DES PUISSANCES SEMBLABLES DES RACINES
D'UNE ÉQUATION ALGÈBRIQUE
Autor: Laisant, C.-A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-5584>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SUR LA SOMME DES PUISSANCES SEMBLABLES

DES RACINES D'UNE ÉQUATION ALGÈBRIQUE

1. — L'évaluation de la somme dont il s'agit est de la plus grande importance pour le calcul des fonctions symétriques. Aussi, ce problème est-il devenu classique. Il est résolu dans la plupart des Traités d'Algèbre et figure dans les programmes de nombreux concours.

Invariablement, croyons-nous, le calcul de la somme des puissances semblables, pour des exposants entiers, se fait au moyen des formules de Newton, qui permettent d'obtenir les sommes successives par récurrence. Le moyen n'est assurément pas mauvais, mais il n'en serait pas moins intéressant de donner directement une expression analytique de chacune des sommes cherchées, sans faire intervenir les autres, et de pouvoir indiquer également un procédé de calcul direct. C'est ce qu'il est facile de faire, et ce qui a été fait (car nous ne prétendons pas apporter ici rien de nouveau); mais, en dépit de la simplicité de la méthode, elle semble, du moins en France, n'avoir pas pénétré dans l'enseignement; et c'est ce qui nous engage à publier la présente note; nous avons l'espoir qu'elle pourra intéresser quelques professeurs de Mathématiques spéciales.

2. — Soit $f(x) = 0$ une équation algébrique de degré m , dont les racines sont a_1, a_2, \dots, a_m . Appelons en général S_p la somme $\sum_{i=1}^m a_i^p$, l'exposant p pouvant prendre une valeur entière quelconque, positive ou négative.

Formons la dérivée logarithmique $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\varphi(x)$ du premier

membre de l'équation. Nous avons l'identité

$$-\varphi(x) = \sum \frac{1}{x - a_i}$$

Par dérivations successives, nous en déduisons

$$-\varphi'(x) = -\sum \frac{1}{(x - a_i)^2},$$

$$-\varphi''(x) = 2 \sum \frac{1}{(x - a_i)^3},$$

.....

$$-\varphi^{(p)}(x) = (-1)^p p! \sum \frac{1}{(x - a_i)^{p+1}},$$

.....

Si, dans ces identités, nous venons à faire $x = 0$, il s'ensuit que nous avons d'une façon générale, pour toute valeur entière positive de p ,

$$\varphi^{(p)}(0) = p! \sum \frac{1}{a_i^{p+1}} = p! S_{-(p+1)}.$$

ou

$$S_{-(p+1)} = \frac{\varphi^{(p)}(0)}{p!},$$

ou encore

$$(1) \quad S_{-p} = \frac{\varphi^{(p-1)}(0)}{(p-1)!}.$$

Considérons maintenant l'équation aux inverses des racines, $g(x) = 0$; sa dérivée logarithmique est

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = -\gamma(x) = \sum \frac{1}{x - \frac{1}{a_i}},$$

et de là, en répétant textuellement ce que nous venons de dire plus haut, nous déduirons

$$(2) \quad S_p = \frac{\gamma^{(p-1)}(0)}{(p-1)!}.$$

Les formules (1) et (2) résolvent la question proposée. En outre, nous avons $S_1 = \gamma(0)$, $S_{-1} = \varphi(0)$.

On peut rappeler que la fonction $g(x)$ n'est autre que

$$x^m f\left(\frac{1}{x}\right), \text{ de sorte que } \gamma(x) = \frac{1}{x^2} \frac{f'\left(\frac{1}{x}\right)}{f\left(\frac{1}{x}\right)} - \frac{m}{x}.$$

3. — Si nous développons les fonctions $\varphi(x)$, $\gamma(x)$ suivant la série de Maclaurin, nous avons

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi(0) + x\varphi'(0) + x^2 \frac{\varphi''(0)}{2!} + \dots + x^p \frac{\varphi^{(p)}(0)}{p!} + \dots, \\ \gamma(x) &= \gamma(0) + x\gamma'(0) + x^2 \frac{\gamma''(0)}{2!} + \dots + x^p \frac{\gamma^{(p)}(0)}{p!} + \dots, \end{aligned}$$

c'est-à-dire, en vertu de ce qui précède,

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= S_{-1} + S_{-2}x + S_{-3}x^2 + \dots + S_{-(p+1)}x^p + \dots, \\ \gamma(x) &= S_1 + S_2x + S_3x^2 + \dots + S_{p+1}x^p + \dots, \end{aligned}$$

Or, ces développements s'obtiennent simplement par division, en ordonnant les polynômes suivant les puissances croissantes de la variable. Par conséquent, la division de $-f'(x)$ par $f(x)$ en ordonnant le quotient suivant les puissances croissantes, donnera, comme coefficients de ce quotient, toutes les sommes S_{-p} ; et pareillement, la division de $-g'(x)$ par $g(x)$ donnera les sommes S_p .

4. — En partant de là, on peut très simplement retrouver les formules de Newton.

Soit en effet

$$f(x) = A_0x^m + A_1x^{m-1} + \dots + A_{m-1}x + A_m,$$

d'où

$$g(x) = A_0 + A_1x + \dots + A_{m-1}x^{m-1} + A_mx^m.$$

Pour obtenir les S_p successives, il faut faire la division de $-g'(x)$ par $g(x)$. Or, par le mécanisme même de l'opération, il est visible que le premier terme du quotient ne peut dépendre que de A_0 et A_1 ; le deuxième, que de A_0, A_1, A_2 ; et, en général, le p^e , de A_0, A_1, \dots, A_p .

Par conséquent, pour le calcul de la somme S_p , on peut substituer à l'équation $f(x) = 0$ toute autre qui aurait les mêmes

