

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 7 (1905)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LES DÉVELOPPEMENTS EN SÉRIES de sin x et cos x.
Autor: Barbarin, P.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-8429>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

qu'en réalité il s'agit non pas d'introduire l'ensemble de ces éléments dans les programmes de l'enseignement secondaire supérieur, mais de fournir une première initiation à l'aide de quelques problèmes fondamentaux très simples. Il se déclare entièrement d'accord avec la proposition de M. Suter visant l'introduction de notions historiques dans l'enseignement des classes supérieures et il propose qu'une phrase dans ce sens soit ajoutée au second vœu. L'assemblée décide d'en faire un troisième vœu :

III. *Il est désirable que dans l'enseignement secondaire supérieur, notamment dans les Gymnases, une plus grande place soit accordée au développement historique des Mathématiques.*

Ces trois propositions ont été adoptées à l'unanimité.

SUR LES DÉVELOPPEMENTS EN SÉRIES de $\sin x$ et $\cos x$.

D'après le nouveau programme officiel d'admission à l'Ecole Centrale des arts et manufactures, les développements en séries des fonctions $\sin x$ et $\cos x$, nécessaires pour établir la formule d'Euler et ses conséquences, doivent pouvoir se déduire, par le procédé élémentaire, de l'inégalité

$$x - \sin x < \frac{x^3}{6}.$$

Le raisonnement est bien simple : le voici en quelques mots :

I. Considérons en premier lieu les séries alternées

$$U = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} + \dots,$$

$$V = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} + \dots.$$

Leurs séries modulaires U_1 et V_1 sont convergentes pour toute valeur de x , puisque le rapport $\frac{u_{p+1}}{u_p}$ de la règle de D'Alembert y a toujours zéro pour limite quelle que soit la manière dont p croît indéfiniment; les séries alternées sont donc aussi convergentes. Nous allons prouver que l'on a

$$U = \cos x, \quad V = \sin x.$$

II. Soient

$$S_0 = 1,$$

$$S_1 = 1 - \frac{x^2}{2!},$$

$$S_2 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!},$$

$$S_3 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!},$$

...

$$\Sigma_0 = x,$$

$$\Sigma_1 = x - \frac{x^3}{3!},$$

$$\Sigma_2 = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

$$\Sigma_3 = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!},$$

...

Les fonctions

$$y_0 = S_0 - \cos x,$$

$$y_1 = S_1 - \cos x,$$

$$y_2 = S_2 - \cos x,$$

$$y_3 = S_3 - \cos x,$$

...

$$z_0 = \Sigma_0 - \sin x,$$

$$z_1 = \Sigma_1 - \sin x,$$

$$z_2 = \Sigma_2 - \sin x,$$

$$z_3 = \Sigma_3 - \sin x,$$

...

jouissent des propriétés suivantes :

1° y_p est la dérivée de z_p par rapport à x , et à son tour z_p , est la dérivée de $-y_{p+1}$.

2° Pour toute valeur positive de x , y_0 est positive, donc z_0 est fonction croissante et toujours positive puisqu'elle est nulle pour $x = 0$.

y_1 est donc toujours décroissante et négative, à cause de la même remarque, et il en est de même de z_1 . Par suite y_2 et z_2 sont toujours croissantes et positives, y_3 et z_3 toujours décroissantes et négatives.

En général, pour toute valeur positive de x , les fonctions :

y_{2n} et z_{2n} , nulles pour $x = 0$, sont croissantes et positives,
 y_{2n+1} et z_{2n+1} , nulles pour $x = 0$, sont décroissantes et négatives.

Donc on a

$$\begin{aligned} S_{2n} &> \cos x > S_{2n+1}, \\ \Sigma_{2n} &> \sin x > \Sigma_{2n+1}, \end{aligned}$$

et aussi

$$\begin{aligned} S_{2n+2} &> \cos x > S_{2n+1}, \\ \Sigma_{2n+2} &> \sin x > S_{2n+1}. \end{aligned}$$

Par suite, pour $n = \infty$, x étant positif, on a bien

$$\cos x = U, \quad \text{et} \quad \sin x = V.$$

3° Soit maintenant x négatif. Puisque

$$\cos(-x) = \cos x,$$

et que la série U ne dépend que des puissances paires de x , le premier résultat s'applique à x quelconque.

Ensuite,

$$\sin(-x) = -\sin x,$$

et la série V ne dépendant que des puissances impaires de x , sa somme change de signe également avec x , donc on a en définitive quel que soit x

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} + \dots,$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots.$$

P. BARBARIN (Bordeaux).