Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 10 (1908)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LE PREMIER LIVRE DE LA GÉOMÉTRIE NATURELLE 2

Autor: Andrade, J.

Kapitel: III. — Comparaisons simultanées de 2 côtés d'un triangle et de leurs

angles opposés.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-10975

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Théorème. — L'angle extérieur d'un triangle est supérieur à tout angle intérieur qui n'a pas même sommet que lui.

Faisons voir par exemple que: (Fig. 23) XAC > ACB. Joignons le troisième sommet B au milieu D de AC et prolongeons BD d'une longueur égale en DB', joignons B' à A, la droite AB' sera située dans l'angle extérieur DAX; les angles opposés par le sommet BDC et ADB' valent Fig. 23. chacun 2 droits diminués de l'angle ADB ils




sont donc égaux; alors les deux triangles ADB' et BDC ayant un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, sont égaux; et par suite les angles opposés respectivement à DB' et BD côtés égaux, seront égaux; ainsi B'AD = DCB; mais B'AD est portion de l'angle extérieur CAX, donc enfin on a bien:

$$\widehat{XAC} > \widehat{ACB}$$
.

III. — Comparaisons simultanées de 2 côtés d'un triangle et de leurs angles opposés.

Théorème. — Si deux côtés d'un triangle sont inégaux les angles opposés à ces côtés sont inégaux dans le même ordre de taille.

Comparons (Fig. 24) les deux côtés AB et AC du triangle ABC; soit le côté AC > AB. Prenons sur AC un segment AD = AB et



joignons BD; l'angle ADB = ABD (puisque le triangle ABD à deux côtés égaux); l'angle ADB extérieur est plus grand que l'angle DCB du triangle partiel BDC; l'angle ABD portion de l'angle ÁBC est donc plus grand

que l'angle ACB, donc à plus forte raison l'angle total ABC dépassera-t-il ACB.

Тне́опѐме (réciproque du précédent). — Si deux angles d'un triangle sont inégaux, les côtés opposés à ces angles sont inégaux et dans le même ordre de taille.

Soient (sans figure) \widehat{A} et \widehat{B} deux angles d'un triangle et soient: a et b les côtés respectivement opposés à ces angles; je dis que l'inégalité $\widehat{A} > \widehat{B}$ entraînera comme conséquence l'inégalité a > b.

En effet, en comparant a et b, trois cas peuvent seuls se présenter; ou bien 1° : a < b, ou bien 2° : a = b; ou bien 3° : a > b; or le cas de a < b entraînerait, d'après le théorème précédent A < B et le cas de a = b entraînerait comme nous l'avons vu, au début de ces leçons A = B. Ces deux suppositions provisoires a < b et a = b entraîneraient donc des conséquences contradictoires avec l'hypothèse; on aura donc bien a > b tout comme on avait d'abord A > B.

Remarque. — Ce genre de raisonnement est ce qu'on nomme un raisonnement par l'absurde.

IV. — Un côté d'un triangle est plus petit que la somme des deux autres.

Il n'y a lieu à démonstration que si le côté considéré n'est pas le plus petit de tous, soit alors (Fig. 25) AB > AC. Prolon-




Fig. 25.

geons AC d'une longueur CD, de manière que AD = AB, joignons BD; envisageons d'une part le triangle isocèle ABD et d'autre part le triangle CBD. Dans ce dernier, l'angle CBD portion de ABD sera plus petit que celuici ou que son égal CDB; on a donc un triangle

CBD dans lequel CDB > CBD; on peut donc affirmer, d'après le théorème précédent, que CD < CB; ABAD se composant de AC et de CD sera donc moindre que AC + CB.

V. — Comparaison de deux triangles qui ont deux côtés égaux chacun à chacun comprenant deux angles inégaux.

Théorème. — Si deux triangles ont deux côtés égaux chacun à chacun comprenant un angle inégal, les côtés opposés à cet angle dans les deux triangles seront inégaux et dans le même ordre de taille.