

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 12 (1910)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** NOTE SUR LES USAGES DU PAPIER QUADRILLÉ  
**Autor:** Sainte Laguë, A.  
**Kapitel:** § 3. — Applications diverses des propriétés des points entiers.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-12772>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 25.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

bre, réel ou imaginaire, a, sont les sommets d'un quadrillage ayant pour base le segment OA qui joint l'origine au point A, affixe de a.

### § 3. — Applications diverses des propriétés des points entiers.

Les applications à l'arithmétique de la théorie des points entiers sont très nombreuses. Nous serons obligés de faire un choix parmi elles, et de donner simplement quelques exemples de ces diverses applications.

Etant donné la courbe  $f(x, y) = 0$  ou plus généralement  $f(x, y, a) = 0$  représentée par une équation homogène, a désignant par exemple une longueur de la figure, tout point




Fig. 8.




Fig. 9.

entier de cette courbe donnera une solution en nombres entiers de l'équation  $f(x, y, a) = 0$ . Un point commensurable de coordonnées  $\frac{x}{k}, \frac{y}{k}$  donnera une solution en nombres entiers de  $f(x, y, ka) = 0$ . Citons un exemple de ce genre d'applications : Prenons une droite fixe  $\Delta$  qui sera une ligne verticale du quadrillage et 2 points O et F, symétriques par rapport à  $\Delta$ , et entiers. Prenons un point M commensurable variable sur  $\Delta$ , menons MN, perpendiculaire en M à FM, (fig. 9) et abaissons enfin ON perpendiculaire sur MN. Il est facile de voir que les coordonnées de N sont commensurables. Le lieu de ce point est d'ailleurs une strophoïde. On aura donc des solutions en nombres entiers de l'équation

$$x(x^2 + y^2) = ka(x^2 - y^2).$$

La plupart de ces applications concernent le carré de la distance de 2 points entiers, nombre qui est un entier, somme de deux carrés. Prenons par exemple la parabole  $y^2 = 4px$ ,  $p$  étant un nombre entier. On aura des points entiers de cette parabole en posant  $y = 2mp$  et par suite  $x = m^2p$ . Soit  $F$  le foyer de cette parabole (fig. 10),  $\Delta$  sa directrice, et  $M$  un point entier de cette conique. On a  $\overline{MF}^2 = \overline{MN}^2$  qui donne une solution en nombres entiers de  $a^2 = b^2 + c^2$ , car  $\overline{MF}^2$  est une somme de 2 carrés. Dans le




Fig. 10.




Fig. 11.

cas de la figure on a :  $p = 1$ ,  $x = 4$ ,  $y = 4$  d'où l'égalité :  $5^2 = 3^2 + 4^2$ .

Prenons 2 points  $M$  et  $N$  (fig. 11) sommets d'un quadrillage de base  $AB$ . Le carré de leur distance est le produit par  $\overline{AB}^2$  d'une somme de 2 carrés, ici  $3^2$  et  $2^2$  car  $NP = 3$ .  $AB$  et  $MP = 2$ .  $AB$ . Mais d'autre part le carré de cette distance est la somme des carrés de  $MQ$  et  $NQ$ . Si l'on remarque enfin que  $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$ , on voit que l'on a démontré le théorème :

*Le produit d'une somme de 2 carrés par une somme de 2 carrés est encore une somme de 2 carrés.*

Dans le cas de la figure on a :  $7^2 + 4^2 = (2^2 + 1^2)(3^2 + 2^2)$

La considération des points entiers, équidistants de 2 points entiers donnés, montrerait qu'un nombre peut être de plusieurs façons une somme de 2 carrés. Nous allons étendre ceci à une somme de 4 carrés. Prenons 2 couples de points diamétralement opposés dans un même cercle  $AB$  et

CD (fig. 12). On peut par exemple les obtenir en prenant à l'aide de quadrillages de base arbitraire un rectangle quelconque : ici le rectangle 2,1 du quadrillage de base 3,1. Soit M un point entier quelconque du plan. L'égalité connue :

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = \overline{MC}^2 + \overline{MD}^2$$

montre qu'un nombre peut s'écrire de plusieurs façons sous forme d'une somme de 4 carrés, car chaque terme, tel que  $\overline{MA}^2$ , est une somme de 2 carrés. On a ici l'égalité :  $1^2 + 6^2$




Fig. 12.




Fig. 13.

$+ 8^2 + 13^2 = 3^2 + 4^2 + 7^2 + 14^2$ . Cette représentation des sommes de 4 carrés permet de résoudre diverses questions. Par exemple si l'on veut trouver 2 sommes de 4 carrés égales et portant sur 8 entiers consécutifs on voit qu'il suffira de partir du carré ABCD (fig. 13). Les points M, N, P, etc... répondent à la question. On a pour le point M :  $2^2 + 5^2 + 7^2 + 8^2 = 3^2 + 4^2 + 6^2 + 9^2$ . Si l'on prend un point tel que Q pour lequel un même carré se retrouve dans les deux membres on aura des égalités concernant les sommes de 3 carrés. Ici :  $2^2 + 6^2 + 7^2 = 3^2 + 4^2 + 8^2$ <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> On obtiendrait de pareilles égalités en considérant le quadrillage « cubique » des points entiers de l'espace : le plan, lieu des points équidistants de 2 points donnés, contient parfois des points entiers pour lesquels on a des sommes de 3 carrés. On peut étendre certaines des propriétés du plan à de tels points entiers mais non toutes. En particulier la représentation par imaginaires du plan ne se retrouve pas dans l'espace. Signalons encore l'impossibilité d'obtenir des quadrillages « cubiques » à bases différentes, si l'on veut que les 3 directions d'un tel quadrillage soient distinctes de celles du premier.