Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 14 (1912)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: EXTRACTION D'UNE RACINE QUELCONQUE D'UN NOMBRE RÉEL

Α

Autor: Baatard, Lucien

Kapitel: II. — \$\sqrt[n]{A}\$ est un nombre irrationnel.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-14281

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Répétant l'opération avec 26, on obtient :

$$\frac{16+5.26}{6}=24$$
 quot. inc. $=\sqrt[6]{191.102.976}$.

2.
$$-\sqrt[4]{131\ 079\ 601}$$

$$a - \alpha = 100 \; ; \qquad 131\ 079\ 601 : 100^3 = 131\ \text{quot. inc.}$$

$$\frac{131 + 3.100}{4} = 107\ \text{quot. inc.} = \sqrt[4]{131\ 079\ 601} \; .$$

3.
$$-\sqrt{4613904}$$

$$a - \alpha = 2000$$
; $4613904 : 2000 = 2306$ quot. inc.
$$\frac{2306 + 2000}{2} = 2153$$
.

Il faut répéter l'opération :

$$4613\ 904: 2153 = 2143\ \text{quot. inc.}$$

$$\frac{2143 + 2153}{2} = 2148 = \sqrt{4613\ 904}.$$

Formule (ω) . Réprésentons par $a \pm \alpha$ une valeur approchée par excès ou par défaut de $\sqrt[n]{A}$ et par p le quotient incomplet de la division de A par $(a \pm \alpha)^{n-1}$.

Il résulte de ce qui précède que le nombre v_4 , donné par la formule (ω)

$$v_1 = \frac{p + (n-1)(a \pm \alpha)}{n}$$
 quot. inc.,

est ou $\sqrt[n]{\overline{A}}$ ou une valeur approchée par excès de $\sqrt[n]{\overline{A}}$.

Si l'on n'obtient pas tout de suite \sqrt{A} , on opère sur e_1 comme sur $a \pm \alpha$ et ainsi de suite.

II. —
$$\sqrt[n]{\overline{A}}$$
 est un nombre irrationnel.

Si l'on représente par x et x+1 les deux nombres consécutifs entre les $n^{\text{ièmes}}$ puissances desquels se trouve A, la formule (ω) donne x ou une valeur approchée par excès de x.

Pour s'en rendre compte, il suffit de poser

$$A = x^n + h$$

et de remplacer a par x dans les calculs précédents; h s'ajoute à R ou R' et la conclusion pour a subsiste pour x.

Ex.: $\sqrt[3]{72000}$

$$a - \alpha = 40$$
; $72\ 000 : 40^2 = 45$; $\frac{45 + 2.40}{3} = 41$ quot. inc. $41^3 = 68\ 921 < 72\ 000$. $42^3 = 74\ 088 > 72\ 000$.

Pour obtenir $\sqrt[n]{A}$ à moins de $\frac{1}{z}$ près, par défaut, on a la relation

$$\sqrt[n]{A} = \frac{1}{z} \sqrt[n]{z^n \cdot A} ;$$

on calcule, comme ci-dessus, $\sqrt[n]{z^n \cdot A}$ à moins d'une unité près, par défaut, et on divise le résultat par z.

Ex.: Soit à calculer $\sqrt[3]{10}$ à moins de $\frac{1}{100}$ près.

$$\sqrt[3]{10} = \frac{1}{100} \sqrt[3]{10000000}$$

$$a - \alpha = 200$$
; $10\ 000\ 000 : 200^2 = 250$; $\frac{250 + 2 \cdot 200}{3} = 216$ quot. inc. $216^2 = 46\ 656$

10 000 000 : 46 656 = 214 quot. inc. ;
$$\frac{214 + 2.216}{3}$$
 = 215 quot. inc. $2.15 = \sqrt[3]{10}$, à moins de $\frac{1}{100}$ près, par défaut.

Utilisation des quotients complets : formule (ω') . En prenant les quotients complets p' et y_4 des divisions qui donnent p et v_4 , on obtient un nombre fractionnaire qui exprime la valeur de $\sqrt[n]{A}$ avec une erreur par excès ; l'application du même calcul à y_4 donnera un nouveau nombre fractionnaire $y_2 > \sqrt[n]{A}$ mais $< y_4$; on obtiendra de même $y_3 > \sqrt[n]{A}$ mais $< y_2$, et ainsi de suite.

Ce calcul se représente par la formule (\omega')

$$y_1 = \frac{p' + (n-1)(a \pm \alpha)}{n} .$$

L'erreur diminue assez fortement quand on passe de l'un de ces résultats au suivant.

A titre d'exemple, reprenons $\sqrt[3]{10}$.

$$a-\alpha=2$$
; $\frac{10}{4}=\frac{5}{2}$; $\frac{\frac{5}{2}+2.2}{3}=\frac{13}{6}=2,1666...$

$$10: \left(\frac{13}{6}\right)^2 = \frac{360}{169}; \qquad \frac{\frac{360}{169} + \frac{2 \cdot 13}{6}}{3} = \frac{3277}{1521} = 2,1545 \dots$$

On sait que $\sqrt[3]{10} = 2,1544$

Racine varrée. L'application des formules (ω) et (ω') à la racine carrée donne lieu à diverses remarques que je laisse de côté dans cet article.

Je me bornerai à démontrer, à l'aide de quelques exemples, la supériorité de (ω') — comme simplicité et rapidité — sur le calcul au moyen du développement de \sqrt{A} en fraction continue.

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \text{etc.}}}$$

Réduites:

$$\frac{1}{4}; \frac{3^*}{2}; \frac{7}{5}; \frac{17^{**}}{12}; \frac{41}{29}; \frac{99}{70}; \frac{239}{169}; \frac{577^{***}}{408}; \frac{1393}{985}; \frac{3363}{2378};$$

$$\frac{8119}{5741}; \frac{19601}{13860}; \frac{47321}{33461}; \frac{114243}{80782}; \frac{275807}{195025}; \frac{665857^{***}}{470832}; \dots$$

$$(\omega')$$

$$\frac{3}{2}; \frac{17}{12}; \frac{577}{408}; \frac{665857}{470832}; \dots$$

$$\sqrt[3]{3} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \text{etc.}}}$$

Réduites:

$$\frac{1}{1}; \frac{2^*}{1}; \frac{5}{3}; \frac{7^{**}}{4}; \frac{19}{11}; \frac{26}{15}; \frac{71}{41}; \frac{97^{***}}{56}; \frac{265}{153}; \frac{362}{209}; \frac{989}{571};$$

$$\frac{1351}{780}; \frac{3691}{2131}; \frac{5042}{2911}; \frac{13775}{7953}; \frac{18817^{****}}{10864}; \dots$$

$$(\omega')$$

$$\frac{2}{1}; \frac{7}{4}; \frac{97}{56}; \frac{18817}{10864}; \dots$$

$$\sqrt{11} = 3 + \frac{1}{3 + \frac{1}{6 + \frac{1}{3}}}$$

$$\frac{1}{3 + \text{etc.}}$$
Béduites:

Réduites:

$$\frac{3}{1}; \frac{10^*}{3}; \frac{63}{19}; \frac{199^{**}}{60}; \frac{1257}{379}; \frac{3970}{1197}; \frac{25077}{7561}; \frac{79201^{***}}{23880}; \dots$$

$$(\omega') \qquad \frac{10}{3}; \frac{199}{60}; \frac{79201}{23880}; \dots$$

$$\sqrt{15} = 3 + 1$$

$$\frac{1}{1 + 1}$$

$$\frac{1}{6 + 1}$$

$$\frac{1}{1 + \text{etc.}}$$

Réduites:

$$\frac{3}{1} ; \frac{4}{1} ; \frac{27}{7} ; \frac{31^{**}}{8} ; \frac{213}{55} ; \frac{244}{63} ; \frac{1677}{433} ; \frac{1921^{***}}{496} ;$$

$$(\omega') \qquad \alpha - \alpha = 3 \qquad \frac{4}{1} ; \frac{31}{8} ; \frac{1921}{496} ; \dots$$

$$\alpha + \alpha = 4 \qquad \frac{31}{8} ; \frac{1921}{496} ; \dots$$

Dans ces exemples, (ω') fournit les réduites de rang 2^m . Ce n'est cependant pas toujours le cas.

Lucien BAATARD (Genève).