**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 14 (1912)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Rubrik: MÉLANGES ET CORRESPONDANCE

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# MÉLANGES ET CORRESPONDANCE

## Une démonstration vectorielle du théorème de Dupin<sup>1</sup>.

Trois surfaces S<sub>4</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> respectivement définies par

$$u = \text{const.}$$
,  $v = \text{const.}$ ,  $w = \text{const.}$ ,

se rencontrent orthogonalement en un point P. Soient  $n_4$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ trois vecteurs parallèles aux normales en P aux trois surfaces et par conséquent parallèles aux tangentes aux courbes d'intersection de ces mêmes surfaces. Ces vecteurs sont donc parallèles à  $\frac{\partial P}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial P}{\partial v}$ ,  $\frac{\partial P}{\partial w}$ . Les conditions d'orthogonalité nous donnent

$$\frac{\partial P}{\partial v} \times \frac{\partial P}{\partial w} = \frac{\partial P}{\partial w} \times \frac{\partial P}{\partial u} = \frac{\partial P}{\partial u} \times \frac{\partial P}{\partial v} = 0.$$

En dérivant la première par rapport à u, etc., on déduit aussi

$$\frac{\partial^2 P}{\partial \nu \partial w} \times \frac{\partial P}{\partial u} = \frac{\partial^2 P}{\partial w \partial u} \times \frac{\partial P}{\partial v} = \frac{\partial^2 P}{\partial u \partial v} \times \frac{\partial P}{\partial w} = 0.$$

Supposons que l'on ait fait

$$n_1 = \frac{\partial P}{\partial v} \wedge \frac{\partial P}{\partial w}$$
;  $n_2 = \frac{\partial P}{\partial w} \wedge \frac{\partial P}{\partial u}$ 

et que le point P se déplace sur la courbe intersection des deux surfaces  $\bar{S}_1$ ,  $S_2$  sur laquelle seulement w est variable; c'est-à-dire supposons que dP soit parallèle à  $n_1 \wedge n_2$ . Alors on déduira aisément que

$$\left(\frac{\delta^2 P}{\delta \nu \delta w} \wedge \frac{\delta P}{\delta w}\right) \times \left(\frac{\delta P}{\delta w} \wedge \frac{\delta P}{\delta u}\right) = 0 ,$$

$$\left(\frac{\delta P}{\delta \nu} \wedge \frac{\delta^2 P}{\delta w^2}\right) \times \left(\frac{\delta P}{\delta w} \wedge \frac{\delta P}{\delta u}\right) = 0 \ ,$$

et, par conséquent,

$$n_2 \times dn_1 = 0$$
.

On a aussi donc

$$(n_1 \wedge n_2) \times (n_1 \wedge dn_1) = 0$$
,

c'est-à-dire 2

$$dP \times n_{\mathbf{i}} \wedge dn_{\mathbf{i}} = 0$$
.

Donc la courbe considérée est une ligne de courbure pour la surface  $S_1$ .

Naples, mai 1911.

R. Marcolongo.

p. 96.

<sup>1</sup> Voir aussi Fehr, Application de la méthode vectorielle de Grassmann à la Géométrie infinitésimale, p. 74-76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eléments de Calcul vectoriel par C. Burali-Forti et R. Marcolongo, Paris, Hermann, 1910;