

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 16 (1914)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: UNE APPLICATION DE LA MÉTHODE DE FAUSSE POSITION
Autor: Ballif, L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-15528>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

UNE APPLICATION DE LA MÉTHODE DE FAUSSE POSITION

Lagrange a rencontré, à propos de la construction des cartes géographiques, le problème suivant :

Etant donnés trois points R , R' , R'' , trouver deux points A et B tels que les rapports $\frac{RA}{RB}$, $\frac{R'A}{R'B}$, $\frac{R''A}{R''B}$, soient entre eux dans des rapports donnés, les différences des angles ARB , $AR'B$, $AR''B$ étant également données.

Nous allons d'abord essayer de donner une solution purement géométrique de cette question.

Comme première simplification, nous pouvons remarquer qu'il nous suffit de construire, au lieu de la figure donnée, une figure qui lui soit semblable. Nous pouvons alors considérer AB comme une donnée, et essayer de déterminer les points R , R' et R'' .

Donnons-nous arbitrairement le point R dans le plan : nous pouvons alors construire le triangle $RR'R''$ de deux manières différentes suivant que nous l'astreignons à l'une ou l'autre des conditions cherchées. En effet, dans le premier cas les rapports $\frac{R'A}{R'B}$ et $\frac{R''A}{R''B}$ deviennent connus puisqu'ils sont dans un rapport connu avec $\frac{RA}{RB}$. Les points R' et R'' doivent se trouver sur des cercles lieux des points dont les distances à A et B sont dans un rapport connu.

Le problème revient alors à construire un triangle $RR'R''$ dont le sommet R est donné, et qui soit semblable à un triangle donné. La solution de ce problème est élémentaire. Appelons $Rr'r''$ le triangle ainsi construit.

Si au contraire nous imposons la seconde condition, les lieux des points R et R' seront deux cercles passant par A et B , puisque la connaissance de l'angle ARB entraîne celle des angles $AR'B$ et $AR''B$.

Le triangle construit ainsi sera $Rr'_1r''_1$, et il différera généralement de $Rr'r''$. Le problème est justement de choisir le point R de façon que ces deux triangles coïncident. Il suffit évidemment

pour cela que r' coïncide avec r'_1 , car les triangles semblables $Rr'r''$ et $Rr'_1r''_1$ ayant alors un côté commun Rr' , le troisième sommet sera aussi commun.

Sur la perpendiculaire au plan de la figure menée par R portons des longueurs Rm'_1 , Rp'_1 égales aux coordonnées rectangulaires du point r'_1 . Si l'on fait varier la position du point R dans le plan, les points m'_1 et p'_1 vont décrire deux surfaces (M'_1) et (P'_1) .

Portons sur la même droite les longueurs correspondantes Rm' , Rp' , coordonnées du point r' , nous obtiendrons deux surfaces (M') et (P') .

Pour que r' coïncide avec r' il faut et il suffit que les points m et m' coïncident, ainsi que p et p' .

Le point m se trouvera donc sur la courbe (Γ) d'intersection des surfaces (M') et (M'_1) , et le point p sur la courbe (Δ) d'intersection des surfaces (P') et (P'_1) .

Si l'on construit les projections γ et δ de ces courbes sur le plan de la figure, leurs points d'intersection seront des points R et le problème s'achèvera alors sans aucune difficulté.

Comme on le voit, cette méthode nous a seulement permis de ramener le problème à celui de l'intersection de deux surfaces construites point par point. Mais on peut remarquer que, malgré cela, elle est susceptible d'un mode d'approximation qui est exactement celui de la méthode de Newton pour déterminer une racine d'une équation, c'est-à-dire l'intersection d'une droite et d'une courbe.

Voici comment nous procéderons :

Nous nous appuierons sur ce fait qu'une surface peut être remplacée dans un certain intervalle par un plan. Comme pour déterminer un plan il faut 3 points, nous allons nous donner 3 points R_1 , R_2 , R_3 , auxquels vont correspondre les 4 séries de trois points

M_1	M_2	M_3
P_1	P_2	P_3
M'_1	M'_2	M'_3
P'_1	P'_2	P'_3


Déterminons le segment ab d'intersection des triangles $M_1M_2M_3$ et $M'_1M'_2M'_3$, et soit $\alpha\beta$ sa position sur le plan $R_1R_2R_3$.

Déterminons de même le segment cd d'intersection des triangles $P_1P_2P_3$ et $P'_1P'_2P'_3$ et soit $\gamma\delta$ sa position sur le plan $R_1R_2R_3$.

Si les points $R_1R_2R_3$ ont été choisis avec assez d'habileté, les

segments $\alpha\beta$ et $\gamma\delta$ aurons un point commun ϱ qui sera plus approché de la solution que les points R_1, R_2, R_3 .

C'est à partir de ce point q que nous pourrons partir pour appliquer la méthode de Newton.



Considérons la parallèle aux projectantes menées par ϱ , elle coupe les surfaces (M) et (M') en deux points μ et μ' . Les plans tangents à (M) et (M') en ces points ont pour intersection une droite $\Delta\mu$.

De même les points d'intersection π et π' de la même projectante avec les surfaces (P) et (P') donnent une droite Δ_π .

La parallèle aux projectantes qui s'appuie sur Δ_μ et Δ_π fournit un point ϱ_1 , plus approché que ϱ et l'on peut continuer ainsi indéfiniment.

La détermination des plans tangents aux surfaces (M) ou (P) est assez simple. On peut l'obtenir en effet en construisant sur la surface en un point deux tangentes particulières correspondant au déplacement du point R sur le cercle RAB ou sur le cercle lieu des points tels que $\frac{RA}{RB}$ soit constant.

L. BALLIF (Angoulême).

SUR LES TRIANGLES HÉRONIENS

Nouvelles formules.

1. — Soient p, q, r les trois côtés et s le demi-périmètre d'un triangle heronien.

Si F représente la surface, on a :

$$F = \sqrt{s(s-p)(s-q)(s-r)} .$$

F peut s'écrire :

$$F = (s-q)(s-r) \sqrt{\frac{s(s-p)}{(s-q)(s-r)}} ,$$

ou, comme $s = s-p + s-q + s-r$,

$$\begin{aligned} F &= (s-q)(s-r) \sqrt{\left[1 + \frac{s-p}{s-q} + \frac{s-r}{s-q} \right] \cdot \frac{s-p}{s-r}} \\ &= (s-q)(s-r) \sqrt{\frac{s-p}{s-q} + \frac{s-p}{s-r} + \frac{s-p}{s-q} \cdot \frac{s-p}{s-r}} . \end{aligned}$$

Posons

$$\frac{s-p}{s-q} = x , \quad \frac{s-p}{s-r} = x' ,$$

alors on obtient :

$$F = \frac{(s-p)^2}{xx'} \sqrt{x+x'+xx'} . \quad (1)$$