Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 16 (1914)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: ÉGALITÉS MULTIPLES DE G. TARRY

Autor: Aubry, A.

Kapitel: Note I. — Egalités doubles.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-15523

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

D'ailleurs, pour qu'une égalité entre les n premiers entiers puisse avoir lieu, il faut que n soit non seulement pair, mais encore multiple de 4, car la somme des 2m premiers entiers est impaire en même temps que m.

Théorème III. — Supposons, dans le lemme IV, que $a, \ldots \alpha, \ldots$ désignent les 4n, les 8n, les 16n, ... premiers entiers; en faisant successivement h=4n, 8n, 16n, ... on verra, à cause du lemme V, que les 4(2k+1), les 8(2k+1), ... premiers entiers donnent des égalités respectivement doubles, triples, quadruples, ... Par conséquent, les $2^{m}(2k+1)$ premiers entiers peuvent se grouper en deux suites formant une égalité m^{uple}.

Note I. — Egalités doubles.

Théorème I. — Une égalité double doit avoir plus de deux termes dans chaque membre.

Thèorème II. — On ne saurait avoir $x + x + x \stackrel{?}{=} y + z + w$.

Théorème III. — Les trois termes ne sauraient être à la fois en progression arithmétique ou géométrique dans les deux membres.

Problème I. Résoudre x=y'+z'+w'. Changeons y', z' et w' en x-y, y-z et z; la question revient à la résolution de x=(x-y)+(y-z)+z ou simplement de $x^2=(x-y)^2+(y-z)^2+z^2$, d'où on tire

$$x = y - z + \frac{z^2}{y} .$$

Posons en conséquence z = tv, y = ut, u et v étant premiers entre eux; il viendra

$$x = ut - vt + \frac{v^2 t}{u} \qquad \text{d'où} \qquad t = su$$

et par suite

$$x = (u^2 - v + v^2)s$$
, $y = u^2s$, $z = uvs$;

d'où, en négligeant le facteur commun s, la formule

$$(u^2 - uv + v^2) \stackrel{?}{=} v(v - u) - u(v - u) + uv ,$$

qui donne une infinité de solutions, u et v restant arbitraires.

Cor. L'égalité proposée peut s'écrire $0 + 0 + x \stackrel{?}{=} y' + z' + w'$, ou, en ajoutant -x à chaque terme, $-x - x \stackrel{?}{=} (y - x) + (z - x) + (w - x)$, ce qui fournit cette autre relation

$$(uv - u^2 - v^2) + (uv - u^2 - v^2) \stackrel{2}{=} u^2 + v^2 + (u - v)^2$$
.

Problème II. Résoudre $-x + x \stackrel{2}{=} y' + z' - w'$. Ecrivons ainsi cette égalité

$$-x + x \stackrel{?}{=} (x - y - z) + (-x - y + z) + (2y)$$
ou
$$x^{2} + x^{2} = (x - y - z)^{2} + (-x - y + z)^{2} + (2y)^{2},$$

d'où, en simplifiant et continuant comme au précédent problème,

$$t = sv$$
, $y = su$, $z = sv^2$, $2x = 3su^2 + sv^2$,

et, en négligeant le coefficient s,

$$-(3u^2+v^2)+(3u^2+v^2)\stackrel{2}{=}(3u^2-v^2-2uv)+(-3u^2+v^2-2uv)+4uv.$$

Cor. I. L'égalité proposée peut encore s'écrire -x + x = -y' - z' - w': elle a donc toujours au moins deux solutions. Ainsi -7 + 7 = -3 - 5 + 8 peut encore s'écrire -7 + 7 = 3 + 5 - 8, ou bien, en ajoutant 7 partout,

$$7 + 14 \stackrel{2}{=} 2 + 4 + 15 \stackrel{2}{=} -1 + 10 + 12$$
.

II. Ajoutant x à tous les termes de l'égalité ainsi complétée $0-x+x\stackrel{2}{=}y'+z'+w'$, on trouve $x+2x\stackrel{2}{=}y''+z''+w''$: on a donc en même temps la solution de cette nouvelle égalité.

Théorème IV. — Posons

$$a^{2} + b^{2} = (a - fh)^{2} + (b + gh)^{2} + (fh - gh)^{2}$$
.

il viendra

$$fa - gb = (f^2 + g^2 - fg)h.$$

Donc si a et b sont liés par la relation (a) on aura

$$a + b \stackrel{2}{=} (a - fh) + (b + gh) + (fh - bh)$$
.

Ainsi, les suppositions f=2, g=1; f=1, g=-1; f=3, g=1; f=3, g=2; ... donnent ces théorèmes:

si
$$2a - b = 3h$$
, on aura: $a + b \stackrel{?}{=} (a - 2h) + (b + h) + h$.

si
$$a + b = 3h$$
, on aura: $a + b = (a - h) + (b - h) + 2h$:

si
$$3a - b = 7h$$
, on aura: $a + b = (a - 3h) + (b + h) + 2h$.

si
$$3a - 2b = 7h$$
, on aura: $a + b = (a - 3h) + (b + 2h) + h$.

Problème III. Formule générale de l'égalité double. Posons

$$x + y \stackrel{2}{=} (y + t) + z + w$$
;

on aura

$$x^2 = t^2 + z^2 + w^2 + 2tz + 2tw + 2zw = 2yt + t^2 + z^2 + w^2$$

d'où

$$tz + tw + zw = yt$$

ce qui demande qu'on puisse poser zw = tu. Ecrivons en conséquence

$$z = ab$$
 , $w = cd$, $t = bd$, $u = ac$,

il viendra

(3)
$$(ab+bd+cd)+(ab+ac+cd) \stackrel{2}{=} (ab+ac+bd+cd)+ab+cd$$
.

Cor. I. On peut tirer de là une infinité d'égalités doubles. Par exemple posons c = b et ajoutons aux six termes — compris le terme zéro — le nombre hb - ab - bd; il viendra la formule

$$(h-a-d)+(h+a)+(h+d)\stackrel{2}{=}(h+a+d)+(h-a)+(h-d)$$

qui se simplifie, tout en restant symétrique en y faisant d=2a.

II. Résolution de A + B = x + y + z. Assimilant à (β) , on voit qu'on a à résoudre

$$A^2 + B^2 = (A + ac)^2 + (B - ac - cd)^2 + (cd)^2$$

d'où

$$c = \frac{Ba - Aa + Bd}{a^2 + d^2 + ad}.$$

Ainsi soit A=17, B=3; on voit, après quelques tâtonnements, que c est entier pour a=2, d=3. On trouve en conséquence

$$c = -1$$
, $b = \frac{A - cd}{a + d} = 4$

et par suite l'égalité double cherchée $3 + 17 \stackrel{?}{=} -3 + 8 + 15$.

Le problème a autant de solutions qu'il y a de valeurs de a et de d qui rendent entière la valeur du second membre de (γ) .

On remarquera que (y) fournit les théorèmes IV.

III. Pour que l'équation A + B = x + y + z soit résoluble, il faut et il suffit que le nombre $A^2 + B^2 - AB$, s'il n'est pas divisible par 3, ait au moins deux facteurs premiers de la forme $6h + 1^{\circ}$.

¹ Ce théorème et le suivant m'ont été communiqués sans démonstration par M. G. Tarry.

Si cette équation est résoluble, on doit pouvoir écrire :

$$A = ab + bd + cd$$
, $B = ab + ac + cd$.

Or on a dans ce cas:

$$A^2 + B^2 - AB = (a^2 + d^2 + ad)(b^2 + c^2 + bc)$$
.

Ainsi la condition nécessaire et suffisante est que le nombre $A^2 + B^2 - AB$ puisse se décomposer en deux facteurs de forme $x^2 + y^2 + xy$, expressson qui ne peut avoir pour facteurs que 3 ou des nombres premiers de forme 6h + 1.

Si le nombre $A^2 + B^2 - AB = (A + B)^2 - 3AB$ est divisible par 3, il en est de même de A + B; or ce cas a été traité plus haut. (Théorème IV.)

IV. Supposons qu'on puisse écrire $A^2 + B^2 - AB = X^2 + Y^2 - XY$; en posant x = 2X - Y, y = 2Y - X, on aura:

(
$$\delta$$
) A + B $\stackrel{2}{=}$ $\frac{A + B \pm x}{3}$ + $\frac{A + B \pm y}{3}$ + $\frac{A + B \mp x \mp y}{3}$.

En effet, cette relation revient à

(
$$\epsilon$$
) $3(A^2 + B^2 - AB) = x^2 + y^2 + xy$

ou bien à

$$A^{2} + B^{2} - AB = \left(\frac{2x + y}{3}\right)^{2} + \left(\frac{2y + x}{3}\right)^{3} - \frac{2x + y}{3} \cdot \frac{2y + x}{3}.$$

(e) donne $(x-y)^2 + 3xy \equiv 0 \pmod{3}$, d'où $x \equiv y$ et $2x + y \equiv 0$. D'ailleurs on a :

$$(A + B)^2 \equiv (X + Y)^2 \equiv (2X - Y)^2 \equiv x^2 \equiv y^2$$
.

Ainsi si A + C est un non-multiple de 3, il en est de même de x et de y, et on prendra, pour les signes de x et de y, ceux qui donnent pour (δ) des nombres entiers.

V. L'équation x + y = z + A + B est toujours soluble, et elle a même, en général, quatre solutions. On n'a, pour s'en assurer, qu'à changer dans (β) a et b, 1° en $\pm a$ et $\pm b$, 2° en $\pm b$ et $\pm a$.

Note II. — Carrés panmagiques de module 4n.

Soit n = 3. Considérons, par exemple, l'égalité entre les 12 premiers entiers

$$1 + 11 + 3 + 9 + 8 + 7 = 12 + 2 + 10 + 4 + 5 + 6$$