

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 18 (1916)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Kapitel: propos du problème XXVIII de la Géométrie de Lemoine.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

plan correspond un plan passant par b et rencontrant C , en dehors de cette droite, en un point B que nous dirons par définition correspondre à A .

Inversement, par un point B passent deux cubiques C_1, C_2 de Σ et T fait correspondre à ces cubiques deux droites d_1, d_2 de G . Par P passent deux droites b_1, b_2 biséantes respectivement de C_1, C_2 . Aux plans $(B, b_1), (B, b_2)$, Ω fait correspondre deux plans rencontrant respectivement les droites d_1, d_2 en deux points A_1, A_2 .

On a établi ainsi, entre les points A, B , une correspondance $(2, 1)$ qui fait correspondre à une droite de G une cubique gauche de Σ et inversement, une cubique gauche de Σ à deux courbes dont l'une est une droite de G . Par suite :

Etant donnée une congruence d'ordre deux formée de cubiques gauches, il est toujours possible de construire une transformation $(2, 1)$ qui fasse correspondre les droites d'une congruence linéaire aux cubiques de cette congruence.

Ramscappelle, 10 décembre 1915.

MÉLANGES ET CORRESPONDANCE

A propos du problème XXVIII de la Géométriegraphie de Lemoine.

Démonstration élémentaire¹ de la solution due à M. Maurice d'Ocagne
par Fr. REDL (St-Poelten).

Le problème XXVIII de la *Géométriegraphie de LEMOINE (collection Scientia)* est énoncé comme suit : *Par un point A, mener une droite au point de concours inaccessible de deux droites BB', CC'.* Le tracé donné par l'auteur est dû à M. Maurice d'Ocagne (*Journ. de Math. Elém.* de Longchamps, 1886, p. 59).

La solution suivante est obtenue par la considération de la bissectrice d'un angle et de la projection parallèle et respectivement de la projection centrale de la figure.

¹ Traduit de l'allemand par A. Staempfli, Zurich.

Soit un losange $ABA'B'$ (fig. 1.) Menons entre les côtés opposés prolongés les segments,

$$PP' \parallel AB' \quad \text{et} \quad QQ' \parallel AB.$$

Joignons PQ' et $P'Q$ et désignons par $M(M')$ l'intersection de PQ' avec $AB'(A'B')$, par N l'intersection de $P'Q$ avec $A'B$. Des triangles semblables nous tirons aisément la proportion :

$$PM' : PS = MQ' : MS = QN : QS.$$

Par suite, les distances du point S aux côtés de l'angle A sont dans le même rapport que les distances correspondantes du point A' , c'est-à-dire, le point S appartient à la diagonale AA' du




Fig. 1.

parallélogramme $ABA'B'$, et, dans le cas particulier de la figure, à la bissectrice de l'angle A .

Par une construction analogue on obtient un point de la bissectrice de l'angle supplémentaire. On prolonge par exemple PP' du côté de P jusqu'en P'' d'une longueur égale à PP' . Les droites PQ' et $P''Q$ se couperont sur la bissectrice de l'angle supplémentaire de A .

Ainsi les deux bissectrices d'un angle peuvent être construites de la manière suivante : Par les points P et Q , choisis arbitrairement sur les côtés de l'angle, on mène deux segments PP' et QQ' de même longueur respectivement parallèles aux côtés de l'angle. Le point d'intersection des droites PQ' et $P'Q$ appartient à l'une des bissectrices.

Passons maintenant à la résolution du problème proposé. A cet effet, construisons une projection oblique de la figure 1, et consi-




Fig. 2.

dérons dans cette projection A' comme étant le point à joindre au point d'intersection des deux droites.

Par le point A' (fig. 2) nous menons une parallèle à chacune des




Fig. 3.

deux droites données. Coupons ces deux couples de parallèles par deux droites auxiliaires respectivement parallèles aux deux droites données. Nous aurons deux segments PP' et QQ' , comme

dans la figure 1, dont la figure 2 est une projection oblique. En joignant PQ' et QP' nous obtenons le point S ; la droite $A'S$ passe¹ par le point inaccessible A .

La projection centrale de la figure 1 sur un oblique à celle-ci (fig. 3) donne la construction proposée par M. d'Ocagne. Son tracé consiste à mener par A' deux droites quelconques (projection des parallèles par A' dans la fig. 1); par les points d'intersection J et J' nous menons deux droites quelconques (projection des parallèles auxiliaires par P et Q dans la fig. 1) sur lesquelles on a deux ponctuelles homographiques déterminées par les trois couples de points JJ' , $Q'P'$ et QP . La droite AA' n'étant autre chose que l'axe perspectif des deux ponctuelles, nous obtenons un point quelconque de l'axe en joignant convenablement les points des deux supports, ici PQ' et QP' . Le point d'intersection S est un point de la droite cherchée.

Residuo in Formula de quadratura Cavalieri-Simpson².

Nota de G. PEANO (Torino.)

NOTE DE LA RÉDACTION. — *Sur la demande de M. G. Peano, professeur d'Analyse à l'Université de Turin et président de l'Academia pro Interlingua, nous reproduisons, à titre de spécimen, une note rédigée dans la langue auxiliaire internationale Interlingua.*

Formula de quadratura que nos considera es :

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] ,$$

que es vero, si functione f es integro, de gradu non superiore

¹ Indiquons en passant une construction très simple des points de la droite AA' qui n'a été donnée nulle part: Si l'on mène une parallèle quelconque à BB' , qui coupe $A'B$ en C et $A'B'$ en C' et qu'on complète le triangle $A'CC'$ en un parallélogramme ayant CC' comme diagonale le sommet opposé à A' peut servir à déterminer la droite AA' .

En faisant une projection centrale de cette figure on obtient une construction analogue à celle de Lambert.

² Omeri vocabulo es latino : *in, de, non, et*; nomine habe forma de thema, id es : *residuo, formula, gradu, integro* (ablativo), *nos* (nominativo), *que* (ex accusativo *quem*), *ce* (ex *hoc*, *cetero*); verbo : *considera, es, occurre* (imperativo).

« Academia pro Interlingua » habe origine in 1887, et adopta Volapük publicato in 1880; studie Esperanto publicato in 1887; in 1902 publica « Idiom neutral » constructo super principio de internationalitate maximo; et continua labores pro lingua internationale.

Articulo presente, tracto ex « Atti R. Acc. di Torino, 21, 2, 1915 », es scripto in « latino sine flexione », uno ex numeroso forma de interlingua, intelligibile sine studio ab magno publico.