Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 19 (1917)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Kapitel

Autor: Pasquier, L.-G. Du

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

infini d'aiguilles, la série T se confondrait avec celle des nombres impairs.

J'ai conseillé à mes jeunes gens de fabriquer pour leurs amis le jeu des 4 aiguilles avec quelque 15 à 20 disques. Dans la pratique, ce jeu donnera matière à beaucoup plus d'hésitations que le jeu classique de la tour d'Hanoï. C'est dire qu'il a chance de n'être pas moins amusant. lls l'introduiront par un petit conte assyrien et l'ont baptisé déjà : le jeu de la Ziggurat.

Mon vieil ami L.-G. Du Pasquier, professeur à l'Université de Neuchâtel, auquel j'ai communiqué les pages ci-dessus a bien voulu répondre déjà au vœu que j'y exprime d'obtenir des mathématiciens une formule facile permettant de calculer T_n . Il m'a permis de joindre à ma communication le complément qui suit.

Pierre Bover (Genève).

II. — Désignons par $t_{\lambda-1}$ le $\lambda^{\text{ième}}$ nombre triangulaire; d'après cela, $t_0=1, t_1=3, t_2=6, t_3=10, t_4=15,\ldots$ en général : $t_{\lambda}=\frac{1}{2}(\lambda+1)(\lambda+2)$. Soit n un nombre positif d'ailleurs quelconque; représentons par $E_2(n)$ le plus grand nombre triangulaire contenu dans n; par exemple $E_2(2)=1$; $E_2(\pi)=3$; $E_2(9)=6$; $E_2(10,33)=10$; etc. (Cette notation est une généralisation du symbole de Legendre: E(n)= plus grand nombre entier contenu dans n; nous posons donc par définition: $E_1(x)=E(x)$; $E_2(x)=$ le plus grand nombre triangulaire contenu dans x; $E_3(x)=$ le plus grand nombre carré contenu dans x; et ainsi de suite).

Cela posé, tout nombre positif n peut se représenter, et d'une seule manière, sous forme d'une somme de deux termes

$$n = t_{\lambda} + r \tag{a}$$

où $t_{\lambda} = \mathrm{E}_{2}(n)$ est le plus grand nombre triangulaire contenu dans n, et r un nombre non négatif. Si, en particulier, n représente un nombre entier, par exemple le nombre des disques dans le jeu en question, on aura les décompositions suivantes :

n = 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$t_{\lambda} = 1$		3	3	3	6	6	6	6	10	10	10	10	10	15	15
r = 0	1	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	4	0	1
$\lambda = 0$	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

La série T_n est alors représentée par la formule

$$T_n = 1 + (\lambda + r) \cdot 2^{\lambda + 1}$$

La sommation de la série

$$1 + 2 \cdot 2^{1} + 3 \cdot 2^{2} + 4 \cdot 2^{3} + 5 \cdot 2^{4} + \dots + (n+1) \cdot 2^{n} = \sum_{\lambda}^{0 \dots n} (\lambda + 1) \cdot 2^{\lambda}.$$

qui intervient dans la formation des nombres T_n , peut être trouvée, grâce aux indications qui suivent, même par des garçons d'une douzaine d'années, pourvu qu'ils connaissent la formule de sommation des progressions géométriques. On a tout d'abord

$$\sum_{\lambda} (\lambda + 1) \cdot 2^{\lambda} = \sum_{\lambda} \lambda \cdot 2^{\lambda} + \sum_{\lambda} 2^{\lambda}.$$

D'une part,

$$\sum_{\lambda=0}^{n} 2^{\lambda} = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n} = 2^{n+1} - 1.$$

D'autre part, on peut représenter $\sum_{\lambda}^{0...n} \lambda$. 2^{λ} de la manière que voici :

$$\sum_{\lambda}^{0...n} \lambda \cdot 2^{\lambda} = 0 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^{2} + 3 \cdot 2^{3} + 4 \cdot 2^{4} + 5 \cdot 2^{5} + \dots + n \cdot 2^{n}$$

$$= 2 + 2^{2} + 2^{3} + 2^{4} + 2^{5} + \dots + 2^{n}$$

$$+ 2^{2} + 2^{3} + 2^{4} + 2^{5} + \dots + 2^{n}$$

$$+ 2^{4} + 2^{5} + \dots + 2^{n}$$

$$+ 2^{4} + 2^{5} + \dots + 2^{n}$$

$$+ 2^{n-1} + 2^{n}$$

$$+ 2^{n}$$

Faisant la sommation de chaque ligne horizontale séparément, puis additionnant ces sommes partielles, il vient

Tout ce problème est ainsi ramené à la sommation de progressions géométriques.

On trouve facilement
$$\sum_{\lambda}^{0...n} \lambda \cdot 2^{\lambda} = 2 + (n-1) \cdot 2^{n+1}$$
.

On en déduit immédiatement $\sum_{\lambda}^{0...n} (\lambda + 1) \cdot 2^{\lambda} = 1 + n \cdot 2^{n+1}$,

et ce résultat, combiné avec la décomposition (a) du nombre n des disques, conduit à la formule cherchée

$$T_n = 1 + (\lambda + r) \cdot 2^{\lambda + 1}$$

L.-G. Du Pasquier (Neuchâtel).

Remarques sur le problème de Jean de Palerme et de Léonard de Pise (Fibonacci),

à propos d'un article de M. E. Turrière.

Il est intéressant de rapprocher les recherches publiées récemment par MM. Hæntzschel de Turrière sur le problème de Jean de Palerme et de Léonard de Pise. Tandis que M. Turrière ne fait usage que de moyens élémentaires, M. Hæntzschel montre comment l'emploi des fonctions p de Weierstrass facilite l'étude approfondie de ces problèmes arithmo-géométriques.

D'après le 7° exemple du 3° livre de l'Arithmétique de Diophante, il s'agit de trouver trois nombres en progression arithmétique (a-d, a, a+d) et tels que la somme de deux des nombres soit chaque fois un carré parfait.

Diophante cherche d'abord trois nombres carrés qui sont en progression arithmétique

$$2a - d = r^2$$
, $2a = t^2$, $2a + d = w^2$;

il trouve

$$41^2 - 720 = 31^2$$
, $41^2 + 720 = 49^2$.

¹ Jahresbericht der D. M.-V., 24° année, 1915, p. 467-471, Lösung einer Aufgabe aus der Arithmetik des Diophante; 25° année, 1916, p. 139-145, Ueber eine Aufgabe aus der Arithmetik des Diophante.

² L'Enseign. mathèm., 17e année, 1915, p. 315-324, Le problème de Jean de Palerme et de Léonard de Pise.