Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 20 (1918)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LA RECTIFICATION APPROCHÉE D'UN ARC DE CERCLE

Autor: Pleskot, Ant.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-18033

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

sociétaire changera annuellement de place avec tous les autres.

Comment s'y prendra-t-il pour être seul à garder sa place?

Pour n impair quelconque, les solutions sont fournies par l'exercice 14, III; d'autre part, toute formule relative à (2n-1) lettres $a, b, c, d \dots g$ en donne une pour une lettre de plus h, en remplaçant (n-1) échanges n'ayant pas de lettres communes, comme $(a, b), (c, d), \dots$ par $(a, h)(a, b)(b, h), (c, h)(c, d)(d, h), \dots$ et ajoutant à la fin (g, h).

38. — Dans un groupe de n hommes, n femmes et n enfants, peut-on permuter chaque enfant avec chacune des 2n grandes personnes et une fois seulement, de manière à retrouver la dis-

position primitive?

Soit n = 3; remarquons que $(A, a, \alpha) = (\alpha, A)(\alpha, a)$, et posons

on aura:

$$RT = S^{-1}$$
, d'où $SRT = RTS = TSR = 1$.

On s'inspirera de ce procédé pour les autres valeurs de n multiples de 3.

SUR LA RECTIFICATION APPROCHÉE D'UN ARC DE CERCLE

PAR

Ant. Pleskot (Pilsen).

Dans cette Note nous présentons une construction générale de la rectification approchée d'un arc de cercle; quelques constructions connues en forment un cas particulier.

Soit (fig. 1) un cercle K de centre O et de rayon r et AB l'axe

correspondant à un angle au centre q.


On décrit d'un point S pris sur la droite AO le cercle K₄, tangent au cercle K en A; soit a le rayon de ce cercle, c'est-à-dire

$$AS = a = \frac{r}{k} , \qquad (k \text{ constante}).$$

Sur la droite AO nous prenons encore le point R, dont la distance au point O est donnée par l'expression

OR =
$$d = \frac{12ar - 3r^2 - 8a^2}{3r^2 - 4a^2}$$
. $r = \frac{12k - 3k^2 - 8}{3k^2 - 4}r$. (1)

La droite RB coupe le cercle K_4 en C. La longueur AC est approximativement égale à l'arc AB.



Par le calcul un peu long, mais simple, on trouve

$$AC = r\varphi + r\varphi^{5}(\alpha_{0} + \alpha_{1}\varphi + ...) ;$$

l'erreur $\Delta = r\varphi$ — AC est proportionnelle au rayon et approximativement à la 5^{me} puissance de l'angle φ .

Suivant le choix de k, nous obtenons différentes constructions. Elles seront simples pour k < 1.

Construction I. — Nous laissons le point R coïncider avec le centre O; d=0; la quantité k est donnée par l'équation (1):

$$3k^2 - 12k + 8 = 0 ,$$

d'où l'on tire

$$k = \frac{O - 2\sqrt{3}}{3}$$
, et $a = \frac{r}{k} = \frac{r}{4}(3 + \sqrt{3})$.

La longueur a peut être facilement construite.

La rectification approchée est donc la suivante (fig. 2): De S comme centre on décrit le cercle K_4 de rayon $AS = \frac{r}{4}(3 + \sqrt{3})$. Le côté OB coupe le cercle K_4 en C et la longueur AC est approxi-

mativement égale à celle de l'arc AB. La longueur AC est donnée par les équations

$$AC = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} \sin \frac{\omega}{2} , \qquad \omega = \phi - \epsilon , \qquad \sin \epsilon = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \sin \phi .$$

De ces équations on peut calculer les erreurs d'approximation; celles-ci sont inférieures à celles que l'on obtient par la construction de Cusanus.

Construction II. — Le résultat est encore meilleur si l'on prend R au point diamétralement opposé à A, c'est-à-dire si d=r.


Pour la quantité k on a maintenant l'équation


$$\frac{12k - 8 - 3k^2}{3k^2 - 4} = 1 ,$$

d'où l'on tire

$$k = \frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$
, $a = \frac{r}{k} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}r$.

La construction est la suivante (fig. 3):





Si $OJ = \frac{r}{2}$, la perpendiculaire menée du point J à la droite OA coupe le cercle donné en E. On fait JS = JE; puis le cercle K_1 décrit du centre S avec un rayon SA, coupe la droite RB au point C et la longueur AC est très approximativement égale à l'arc AB. On peut se servir de cette construction pour les angles de 0 à 90°. La longueur AC est donnée par les équations:

$$AC = (3 + \sqrt{3})\sin\frac{\omega}{2} \; , \qquad \omega = \frac{\phi}{2} - \epsilon \; , \qquad \sin\epsilon = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3}\sin\frac{\phi}{2} \; .$$

De ces équations on peut évaluer les erreurs Δ d'approxima-

tion; on trouve, pour $\varphi = 60^{\circ}$, $\Delta = 0.0003r$, pour $\varphi = 90^{\circ}$, $\Delta = 0.00021r$.

Cette construction résulte de la première si l'on rectifie après la première construction l'arc d'angle $\frac{\varphi}{2}$ et de rayon 2r.

Construction III. — On obtient une construction très simple si l'on fait coïncider le point R avec le point S, c'est-à-dire, si l'on pose

$$r + d = a$$
, d'où $1 + \frac{d}{r} = \frac{1}{k}$;

l'équation (1) devient

$$1 + \frac{12k - 8 - 3k^2}{3k^2 - 4} = \frac{1}{k}$$
, ou $(3k - 2)^2 = 0$,

d'où

$$k = \frac{2}{3}$$
 , et $a = \frac{3}{2}r$.

La construction est la suivante (fig. 4): Prenons $OR = \frac{r}{2}$.

Du point R on décrit le cercle K₁ de rayon RA. La droite RB coupe ce cercle en C. La longueur AC est approximativement égale à l'arc AB, Elle est donnée par les équations

$$AC = 3r \sin \frac{\varphi}{2}$$
, $\sin \omega = \frac{2 \sin \varphi}{\sqrt{5 + 4 \cos \varphi}}$.

La valeur approchée est identique à celle qu'on obtient par la construction donnée par M. d'Ocagne.

Enfin nous posons k=0; d'où $a=\infty$ et d=2r; le cercle K_4 est remplacé par la tangente au cercle K et nous trouvons la construction de Cusanus.

Les constructions ci-dessus permettent aussi de résoudre le problème inverse: porter sur une circonférence, à partir d'un point donné, un arc de longueur donnée.