

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 23 (1923)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** DÉDUCTION GÉOMÉTRIQUE DES DÉRIVÉES SUPÉRIEURES DES FONCTIONS CIRCULAIRES  $\sin x$  ET  $\cos x$   
**Autor:** Arnovljevic, J. / Petronievics, B.  
**Kapitel:** II  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-19746>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## II

1. — Dans la fig. 3, on a  $PZ = x$ ,  $\overline{OP} = \Delta x$ , P est le point de la tangente PT, Q le point de la tangente QT', PS la sécante passant par les points Q et P, PM le sinus de l'arc  $x$  (et de l'angle correspondant  $\alpha$ ), QN le sinus de l'arc  $x + \Delta x$  (et de l'angle correspondant  $\alpha + \Delta x$ ), Q'N' le sinus de l'arc  $x + 2\Delta x$  (et de l'angle correspondant  $\alpha + 2\Delta x$ ).




Fig 3

De même on a dans cette figure:

$$\begin{aligned}\Delta \sin x &= \sin(x + \Delta x) - \sin x = NQ - MP = RQ \\ \Delta \sin(x + \Delta x) &= \sin(x + 2\Delta x) - \sin(x + \Delta x) = N'Q' - NQ = R'Q' \\ \Delta \Delta \sin x &= \Delta \sin(x + \Delta x) - \Delta \sin x = R'Q' - RQ = BC - AC = -AB.\end{aligned}$$

Dans le triangle Q'QA, ayant l'arc Q'A pour base, on a:  $\widehat{Q'A} = Q'Q \llcorner Q'QA$ , et dans le triangle Q'QO, ayant l'arc Q'Q pour base, on a de même:  $\widehat{Q'Q} = OQ \llcorner Q'OQ$ .

On aura donc:

$$\begin{aligned}\lim Q'A &= \lim \Delta x \cdot \lim \llcorner SQS' = \lim \Delta x \cdot \lim \Delta \llcorner RQP \\ &= \lim \Delta x \cdot \lim \Delta \alpha\end{aligned}$$

d'où:

$$\lim Q'A = dx \cdot d\alpha = dx^2, \quad (1)$$

Comme le triangle Q'BA coïncide, en passant à la limite, avec le petit triangle non tracé Q'BA', qui est semblable au triangle ON'Q', on aura d'autre part :

$$\lim \sphericalangle AQ'B = \lim \sphericalangle (\alpha + 2\Delta\alpha) = \alpha = x .$$

On a aussi :

$$\lim AB = - \lim \Delta\Delta \sin x = - d^2 \sin x . \quad (2)$$

De même, comme en passant à la limite,  $\Delta ON'Q'$  coïncide avec OMP, on aura :

$$\lim \frac{AB}{Q'A} = \lim \frac{PM}{OP} , \quad (3)$$

Des équations (1), (2) et (3), il s'ensuit enfin :

$$\frac{d^2 \sin x}{dx^2} = - \sin x .$$

**2.** — En suivant la déduction précédente de la seconde dérivée de  $\sin x$ , on déduira facilement la seconde dérivée de  $\cos x$ .

Dans la fig. 3, on a :

$$\Delta \cos x = - RP , \quad \Delta \cos (x + \Delta x) = - R'Q , \quad \Delta\Delta \cos x = - R'C .$$

On a de même :

$$\lim Q'A = dx^2 , \quad (1)$$

$$\lim \sphericalangle AQ'B = x ,$$

$$\lim Q'B = d \cos^2 x \quad (2)$$

et

$$\lim \frac{Q'B}{Q'A} = \frac{OM}{OP} . \quad (3)$$

On aura donc enfin :

$$\frac{d^2 \cos x}{dx^2} = - \cos x .$$

**3.** — Les figures 4 et 4a se rapportent à la troisième dérivée des fonctions  $\sin x$  et  $\cos x$ . Dans la fig. 4a, les triangles R''Q'Q'' et R'Q'A' de la fig. 4 ont été agrandis de telle sorte que le triangle Q''Q'A' contient, non seulement le petit triangle Q''B'A', mais aussi le triangle encore plus petit DEA'.



Comme dans la figure 4 a :

A'B' de la figure 4, représente A'B'  
 et AB » » » DB' ,

on a, dans cette figure :

$$\Delta\Delta\Delta \sin x = - A'B' - (- DB') = - A'D .$$

On a aussi dans la figure 4 a :

$$\begin{aligned} \lim A'E &= \lim \widehat{A'E} = \lim Q''A' . \lim \sphericalangle A'Q''E \\ &= \lim \widehat{Q''A'} . \lim \Delta \sphericalangle A'Q''B' , \end{aligned}$$

mais comme, en passant à la limite,  $\widehat{Q''A'}$  coïncide (dans la figure 4) avec  $Q'A$  et  $\sphericalangle A'Q''B'$  avec  $AQ'B$ , on aura :

$$\lim A'E = \lim Q'A . \lim \Delta \sphericalangle AQ'B = dx^2 . d\alpha = dx^3 , \quad (1)$$

On aura aussi, en passant à la limite ( $\Delta DA'E$  étant  $\sim \Delta C'A'Q'$ ),

$$\lim \sphericalangle DA'E = \lim \sphericalangle C'A'Q' = \lim \sphericalangle N'Q'S' = \lim \sphericalangle NQT' = \alpha = x$$

et

$$\lim A'D = - \lim \Delta\Delta\Delta \sin x = - d^3 \sin x . \quad (2)$$

De même, en passant à la limite,  $\Delta DA'E$  devient semblable à  $\Delta MPO$ , et on aura :

$$\lim \frac{A'D}{A'E} = \frac{OM}{OP} . \quad (3)$$

Des équations (1), (2) et (3) il s'ensuit enfin :

$$\frac{d^3 \sin x}{dx^3} = - \cos x .$$

*Remarque.* — En suivant la déduction de la troisième dérivée de  $\sin x$ , on déduira facilement la troisième dérivée de  $\cos x$ .

On aura en effet (dans la fig. 4) :

$$\Delta\Delta \cos x = R''Q' - R'Q = - R''C' ,$$

et

$$\Delta\Delta\Delta \cos x = - R''C' - (- R'C) = DE$$

(dans la figure 4 a, où  $Q''B'$  représente  $R''C'$ , tandis que le segment rectiligne correspondant à  $R'C' > R''C$  n'a pas été tracé).

Comme

$$\lim \frac{DE}{A'E} = \frac{PM}{OP} .$$

on aura :

$$\frac{d^3 \cos . x}{dx^3} = \sin x .$$

4. — En suivant la déduction des deuxième et troisième dérivées de  $\sin x$ , on déduira facilement la quatrième dérivée, et ainsi de suite.

On s'apercevra aussi (comp. fig. 3 et 4) que, si cette déduction porte sur la dérivée de l'ordre pair, l'angle du petit triangle (dont les différences  $\Delta^n y$  et  $\Delta x^n$  sont des côtés), qui correspond à l'angle  $\alpha$ , sera orienté dans le même sens que celui-ci, tandis que, s'il s'agit de la dérivée de l'ordre impair, cet angle sera orienté dans le sens de l'angle NQS. D'où la différence dans le procédé de démonstration des deux cas.

On pourrait démontrer que, tandis que  $\Delta^2 \sin x$  et  $\Delta^3 \sin x$  sont négatifs, la différence  $\Delta^4 \sin x$  sera positive. Mais alors, comme la valeur absolue de la deuxième dérivée et de chaque dérivée de l'ordre pair de la fonction  $\sin x$  est  $\sin x$  et celle de la troisième et de chaque dérivée de l'ordre impair  $\cos x$ , la valeur de la quatrième dérivée sera  $+\sin x$ , et les valeurs  $\cos x$ ,  $-\sin x$ ,  $-\cos x$ ,  $\sin x$  se succéderont périodiquement à partir de la cinquième dérivée. Et la même remarque s'applique aux valeurs  $-\sin x$ ,  $-\cos x$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$  par rapport à la fonction  $\cos x$ .

*Remarque.* — Nous terminerons notre travail par une remarque. Comme on le sait, l'objection la plus sérieuse au calcul différentiel de LEIBNIZ était celle faite par le Hollandais B. NIEUWENTIJT : les dérivées supérieures d'une fonction ne peuvent pas exister, étant donné qu'elles ne possèdent pas de signification géométrique<sup>1</sup>. Or, dans notre travail, nous avons établi, pour la première fois d'une manière incontestable, l'existence géométrique des dérivées supérieures d'une fonction.

<sup>1</sup> L'objection se trouve dans l'ouvrage de NIEUWENTIJT, intitulé *Analysis infinitorum*, 1695, Cap. VIII, et la réponse de LEIBNIZ dans *Acta Eruditorum*, 1695 (une traduction de cette réponse se trouve dans le livre de J. M. CHILD, *The Early mathematical papers of Leibniz*, London, 1920). Comp. aussi M. CANTOR, *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, Bd. III, 2te Aufl., S. 254-56.