

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 24 (1924-1925)  
**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS DES CONIQUES A CENTRE  
**Autor:** Lainé, E.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-515756>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS DES CONIQUES A CENTRE

PAR

E. LAINÉ (Angers)

Si l'on prend les équations paramétriques d'une ellipse sous la forme

$$x = a \cos \varphi, \quad r = b \sin \varphi, \quad (1)$$

on sait qu'il existe, entre les arguments  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ , des quatre points où cette ellipse est coupée par une circonference, la relation simple

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = 2k\pi, \quad (2)$$

où  $k$  est un entier quelconque. Cette relation a été établie pour la première fois par Joachimsthal<sup>1</sup>.

Proposons-nous plus généralement de trouver une relation simple entre les paramètres angulaires des quatre points d'intersection de l'ellipse (1) et de la conique

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \quad (3)$$

Pour préciser, nous ne considérerons que des courbes réelles.

Faisons dans les équations (1) le changement de variable  $z = e^{i\varphi}$ , d'où l'on tire

$$x = a \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad y = b \frac{z^2 - 1}{2iz}.$$

Portant ces valeurs dans l'équation (3), on aura une équation de la forme

$$Aa^2(z^2 + 1)^2 - 2Biab(z^4 - 1) - Cb^2(z^2 - 1)^2 + zP_2(z) = 0,$$

<sup>1</sup> *Journal für reine u. angew. Math.*, 36, 1848.

où  $P_2(z)$  désigne un polynôme du second degré au plus. Le produit des racines de cette dernière équation a pour valeur

$$\frac{Aa^2 - Cb^2 + 2Babi}{Aa^2 - Cb^2 - 2Babi},$$

si l'on pose

$$Aa^2 - Cb^2 + 2Babi = \rho e^{i\delta},$$

ce produit s'écrit simplement  $e^{2i\delta}$ . En revenant à la variable  $\varphi$ , nous aurons la relation

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = 2\delta,$$

c'est-à-dire

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{2Bab}{Aa^2 - Cb^2}, \quad (4)$$

qui comprend évidemment la relation (2) comme cas très particulier.

Remarquons que les deux coniques étant supposées réelles, la somme  $\Sigma\varphi$  est toujours réelle.

Considérons de même l'hyperbole

$$x = a \operatorname{ch} \varphi, \quad y = b \operatorname{sh} \varphi. \quad (5)$$

Si l'on fait le changement de variable  $e^\varphi = z$ , on aura

$$x = a \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad y = b \frac{z^2 - 1}{2z},$$

et l'équation aux  $z$  des points d'intersection de l'hyperbole (5) et de la conique (3) sera de la forme

$$Aa^2(z^2 + 1)^2 + 2Bab(z^4 - 1) + Cb^2(z^2 - 1)^2 + zP_2(z) = 0.$$

Le produit des racines de cette équation sera égal à

$$\frac{Aa^2 - 2Bab + Cb^2}{Aa^2 + 2Bab + Cb^2}.$$

En revenant à la variable  $\varphi$ , on aura donc

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = \log \frac{Aa^2 - 2Bab + Cb^2}{Aa^2 + 2Bab + Cb^2}. \quad (6)$$

Dans les formules (4) et (6), les fonctions arctangente et logarithme sont prises dans toute leur généralité, de sorte que

les seconds membres ne sont déterminés, comme il fallait s'y attendre, qu'à un multiple près de  $2k\pi$  pour l'ellipse et de  $2k\pi i$  pour l'hyperbole.

Prenons d'abord la formule (4). Pour  $B = 0$ , elle contient la formule (2), qui est valable pour les quatre points d'intersection de l'ellipse et de toute conique (parabole comprise) ayant mêmes directions d'axes. Comme autre cas simple, on pourra examiner l'hypothèse

$$Aa^2 - Cb^2 = 0.$$

Par exemple, si  $A$  et  $C$  sont nuls, la conique (3) est une hyperbole équilatère ayant ses asymptotes parallèles aux axes de l'ellipse: nous l'appellerons hyperbole (H). Il existe dans le plan  $\infty^3$  hyperboles (H), parmi lesquelles figurent les  $\infty^2$  hyperboles d'Apollonius associées à l'ellipse. Pour les quatre points de rencontre d'une hyperbole (H) et de l'ellipse, on a la relation

$$\Sigma \varphi_i = (2k + 1)\pi.$$

Soit  $M_i (\varphi_i)$  un point de l'ellipse (1). Le cercle osculateur en  $M_i$  coupe l'ellipse en un second point  $M'_i$  tel que

$$\varphi'_i + 3\varphi_i = 2k\pi.$$

L'hyperbole (H) osculatrice en  $M_i$  coupe de même l'ellipse en un autre point  $M''_i$  tel que

$$\varphi''_i + 3\varphi_i = (2k + 1)\pi.$$

Donc, suivant que les quatre points  $M_1, M_2, M_3, M_4$  sont sur une circonférence ou sur une hyperbole (H), les quatre points  $M'_i$  et les quatre points  $M''_i$  seront aussi sur une circonférence ou sur une hyperbole (H). De même les points  $M''_1, M''_2, M''_3, M''_4$  seront sur une hyperbole (H) ou sur une circonférence, etc. Tous ces théorèmes sont analogues au théorème de Steiner pour les cercles de courbure.

La formule (6) nous permet d'énoncer pour l'hyperbole des propriétés analogues. Si l'on prend  $B = 0$ , on aura la relation

$$\Sigma \varphi_h = 2k\pi i,$$

qui caractérise les quatre points d'intersection de l'hyperbole avec toute conique ayant mêmes directions d'axes. De même, pour les quatre points d'intersection de l'hyperbole avec une hyperbole (H), on aura la relation

$$\Sigma \varphi_h = (2k + 1)\pi i .$$

On en déduit un théorème identique à celui que nous venons d'énoncer pour les cercles et les hyperboles (H) osculateurs à l'ellipse.

Cherchons, pour donner une autre application, les cercles qui coupent l'hyperbole en deux points déterminés,  $\varphi_3$  et  $\varphi_4$ , et la touchent en un autre point d'argument inconnu  $\varphi$ . On devra avoir

$$2\varphi + \varphi_3 + \varphi_4 = 2k\pi i ,$$

d'où deux solutions distinctes

$$\varphi_1 = -\frac{\varphi_3 + \varphi_4}{2} , \quad \varphi_2 = \pi i - \frac{\varphi_3 + \varphi_4}{2} .$$

Cherchons de même les hyperboles (H) qui coupent aussi l'hyperbole aux points  $\varphi_3$  et  $\varphi_4$ , et la touchent en un autre point  $\varphi'$ . On devra avoir

$$2\varphi' + \varphi_3 + \varphi_4 = (2k + 1)\pi i ,$$

d'où 2 solutions distinctes

$$\varphi'_1 = \frac{\pi i}{2} - \frac{\varphi_3 + \varphi_4}{2} , \quad \varphi'_2 = -\frac{\pi i}{2} - \frac{\varphi_3 + \varphi_4}{2} .$$

On a d'ailleurs

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = \pi i , \quad \varphi'_1 + \varphi'_2 + \varphi_3 + \varphi_4 = 0 .$$

Donc par deux points réels A et B de l'hyperbole passent deux cercles,  $(C_1)$  et  $(C_2)$ , qui sont tangents à la conique,  $(C_1)$  en  $C_1$  et  $(C_2)$  en  $C_2$ : les points  $C_1$  et  $C_2$  sont réels et diamétralement opposés, et les quatre points A, B,  $C_1$  et  $C_2$  sont situés sur une hyperbole (H). Par les mêmes points A et B passent deux hyperboles (H), soient  $(H_1)$  et  $(H_2)$ , qui touchent l'hyperbole donnée,  $(H_1)$  en  $H_1$  et  $(H_2)$  en  $H_2$ : les points  $H_1$  et  $H_2$  sont imaginaires et diamétralement opposés, et les quatre points A, B,  $H_1$  et  $H_2$  sont situés sur une circonférence.

Le procédé de démonstration employé plus haut se prête encore à d'autres généralisations. Par exemple, si l'on considère une courbe algébrique (C), où les termes de plus haut degré  $n$  ne contiennent que les puissances de  $y$  de même parité, on aura, pour les  $2n$  points d'intersection de (C) et de l'ellipse, la relation

$$\sum_1^{2n} \wp_h = 2k\pi \quad \text{ou} \quad \sum_1^{2n} \wp_h = (2k+1)\pi ,$$

pour les  $2n$  points d'intersection de (C) et de l'hyperbole, la relation

$$\sum_1^{2n} \wp_h = 2k\pi i \quad \text{ou} \quad \sum_1^{2n} \wp_h = (2k+1)\pi i ,$$

suivant que les exposants de  $y$  dans les termes de degré  $n$  sont pairs ou impairs.

---

## SUR LES DÉTERMINANTS DONT LES ÉLÉMENS SONT DES DÉTERMINANTS

PAR

Marie BYCK (Kieff).

---

1. On voit aisément que:

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & m_1 n_1 \\ & p_1 q_1 \\ a_2 & m_1 n_1 \\ & p_2 q_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 p_1 q_1 \\ a_2 p_2 q_2 \\ 0 & m_1 n_1 \end{vmatrix} ;$$

de même,

$$B = \begin{vmatrix} a_1 b_1 & m_1 n_1 \\ & p_1 q_1 \\ a_2 b_2 & m_1 n_1 \\ & p_2 q_2 \\ a_3 b_3 & m_1 n_1 \\ & p_3 q_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 b_1 p_1 q_1 \\ a_2 b_2 p_2 q_2 \\ a_3 b_3 p_3 q_3 \\ 0 & 0 & m_1 n_1 \end{vmatrix} , \text{ etc.}$$