Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 26 (1927)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE TRIANGLE DES PIEDS DES HAUTEURS

Autor: Streit, Arnold

Kapitel: 1. — Expression des éléments, du périmètre et de la surface du triangle

des pieds des hauteurs en fonction des éléments du triangle donné.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-21251

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Soient A_1 , B_1 , C_1 les sommets du triangle des pieds des hauteurs; a_1 , b_1 , c_1 ses côtés; a_1 , β_1 , γ_1 ses angles; h'_1 , h''_1 , h'''_1 ses hauteurs; r_1 et R_1 les rayons des cercles inscrit et circonscrit; u_1 son périmètre et S_1 sa surface.

Soient enfin respectivement r', r'', r''' les rayons des cercles inscrits dans les triangles aux sommets AB_1C_1 , BC_1A_1 , CA_1B_1 et R', R'', R''' ceux des cercles circonscrits (à ces triangles).

1. — Expression des éléments, du périmètre et de la surface du triangle des pieds des hauteurs en fonction des éléments du triangle donné.

A. Angles. — Les hauteurs du triangle donné sont, comme on sait, les bissectrices des angles du triangle des pieds des hauteurs (fig. 1):

$$\langle AA_1C_1 = \langle AA_1B_1 = \frac{\alpha_1}{2}$$
.

Le quadrilatère ABA₁ B₁ étant inscriptible, on a

$$\langle AA_1B_1 = \langle ABB_1 |$$
,




Fig. 1.

ou

$$\frac{\alpha_{1}}{2} = 90^{\circ} - \alpha ,$$

$$\alpha_{1} = 180^{\circ} - 2\alpha ,$$

$$\beta_{1} = 180^{\circ} - 2\beta ,$$

$$\gamma_{1} = 180^{\circ} - 2\gamma .$$
(1)

Il en résulte

$$\left\{
\begin{array}{l}
\langle C_1 A_1 B = \langle B_1 A_1 C = \alpha, \\
\langle A_1 B_1 C = \langle C_1 B_1 A = \beta, \\
\langle B_1 C_1 A = \langle A_1 C_1 B = \gamma,
\end{array}
\right. (2)$$

c'est-à-dire:

Deux quelconques des côtés du triangle des pieds des hauteurs forment avec le côté sur lequel ils se coupent des angles égaux à l'angle compris entre les deux autres côtés du triangle donné.

Il en résulte:

- 1º Les triangles aux sommets $(AB_1 C_1, BC_1 A_1, CA_1 B_1)$ sont semblables entre eux et au triangle (ABC) donné.
- 2º Les côtés du triangle donné sont les bissectrices des angles extérieurs du triangle des pieds des hauteurs.
 - В. Côtés. a) Expression en fonction des côtés et des angles.

$$\Delta AB_1C_1 \sim \Delta ABC$$
 (fig. 1):

$$\frac{a_1}{a} = \frac{c'}{b} = \cos \alpha ,$$

d'où

$$\begin{cases} a_1 = a \cos \alpha, \\ b_1 = b \cos \beta, \\ c_1 = c \cos \gamma, \end{cases}$$
 (3)

c'est-à-dire

Chaque côté du triangle des pieds des hauteurs est égal au côté correspondant du triangle donné multiplié par le cosinus de l'angle opposé.

b) Expression en fonction des côtés seulement.

De (fig. 1)

$$a_1 = a \cos \alpha$$

 et

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

résulte

$$a_1 = \frac{a(b^2 + c^2 - a^2)}{2bc} .$$
(4)

Les expressions correspondantes de b_1 et c_1 s'obtiennent par permutation circulaire.

C. PÉRIMÈTRE. — En désignant par u', u'' et u''' les périmètres des triangles $AB_1 C_1$, $BC_1 A_1$, $CA_1 B_1$ semblables au triangle ABC de périmètre u, nous avons (fig. 1):

$$\frac{u'}{u} = \frac{a_1}{a} = \cos \alpha ,$$

d'où

$$\begin{cases} u' = u \cos \alpha; \\ u'' = u \cos \beta, \\ u''' = u \cos \gamma; \end{cases}$$

$$u' + u'' + u''' = u \cdot (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) ,$$

ou

$$u + u_1 = u \cdot (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma)$$
,

d'où

$$u_1 = u \cdot [\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma - 1]$$
.

En transformant la parenthèse en un produit, on trouve

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma - 1 = 4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2}.$$

Par suite

$$u_1 = u \cdot \left[4 \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \right], \tag{5}$$

formule calculable par logarithmes.

Mais

$$\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2} = \frac{r}{4R} . \tag{6}$$

Donc, en remplaçant

d'où

$$\begin{cases} u_1 = u \cdot \frac{r}{R}, \\ \frac{u_1}{u} = \frac{r}{R}, \end{cases}$$
 (7)

c'est-à-dire

Théorème. — Les périmètres du triangle des pieds des hauteurs et du triangle donné sont entre eux comme les rayons des cercles inscrit et circonscrit au triangle donné.

D. Surface. — a) Première expression. — Soient S', S'', S''' les surfaces des triangles AB₁ C₁, BC₁ A₁, CA₁ B₁. Ces triangles étant semblables au triangle ABC de surface S, nous avons (fig. 1):

$$\frac{S'}{S} = \frac{a_1^2}{a^2} = \frac{a^2 \cos^2 \alpha}{a^2} = \cos^2 \alpha .$$

Par suite

$$S' = S \cos^2 \alpha ,$$
 $S'' = S \cos^2 \beta ,$
 $S''' = S \cos^2 \gamma ;$
 $S' + S'' + S''' = S . (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) ,$

ou

$$S - S_1 = S. (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)$$
,

d'où

$$S_1 = S \cdot [1 - (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)]$$
 (8)

Mais

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{R - r_1}{R}. \tag{9}$$

On a donc

$$\begin{cases} S_1 = S \cdot \frac{r_1}{R}, \\ \frac{S_1}{S} = \frac{r_1}{R}, \end{cases}$$
 (10)

c'est-à-dire

Théorème. — La surface du triangle des pieds des hauteurs est à la surface du triangle donné comme le rayon du cercle inscrit dans le triangle des pieds des hauteurs est au rayon du cercle circonscrit au triangle donné.

b) Seconde expression.

$$2S_1 \equiv a_1 b_1 \sin \gamma_1$$
 (fig. 1)

Mais

$$a_1=a\cos\alpha$$
, $b_1=b\cos\beta$, $\gamma_1=180-2\gamma$;
$$2S_1=a\cos\alpha.b\cos\beta.\sin(2\gamma)$$
,
$$\sin(2\gamma)=2\sin\gamma\cos\gamma$$
.

Par suite

 $S_1 = (ab \sin \gamma) \cdot \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$

ou

$$\underline{S}_{1} = 2S \cdot (\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma) . \qquad (11)$$

Remarques. — 1. Des formules (8) et (11) résulte

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 1 , \qquad (12)$$

ce qui est la relation des cosinus.

2. De (11) on tire

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{S_1}{2S}. \tag{13}$$

E. RAYON DU CERCLE CIRCONSCRIT (fig. 1). — Le cercle circonscrit au triangle des pieds des hauteurs n'étant autre que le cercle des neuf points, on a

$$R_1 = \frac{R}{2} , \qquad (14)$$

c'est-à-dire

Le rayon du cercle circonscrit au triangle des pieds des hauteurs est égal à la moitié du rayon du cercle circonscrit au triangle donné.

F. RAYON DU CERCLE INSCRIT. — a) Expression en fonction des angles et de R (fig. 2).




Fig. 2.

$$r_1 = i' \sin \frac{\alpha_1}{2} .$$

Or

$$i' = a' \operatorname{tg} (90 - \gamma) = c \cos \beta \cot \gamma$$

 et

$$\sin\frac{\alpha_1}{2} = \sin(90 - \alpha) = \cos\alpha.$$

Donc

$$r_1 = (c \cos \beta \cot \gamma) \cos \alpha = \frac{c}{\sin \gamma} \cos \beta \cos \gamma \cos \alpha$$
,

ou

$$\underline{r_1 = 2R(\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma)}. \tag{15}$$

Remarque. — De (15) résulte

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{r_1}{2R}$$
 (16)

b) Expression en fonction des côtés et de R. (Somme des carrés des côtés d'un triangle).

 $1^{\rm o}$ Le rayon r du cercle inscrit dans un triangle ABC étant donné par la formule

$$r = (p - a) \cdot \lg \frac{\alpha}{2}$$
,

nous avons pour le rayon r_1 du cercle inscrit dans le triangle des pieds des hauteurs (fig. 2):

$$r_1 = (p_1 - a_1) \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha_1}{2} = \left(\frac{a_1 + b_1 + c_1}{2} - a_1\right) \cdot \operatorname{cotg} \alpha$$
,

ou

$$r_1 = \left[\frac{a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma}{2} - a \cdot \cos \alpha\right] \cdot \cot \alpha$$
.

Mais

$$\frac{a \cos \alpha + b \cos \beta + c \cos \gamma}{a + b + c} = \frac{r}{R}.$$
 (17)

Par suite

$$r_{1} = \left[\frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{r}{R} - a \cos \alpha\right] \cdot \cot \alpha =$$

$$= p \cdot \frac{r}{R} \cdot \cot \alpha - \frac{a}{\sin \alpha} \cdot \cos^{2} \alpha ;$$

$$\begin{cases} r_{1} = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \cot \alpha - 2R \cdot \cos^{2} \alpha , \\ r_{1} = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \cot \beta - 2R \cdot \cos^{2} \beta , \\ r_{1} = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \cot \beta - 2R \cdot \cos^{2} \beta , \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{1} = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \cot \beta - 2R \cdot \cos^{2} \beta , \\ r_{2} = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \cot \beta - 2R \cdot \cos^{2} \beta , \end{cases}$$

d'où

$$3r_1 = \frac{p \cdot r}{R} \cdot \left[\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma \right] - 2R \left(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma \right).$$

Or on trouve facilement

$$\cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}. \tag{18}$$

Remplaçons:

$$3r_1 = \frac{S}{R} \cdot \left[\frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S} \right] - 2R(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)$$
.

Mais (9)

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{R - r_1}{R} .$$

Donc

$$3r_1 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4R} - 2(R - r_1) ,$$

d'où

$$r_1 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4R} - 2R . {19}$$




Fig. 3.

2º (Conséquence). — La formule obtenue pour r_1 conduit à une expression pour la somme des carrés des côtés du triangle donné. Il en résulte:

$$4Rr_1 = (a^2 + b^2 + c^2) - 8R^2$$

d'où

$$a^2 + b^2 + c^2 = 8R^2 + 4Rr_1 = 4R^2 + 4R^2 + 2R \cdot 2r_1$$
,
 $a^2 + b^2 + c^2 = (2R)^2 + (2R)^2 + 2R \cdot 2r_1$,

ou

$$\underline{a^2 + b^2 + c^2} = D^2 + D^2 + D \cdot d_1 = D \cdot (2D + d_1) \ , \eqno(20)$$

ou (fig. 3) (20)' S' + S'' + S''' = S, c'est-à-dire

Théorème. — La somme des carrés des côtés d'un triangle acutangle est égale à un rectangle ayant pour base le diamètre du cercle circonscrit et pour hauteur le double diamètre de ce cercle augmenté du diamètre du cercle inscrit dans le triangle des pieds des hauteurs.

Remarque. — Appliqué au triangle rectangle ($\alpha = 90^{\circ}$), ce théorème conduit au théorème de Pythagore:

$$a^2 = b^2 + c^2 ,$$

car D =
$$a$$
 et $d_1 = 0$ (S = 2S', S" + S''' = S').

G. RAYONS DES CERCLES EX-INSCRITS. — Expression de la surface d'un triangle en fonction de r, R et r_1 . — La hauteur, issue de A, du triangle AB_1 C_1 est le rayon r_{a_1} du cercle ex-inscrit au triangle des pieds des hauteurs, tangent à a_1 (fig. 4). Or

$$\Delta AB_1C_1 \sim \Delta ABC$$
:


$$\frac{r_{a_1}}{h'} = \frac{a_1}{a} = \cos \alpha .$$

Mais

$$r_{a_1} \equiv h' \cdot \cos \alpha$$
; $h' \equiv b \sin \gamma$,
 $b \equiv 2R \sin \beta$, $h' \equiv 2R \sin \beta \sin \gamma$;
 $\begin{cases} r_{a_1} \equiv 2R \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma ,\\ r_{b_1} \equiv 2R \cos \beta \sin \gamma \sin \alpha ,\\ r_{c_1} \equiv 2R \cos \gamma \sin \alpha \sin \beta . \end{cases}$ (21)

Conséquences. — De ces formules résulte (fig. 4):

 $r_{a_1} \cdot r_{b_1} \cdot r_{c_1} = 8R^3 (\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma) (\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma)^2$,



Mais (13)

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{S_1}{2S}$$

et

$$\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = \frac{S}{2R^2} . \qquad (22)$$

Par suite

$$r_{a_1} \cdot r_{b_1} \cdot r_{c_1} = \frac{S_1 S}{R} , \ \underline{D_1 \cdot r_{a_1} \cdot r_{b_1} \cdot r_{c_1}} = S_1 \cdot S .$$
 (23)

Or (10)

$$S_1: S = r_1: R$$
, d'où $R = \frac{r_1 S}{S_1}$.

Donc

$$r_{a_1} \cdot r_{b_1} \cdot r_{c_1} = \frac{S_1^2}{r_1}$$
,

d'où

$$\Delta A_{1} B_{1} C_{1} \dots r_{1} \cdot r_{a_{1}} \cdot r_{b_{1}} \cdot r_{c_{1}} = S_{1}^{2}$$

$$\Delta ABC \dots r \cdot r_{a} \cdot r_{b} \cdot r_{c} = S^{2}$$
(23')

On retrouve ainsi une relation connue.

20

$$\begin{split} r_{a_1} &= 4 \mathrm{R_1} \cdot \cos \left(90 - \frac{\alpha_1}{2}\right) \sin \left(90 - \frac{\beta_1}{2}\right) \sin \left(90 - \frac{\gamma_1}{2}\right) \,, \\ r_{a_1} &= 4 \mathrm{R_1} \, \sin \frac{\alpha_1}{2} \, \cos \frac{\beta_1}{2} \, \cos \frac{\gamma_1}{2} \,. \end{split}$$

Donc

$$r_{\alpha} = 4R \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2}$$
.

Par suite

$$r_a \cdot r_b \cdot r_c = 64R^3 \left(\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \right) \left(\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \right)^2 =$$

$$= 64R^3 \cdot \frac{r}{4R} \cdot \frac{(\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma)^2}{16} .$$

Or, de

$$h' + h'' + h''' = 2R[\sin \alpha \sin \beta + \sin \beta \sin \gamma + \sin \gamma \sin \alpha]$$
 (24) et

$$h' + h'' + h''' = 2R + 4r + r_1 + \frac{r^2}{R}$$
 (25)

résulte

$$\sin \alpha \sin \beta + \sin \beta \sin \gamma + \sin \gamma \sin \alpha = \frac{r^2 + 2R^2 + 4rR + r_1R}{2R^2}, (26)$$
 et de (9)

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2 + \frac{r_1}{R}. \qquad (27)$$

Si l'on se base sur (26) et (27), la relation ci-dessus peut s'écrire

$$r_a \cdot r_b \cdot r_c = R^2 \cdot r \left[\left(2 + \frac{r_1}{R} \right) + \frac{r^2 + 2R^2 + 4rR + r_1 R}{R^2} \right] =$$

$$= r \cdot \left[r^2 + 4R^2 + 4rR + 2r_1 R \right] =$$

$$= r \cdot \left[(r + 2R)^2 + 2r_1 R \right],$$

ou, en posant 2R = D

$$\underline{r_a \cdot r_b \cdot r_c} = r \cdot [(r+D)^2 + r_1 D] . \tag{28}$$

De (23) et (28) résulte

$$\underline{S^2 = r^2 \cdot [(r + D)^2 + r_1 D]}. \tag{29}$$

¹ Arnold Streit: « Sur les hauteurs d'un triangle », Enseignement Mathématique, sept. 1926 (p. 44, formule 20).

Cette formule exprime la surface d'un triangle en fonction du rayon du cercle inscrit, du diamètre du cercle circonscrit et du rayon du cercle inscrit dans le triangle des pieds des hauteurs.




Fig. 5.

2. — Distances du centre du cercle circonscrit au triangle donné aux côtés de ce triangle.

La figure (5) donne

ON = R cos
$$\alpha = \frac{s'}{2}$$
,
OT = R cos $\beta = \frac{s''}{2}$,
OV = R cos $\gamma = \frac{s'''}{2}$;
ON + OT + OV = $\frac{1}{2}(s' + s'' + s''')$.
 $s' + s'' + s''' = 2(r + R)$. 1 (30)

Or

¹ Op. cité, p. 42 (formule 11).