Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 30 (1931)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: APPLICATION A LA REPRÉSENTATION CONFORME DES

TRANSFORMATIONS A VARIABLES SÉPARÉES

Autor: Delens, P. C.

Kapitel: XI. Deux faisceaux quadratiques de lignes.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-23887

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Pour une forme $*\alpha^{(2)}$ générale, pour laquelle $\Theta \neq 0$, ou $\Theta'(\mu, \tau) \neq 0$, nous avons montré que les invariants μ, τ, Φ, Θ sont suffisants pour la conservation de l'équation $\alpha^{(2)} = 0$.

34. Au point de vue géométrique, nous considérons que l'équation $\alpha^{(2)} = 0$ définit un double faisceau, ou faisceau du second ordre, de lignes tracées sur une surface; l'équation $\beta^{(2)} = 0$ définit le double faisceau bissecteur du précédent, et $\varpi = 0$ est l'équation d'un faisceau simple, considéré comme premier bissecteur. Le faisceau d'équation $d\mu = 0$ est celui le long duquel l'angle d'ouverture 2ω du faisceau initial est permanent: θ est l'inclinaison du faisceau $d\mu = 0$ sur le faisceau bissecteur $\varpi = 0$; dans le cas général $\Theta \neq 0$, les lignes $\omega = \text{const.}$ et les lignes $\theta = \text{const.}$ forment des faisceaux différents.

Il sera d'autre part naturel d'utiliser la représentation sur un $d^*\sigma^2$ canonique défini par

$$*W^2 = 4 \mu_{\mu} \mu_{\nu} = 4 *P \tag{129}$$

sur lequel les formes * ϖ et $d\mu$ sont semi-normales, donc le faisceau $d\mu = 0$ un faisceau de courbes parallèles, avec $\Delta \mu = 1$.

Au point de vue de l'isothermie, on pourra distinguer les cas suivants:

- 1º L'invariant I de la forme ϖ est nul, ou $\Lambda \varphi = 0$; le double faisceau bissecteur est alors isotherme, et nous pourrons dire que le double faisceau $\alpha^{(2)} = 0$ est hémi-isotherme.
- 2° $\Lambda \omega = 0$; avec $\mu = \cos^2 2\omega$, $\varepsilon = \Omega \mu$, on traduit facilement cette condition avec les invariants de l'équation $\alpha^{(2)} = 0$. Ceci exprime que les deux faisceaux simples appartenant à $\alpha^{(2)} = 0$ font partie d'un même ensemble (I_1) .
 - 3º On a simultanément

$$\Lambda \varphi = 0 \qquad \Lambda \omega = 0 \; ; \tag{130}$$

alors les faisceaux simples de l'équation $\alpha^{(2)} = 0$ font partie d'un même ensemble isotherme, comprenant aussi les faisceaux de $\beta^{(2)} = 0$; nous dirons que ces conditions (130) sont celles d'holo-isothermie de $\alpha^{(2)} = 0$.

XI. DEUX FAISCEAUX QUADRATIQUES DE LIGNES.

35. Nous avons, au Chapitre VI, considéré implicitement un double faisceau orthogonal avec les formes adjointes ϖ et ϖ_i , et montré les

relations entre les opérateurs attachés à ces formes: \mathfrak{I}_u , \mathfrak{I}_v et \mathfrak{O} , \mathfrak{T} . En particulier, l'expression (90) de I

$$-I = -\frac{i}{2} \mathcal{L} \log Q = \frac{1}{2} \mathcal{I} \log q$$

rappelait que, dans le cas d'isothermie des formes

$$\begin{cases}
\varpi = x df = A du + B dv \\
\varpi_i = y dg = i (-A du + B dv)
\end{cases}$$

$$Q = \frac{A}{B} \qquad q = \frac{x}{y}$$
(67)

on avait simultanément

$$Q = \frac{a(u)}{b(o)} \qquad q = \frac{X(f)}{Y(g)}$$

d'où la possibilité de réduction simultanée des équations dudv = 0 et df dg = 0 à des formes $df^2 - dg^2 = 0$ et $du^2 + dv^2 = 0$.

Considérons plus généralement deux formes quadratiques ds^2 et $\alpha^{(2)}$ et pour montrer la symétrie des opérations vis-à-vis de ces formes, imaginons une transformation générale des variables u, v en ξ , η , telle que

$$lpha^{(2)} = L du^2 + 2 M du dv + N dv^2 = C^2 d\xi d\eta$$

$$ds^2 = W^2 du dv = E d\xi^2 + 2 F d\xi d\eta + G d\eta^2.$$

Le déterminant de la transformation étant $\Delta = u_{\xi} \rho_{\eta} - u_{\eta} \rho_{\xi}$, on a les identités

$$\begin{cases} W^{2}u_{\xi}\rho_{\xi} = E & -\frac{C^{2}}{\Delta^{2}}\rho_{\xi}\rho_{\eta} = L \\ W^{2}u_{\eta}\rho_{\eta} = G & -\frac{C^{2}}{\Delta^{2}}u_{\xi}u_{\eta} = N \\ W^{2}(u_{\xi}\rho_{\eta} + u_{\eta}\rho_{\xi}) = 2F & -\frac{C^{3}}{\Delta}(u_{\xi}\rho_{\eta} + u_{\eta}\rho_{\xi}) = 2M \end{cases}.$$

Aux transformations (3) des variables u, v conservant les équations $\alpha^{(2)} = 0$, $ds^2 = 0$, correspondent des transformations de même espèce en ξ , η . On retrouve aussitôt l'invariant du 1^{er} ordre

$$\mu = \frac{M^2}{L N} = \frac{F^2}{EG} = \cos^2 2\omega$$

et par suite la forme invariante $d\mu$. Pour la jacobienne des formes $\alpha^{(2)}$ et ds^2 , on a ensuite l'identité

$$\beta^{(2)} = -i(L du^2 - N dv^2) = \frac{iC^2}{W^2}(E d\xi^2 - G d\eta^2)$$

qui résulte de la syzygie entre deux formes quadratiques et leur jacobienne

 $(W^2 \alpha^{(2)} - 2 M ds^2)^2 - 4 LN (ds^2)^2 = W^4 \beta^{(2)2}$.

L'équation $\beta^{(2)} = 0$ et la forme $d\mu$ étant invariantes, l'emploi des opérateurs attachés à $d\mu$ (n° 33) permet de poursuivre le calcul aussi bien avec les variables ξ , η qu'avec u, ν . Ainsi, à l'invariant τ de la formule (126) correspond, en variables ξ , η l'invariant

$$\overline{\tau} = \frac{\mu_{\xi}}{\mu_{\tau}} \sqrt{\frac{G}{E}} = \frac{c\tau + 1}{\tau + c}$$
 avec $\left(c + \frac{1}{c}\right)^2 = 4\mu$

c'est-à-dire où c est la quantité

$$\sqrt{rac{\overline{\mathrm{Q_1}}}{\mathrm{Q_2}}}=\,e^{2m{i}_{\scriptscriptstyle{00}}}$$

de la formule (119), donc

$$\bar{\tau} = \frac{\cos(\omega - \theta)}{\cos(\omega + \theta)} \qquad (\theta = \psi - \varphi) \ .$$

36. Les méthodes analytiques précédentes ne nécessitent évidemment pas l'introduction des lignes minima et de la représentation conforme; elles s'appliqueront de même aux théories géométriques où un faisceau quadratique de lignes particulières jouera un rôle primordial (lignes asymptotiques, lignes de courbure, etc.), et le dernier problème que nous avons indiqué est celui de la conservation de deux faisceaux quadratiques de lignes; on sait qu'à ce problème se rattache aussi celui de la permutation de deux faisceaux quadratiques, les faisceaux du 1^{er} ordre constituants de deux faisceaux quadratiques pouvant être répartis autrement que dans le groupement primitif. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces problèmes.