

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 33 (1934)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE TRANGHET D'ARCHIMEDE
Autor: Thébault, V.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-26001>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SUR LE TRANCHET D'ARCHIMEDE

PAR

V. THÉBAULT, Le Mans (Sarthe).

M. M. D'OCAGNE a repris des propriétés de la figure constituée par trois demi-cercles de diamètres BC, AC et AB, décrits d'un même côté d'une droite, sur laquelle sont marqués trois points A, B, C (A entre B et C), pour montrer les avantages que peut offrir la méthode de l'inversion en tant que moyen de démonstration¹.

Cette configuration, qui fait l'objet des PROPOSITIONS IV ET V du *Livre des Lemmes* d'ARCHIMÈDE, a beaucoup occupé les géomètres. COCHEZ semble avoir eu le premier l'idée de transformer la figure par rayons vecteurs réciproques². De notre côté, nous avons employé le même procédé pour généraliser la figure envisagée par le géomètre grec³.

Peut-être n'est-il pas sans intérêt d'ajouter encore des compléments.

1. — Soient A, B, C trois points marqués sur une droite (A entre B et C). D'un même côté de cette droite, traçons les demi-cercles (O), (O₁), (O₂) de diamètres BC = 2a, AC = 2b, AB = 2c, puis un demi-cercle, de rayon $R = b + c + d$, concentrique au demi-cercle (O), d étant une longueur donnée. Ce dernier demi-cercle coupe la droite BC en des points B₁, C₁, et BB₁ = CC₁ = d, puis la tangente commune aux demi-cercles

¹ *L'Enseignement mathématique*, 1934, p. 73.

² *Journal de BOURGET*, 1878, p. 354.

³ *Mathesis*, 1931, p. 187; *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, janvier 1935.

$(O_1), (O_2)$ en A, en un point T. Traçons les cercles $(\omega_1), (\omega_2)$ qui touchent la droite AT, le demi-cercle (O), de rayon R, puis respectivement les demi-cercles $(O_1), (O_2)$. Nous allons montrer que les rayons ρ_1, ρ_2 des cercles $(\omega_1), (\omega_2)$ sont égaux.

En prenant A comme pôle d'inversion avec une puissance égale, en valeur absolue, au produit $AB \cdot AC = 4bc$, avec des




Fig. 1.

rayons vecteurs réciproques directement opposés, la droite AT et le cercle (O) se conservent, toutefois avec échange pour chacun d'eux de la partie située en dessus et de la partie située en dessous de la droite BC. Les cercles de diamètres AC et AB ont pour inverses respectivement les perpendiculaires Cx et By à la BC en B et C. Le demi-cercle (O), de rayon R, se transforme

en un demi-cercle, situé en dessous de BC, dont les extrémités B₂, C₂ du diamètre situé sur BC, sont des points tels que

$$AC_2 = \left| \frac{AB \cdot AC}{AC_1} \right| = \frac{4bc}{2b+d}, \quad AB_2 = \frac{4bc}{2c+d}. \quad (1)$$

Mais, quand on transforme un cercle de rayon R par inversion, pour obtenir un cercle de rayon ρ, le rapport $\frac{\rho}{R}$ est égal à celui de la puissance d'inversion à celle du pôle par rapport au premier cercle. Appliquant cette remarque au calcul du rayon ρ du cercle (ω) de diamètre B₂C₂ qui est le transformé du cercle (O), de rayon R, dans l'inversion de pôle A et de module (AB · AC) = 4bc, on a, en valeur absolue,

$$\frac{\rho}{R} = \frac{4bc}{R^2 - AO^2} = \frac{4bc}{(b+c+d)^2 - (b-c)^2};$$

d'où

$$\rho = \frac{4bcR}{(2b+d)(2c+d)} = \frac{4(b+c+d)bc}{(2b+d)(2c+d)}. \quad (2)$$

Dans la même inversion, les cercles (ω₁), (ω₂) deviennent des cercles (ω'₁), (ω'₂) tangents à la droite Az, symétrique de AT par rapport au point A, puis tangents respectivement aux droites By et Cx; les rayons de ces cercles valent donc ρ'₁ = c, ρ'₂ = b.

En vertu de la remarque relative au rapport des rayons de deux cercles inverses,

$$\frac{\rho'_1}{\rho_1} = \frac{\rho_1}{c} = \left| \frac{AB \cdot AC}{A\omega_1'^2 - \rho_1'^2} \right| = \frac{4bc}{A\omega_1'^2 - c^2} = \frac{4bc}{O_2\omega_1'^2}. \quad (3)$$

Or,

$$O_2\omega_1'^2 = \omega\omega'^2 - \omega\overline{O_2^3} = (\rho+c)^2 - \omega\overline{O_2^2} \quad (4)$$

$$\omega O_2 = \omega A + AO_2 = \frac{\rho}{R}(b-c) + c, \quad (5)$$

car, eu égard à (1) et (2),

$$\omega A = \left(\frac{4bc}{2b+d} \right) \cdot \left(\frac{b-c}{2c+d} \right) = \frac{\rho}{R}(b-c). \quad (6)$$

Introduisant la valeur (2) du rayon ρ dans l'égalité (4), il vient, après réductions,

$$O_2 \overline{\omega_1}^2 = \frac{8bc^2(2R+d)}{(2b+d)(2c+d)}, \quad (7)$$

et finalement

$$\rho_1 = \frac{1}{2} \left[\frac{(2b+d)(2c+d)}{2b+2c+d} \right]. \quad (8)$$

Si, au lieu du cercle (ω_1) on considère le cercle (ω_2), il suffit d'intervertir les rôles des demi-cercles (O_1), (O_2), c'est-à-dire de permuter b et c , pour avoir $\rho_1 = \rho_2$. Dans la configuration d'ARCHIMÈDE (PROPOSITION V), si l'on remplace le demi-cercle (O), décrit sur BC comme diamètre, par un demi-cercle concentrique au premier, les demi-cercles (O_1), (O_2) décrits sur AC , AB comme diamètres restant fixes, les rayons des cercles (ω_1), (ω_2) tangents au dernier demi-cercle de centre O , à la perpendiculaire en A à BC , puis respectivement aux demi-cercles (O_1), (O_2), sont égaux.

Remarques. — 1° Lorsque $d = 0$, on retrouve la formule connue

$$\rho_1 = \frac{bc}{b+c} = \frac{bc}{a} = \rho_2. \quad (9)$$

2° La relation (8) conduit aisément à la suivante

$$\frac{1}{2\rho_1} = \frac{1}{2\rho_2} = \frac{1}{2b+d} + \frac{1}{2c+d} - \frac{d}{(2b+d)(2c+d)} \quad (10)$$

qui, pour $d = 0$, devient

$$\frac{1}{\rho_1} = \frac{1}{\rho_2} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}. \quad (11)$$

3° Supposons que les demi-cercles (O_1), (O_2) ne se touchent plus. Soient $AC = 2b$, $BD = 2c$ leurs diamètres; Δ l'axe radical de ces cercles; (O) le demi-cercle de rayon $R = a + d$ concentrique au demi-cercle (O) de diamètre BC . Les rayons ρ_1 , ρ_2 des cercles (ω_1), (ω_2) tangents à Δ , au demi-cercle (O), de rayon R , puis tangents respectivement aux demi-cercles (O_1), (O_2), sont égaux¹.

¹ Cette proposition a été énoncée, sans démonstration, par STEINER (*Œuvres complètes*, t. I, p. 178).

Dans ce cas général, l'évaluation des rayons ρ_1, ρ_2 au moyen de l'inversion est assez laborieuse. Par un calcul direct simple, nous avons obtenu ¹

$$\rho_1 = \rho_2 = \frac{2a(a-b)(a-c)}{(2a+d)(2a-b-c)} + \frac{d}{2}. \quad (12)$$

2. — U et V étant les intersections des demi-cercles décrits sur BO_1, CO_2 comme diamètres avec les demi-cercles $(O_1), (O_2)$, les rayons des cercles inscrits aux triangles curvilignes ABU et BCU sont égaux ainsi que les rayons des cercles inscrits aux triangles curvilignes ACV et CBV. Cette propriété que M. M. d'OCAGNE supposait n'avoir peut-être pas encore été remarquée, paraît appartenir à COCHEZ qui l'a obtenue au moyen de l'inversion ².

Conservons les notations utilisées jusqu'ici, puis considérons les transformés M_1, M_2 des points C et B par l'homothétie de centre A et de module ³ k . Au-dessus de BC, traçons les demi-cercles $(O'_1), (O'_2)$ sur BM_1, CM_2 comme diamètres, puis les cercles $(\omega_1), (\omega_2)$ tangents au demi-cercle (O), à la droite $AT \equiv \Delta$ et respectivement aux demi-cercles $(O'_1), (O'_2)$. Soient X_1, Y_1, Z_1 et X_2, Y_2, Z_2 les contacts respectifs. Nous allons prouver que les rayons des cercles $(\omega_1), (\omega_2)$ sont égaux.

Observons d'abord que la droite $AT \equiv \Delta$ est l'axe radical des cercles $(O'_1), (O'_2)$, puisque

$$|AM_1 \cdot AB| = |k \cdot AC \cdot AB| = |AM_2 \cdot AC|. \quad (13)$$

De plus, le point X_1 étant l'un des centres de similitude des cercles (O) et (O'_1) , la droite CX_1 rencontre le cercle (O'_1) au point T_1 de contact de la tangente à ce cercle qui est perpendiculaire à BC. La droite AY_1 coupe le cercle (O'_1) au contact de ce cercle avec la tangente perpendiculaire à BC, c'est-à-dire au point Z_1 . Soient M, N les points de rencontre des droites CT, BT avec les demi-cercles $(O'_1), (O'_2)$; μ la projection orthogonale du point M sur BC.

¹ Annales de la Société scientifique de Bruxelles, loc. cit.

² Loc. cit.

³ Pour fixer les idées, nous supposons $k < 1$.

les droites Δ et Δ_2 , Δ_2 étant la perpendiculaire à BC qui passe par le point N; le diamètre du cercle (ω_2) est égal à $T_2Z_2 = 2\rho_2$.

Les diamètres des cercles (ω_1) , (ω_2) , égalant les distances des sommets M, N du rectangle MTNE formé par les droites CT, BT, $O_1'N$, $O_2'M$ à sa diagonale TE, sont égaux, ce qui justifie la proposition que nous avons énoncée.

Si l'on observe que

$$AO_1 = k \cdot AC = 2kb, \quad AO_2 = k \cdot AB = 2kc, \quad (15)$$

les égalités

$$\frac{CA}{C\mu} = \frac{CB}{CM_2} = \frac{CB}{CA + AM_2} = \frac{a}{b + kc}, \quad (16)$$

$$\frac{b}{\rho_1} = \frac{CA}{\mu A} = \frac{CA}{CA - C\mu} = \frac{a}{a - (b + kc)}, \quad (17)$$

conduisent à l'expression des rayons des cercles (ω_1) , (ω_2) ,

$$\rho_1 = \frac{b[a - (b + kc)]}{a} = \frac{b(b + c - b - kc)}{a} = (1 - k) \frac{bc}{a} = \rho_2. \quad (18)$$

Si $\alpha = \frac{bc}{a}$ désigne le rayon des cercles égaux inscrits aux triangles mixtilignes ATB et ACT,

$$\frac{\rho_1}{\alpha} = \frac{\rho_2}{\alpha} = 1 - k. \quad (19)$$

3. — Reprenons la figure envisagée par M. M. D'OCAGNE, où les demi-cercles (O_1') , (O_2') sont décrits sur CO_2 , BO_1 comme diamètres et pour laquelle $k = 1 : 2$. Cherchons les rayons ρ_1' , ρ_2' des cercles (φ_1) , (φ_2) inscrits aux triangles mixtilignes AUP, APV.

Transformons la figure par une inversion $(A, 4bc)$. Le demi-cercle (O_2') , de diamètre BO_1 , devient le demi-cercle de diamètre CD, en dessous de BC, le point D étant tel que

$$|AO_1 \cdot AD| = |AB \cdot AC| = 4bc,$$

d'où

$$AD = \frac{4bc}{b} = 4c = 2AB. \quad (20)$$

Le demi-cercle (O_1) et la droite AT se transforment en les perpendiculaires By et Az à la droite BC, en dessous de cette droite. Le cercle (φ'_1), inverse du cercle (φ_1), touche donc les droites By, Az et le cercle (C_1) dont le centre C_1 est au milieu du segment rectiligne O_1D ; le rayon du cercle (φ_1) est égal à c .

En vertu de la remarque relative au rapport des rayons de deux cercles inverses, déjà utilisée,

$$\frac{\rho'_1}{c} = \left| \frac{AB \cdot AC}{O_2 \overline{O_1}^2} \right| = \frac{4bc}{C_1 \overline{O_1}^2 - C_1 \overline{O_2}^2} \quad (21)$$

Mais

$$C_1 \overline{O_1} = \frac{1}{2} CD + c = \frac{1}{2} (CA + AD) + c = \frac{1}{2} (2b + 4c) + c = b + 3c, \quad (22)$$

$$C_1 \overline{O_2} = CO_2 - CC_1 = CO_2 - \frac{1}{2} CD = 2b + c - (b + 2c) = b - c. \quad (23)$$

Dès lors,

$$\frac{\rho'_1}{c} = \frac{4bc}{(b + 3c)^2 - (b - c)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{b}{b + c},$$

$$\rho'_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{bc}{b + c} = \frac{1}{2} \cdot \frac{bc}{a}, \quad (24)$$

et, permutant b et c ,

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{bc}{a} = \rho'_1 = \rho'_2. \quad (25)$$

Si α_1, α_2 désignent les rayons des cercles inscrits aux triangles mixtilignes ACT, ATB, α'_1, α'_2 ceux des cercles inscrits aux triangles mixtilignes CTP, BPT,

$$\alpha_1 = \frac{bc}{a} = \alpha_2, \quad \alpha'_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{bc}{a} = \alpha'_2, \quad (26)$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2\alpha'_1 = 2\alpha'_2 = 2\rho'_1 = 2\rho'_2. \quad (27)$$

Les diamètres des cercles inscrits aux triangles mixtilignes CTP, BPT, AUP, APV sont égaux aux rayons des cercles inscrits aux triangles mixtilignes CTA, ATB.

4. — Envisageons les cercles (β_1) , (β_2) , de rayons γ_1 , γ_2 , inscrits aux triangles mixtilignes ACP, APB. Dans la même inversion (A, $\frac{1}{4}bc$), le cercle (β_1) , par exemple, devient un cercle (β'_1) tangent aux droites By, Az et au cercle (B_1) de diamètre $BE = BC + 2AC = 2(2b + c)$; le rayon du cercle (β'_1) est égal à c . Dès lors, on a

$$\frac{\gamma_1}{c} = \frac{4bc}{O_2\beta_1'^2} = \frac{4bc}{B_1\beta_1'^2 - B_1O_2^2}. \quad (28)$$

Or,

$$B_1\beta_1' = \frac{1}{2}BE + c = 2b + c + c = 2(b + c) \quad (29)$$

$$B_1B_2 = B_1B - O_2B = \frac{1}{2}BE - c = 2b + c - c = 2b. \quad (30)$$

Par suite,

$$\frac{\gamma_1}{c} = \frac{4bc}{4[(b + c)^2 - b^2]} = \frac{b}{2b + c}; \quad \gamma_1 = \frac{bc}{2b + c} = \frac{bc}{a + b}; \quad (31)$$

puis, permutant b et c ,

$$\frac{bc}{b + 2c} = \frac{bc}{a + c} = \gamma_2. \quad (32)$$

Finalement, on déduit les relations remarquables

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{c} = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\gamma_1} - \frac{1}{\gamma_2}, \quad (33)$$

β , γ étant les rayons des cercles inscrits aux triangles curvilignes ABU et BCU, ACV et CBV.

5. — En passant, M. M. D'OCAGNE (*loc. cit.*), a rappelé l'expression

$$\frac{\pi}{2}(a^2 - b^2 - c^2) = \frac{\pi}{2}[(b + c)^2 - b^2 - c^2] = \pi bc, \quad (34)$$

de l'aire du triangle curviligne ABC qui a reçu le nom de *tranchet d'Archimède*. Elle est donc égale à celle du cercle de diamètre AT.

¹ M. D'OCAGNE, *loc. cit.*

Considérons la figure constituée par deux cercles *quelconques* (O_1) , (O_2) que, pour fixer les idées, nous supposons *extérieurs* l'un à l'autre. Leur ligne des centres O_1O_2 rencontre ces cercles respectivement en des points A et C , D et B (A et D entre B et C). Traçons les demi-cercles (O) , (O') sur BC , AD comme diamètres, le premier en dessus, le second en dessous de BC . Soit Δ l'axe radical des cercles (O_1) , (O_2) qui coupe le demi-cercle (O) en un point T , le demi-cercle (O') en un point T' .




Fig. 3.

Les droites CT et AT' , BT et DT' rencontrent les cercles (O_1) , (O_2) aux contacts M , N de ces cercles avec leur tangente commune extérieure et la figure $MTNT'$ est un rectangle. Si l'on pose

$$BC = 2a, \quad AC = 2b, \quad DB = 2c, \quad CD = 2a - b - c,$$

on obtient aisément

$$\overline{MN}^2 = \overline{TT'}^2 = 4(a - b)(a - c). \quad (35)$$

L'aire S, intérieure au cercle (O), limitée par les demi-circon-
férences (O), (O₁), (O₂), (O') a pour expression

$$\begin{aligned} S &= \frac{\pi}{2} [a^2 - b^2 - c^2 + (2a - b - c)^2] = \pi [a^2 + bc - a(b + c)] \\ &= \pi(a - b)(a - c) = \pi \left(\frac{MN}{2}\right)^2 = \pi \left(\frac{TT'}{2}\right)^2. \end{aligned} \quad (36)$$

Lorsque les demi-cercles (O₁), (O₂) se touchent en A, l'aire S ainsi déterminée est celle du *tranchet*. Si les demi-cercles (O₁), (O₂) ont des rayons égaux, la figure limitée par les quatre demi-circon-
férences, considérée aussi par ARCHIMÈDE¹, est connue sous le nom de *Salinon*, ou *feuille d'ache* (τέλενον). Notre formule (36) permet donc d'énoncer le théorème suivant qui généralise les PROPOSITIONS IV et XIV du géomètre grec :

*Sur le diamètre BC d'un cercle (O), on marque deux points A et D (entre B et C), puis on décrit les demi-cercles (O₁), (O₂), (O') sur AC, DB, AD, comme diamètres, les deux premiers en dessus, le troisième en dessous de BC. Soit Δ l'axe radical des cercles (O₁), (O₂) qui rencontre les demi-cercles (O), (O') en des points T, T'. L'aire limitée par les demi-circon-
férences (O), (O₁), (O₂), en dessus de BC, et par la demi-circon-
férence (O'), en dessous de BC, est équivalente à celle du cercle décrit sur TT' comme diamètre.*

N. B. — Si les cercles (O₁), (O₂) sont sécants, il y a lieu de faire intervenir un sens à l'aire comprise entre les demi-circon-
férences, et la propriété subsiste.

¹ Livre des heures.