

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 33 (1934)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: DEUX THÉORÈMES REMARQUABLES DE STEWART
Autor: Toscano, Letterio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-26002>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DEUX THÉORÈMES REMARQUABLES DE STEWART

PAR

Letterio TOSCANO (Messine).

1. — Dans l'*Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie* (troisième édition conforme à la première, Paris, Gauthier-Villars, 1889), CHASLES s'exprime ainsi à propos des œuvres de STEWART (p. 174-175):

« Le livre des *Théorèmes généraux* contient soixante-quatre propositions, dont cinquante seulement ont le titre de théorèmes; des quatorze autres, trois sont au commencement de l'ouvrage et servent pour les démonstrations des théorèmes, et les onze autres le terminent; celles-ci sont, pour la plupart, des propriétés du cercle.

« Des soixante-quatre propositions, les huit premières seulement sont démontrées; on y trouve les cinq premiers théorèmes. L'auteur annonce, dans une courte préface, que, pour démontrer tant de théorèmes si généraux et de si grande difficulté, il lui aurait fallu plus de temps qu'il ne pouvait en consacrer à ce travail.

« Je ne sais si, dans la suite, Stewart a restitué les démonstrations de ses théorèmes, ou si on les a trouvées dans ses papiers, et quel usage on en a fait. »

D'après ce texte, nous ne concluons pas à l'existence de démonstrations ultérieures de ces théorèmes, qui ne furent qu'énoncés et sont maintenant presque oubliés.

Cependant, dans cette note, nous nous proposons de démontrer les propositions 40 et 42 de l'œuvre de Stewart, qui sont les plus générales et qui en contiennent beaucoup d'autres comme cas particuliers.

2. — Pour démontrer nos théorèmes, nous calculons d'abord la somme des puissances semblables des racines pour une équation fondamentale de la polygonométrie.

On connaît l'équation de WARING

$$x^m - \frac{m}{1} \binom{m-2}{0} \rho^{\frac{2}{m}} x^{m-2} + \frac{m}{2} \binom{m-3}{1} \rho^{\frac{4}{m}} x^{m-4} - \frac{m}{3} \binom{m-4}{2} \rho^{\frac{6}{m}} x^{m-6} + \dots$$

$$\dots + (-1)^r \frac{m}{r} \binom{m-r-1}{r-1} \rho^{\frac{2r}{m}} x^{m-2r} + \dots - 2\rho \cos \varphi = 0,$$

qui admet les racines

$$x_k = 2 \rho^{\frac{1}{m}} \cos \left(\frac{\varphi}{m} + \frac{2k\pi}{m} \right) \quad k = 0, 1, 2, \dots, (m-1).$$

En posant $\rho = \frac{1}{2^m}$ nous avons l'équation

$$2^m x^m - \frac{m}{1} 2^{m-2} \binom{m-2}{0} x^{m-2}$$

$$+ \frac{m}{2} 2^{m-4} \binom{m-3}{1} x^{m-4} - \frac{m}{3} 2^{m-6} \binom{m-4}{2} x^{m-6} + \dots$$

$$\dots + (-1)^r \frac{m}{r} 2^{m-2r} \binom{m-r-1}{r-1} x^{m-2r} + \dots - 2 \cos \varphi = 0,$$

qui admet les racines

$$x_k = \cos \left(\frac{\varphi}{m} + \frac{2k\pi}{m} \right) \quad k = 0, 1, 2, \dots, (m-1).$$

Calculons, pour cette seconde équation, la somme

$$S_i = x_0^i + x_1^i + x_2^i + \dots + x_{m-1}^i, \quad (i < m).$$

Par l'application de la formule de NEWTON, nous avons

$$S_1 = 0; \quad S_2 - 2 \frac{m}{2^2} = 0, \quad \text{d'où} \quad S_2 = \frac{1}{2} m, \quad S_3 = 0.$$

$$S_4 - \frac{1}{2^2} \frac{m}{1} S_2 + 4 \frac{1}{2^4} \frac{m}{2} \binom{m-3}{1} = 0, \quad \text{d'où} \quad S_4 = \frac{1.3}{2.4} m; \quad S_5 = 0;$$

$$S_6 - \frac{1}{2^2} \frac{m}{1} S_4 + \frac{1}{2^4} \frac{m}{2} \binom{m-3}{1} S_2 - 6 \frac{1}{2^6} \frac{m}{3} \binom{m-4}{2} = 0,$$

d'où

$$S_6 = \frac{1.3.5}{2.4.6} m ; \quad S_7 = 0 ;$$

$$S_8 - \frac{1}{2^2} \frac{m}{1} S_6 + \frac{1}{2^4} \frac{m}{2} \binom{m-3}{1} S_4 - \frac{1}{2^6} \frac{m}{3} \binom{m-4}{2} S_2 + 8 \frac{1}{2^8} \frac{m}{4} \binom{m-5}{3} = 0 ,$$

d'où

$$S_8 = \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} m .$$

En général, les relations

$$S_{2k-1} = 0 , \quad S_{2k} = \frac{1.3 \dots (2k-1)}{2.4 \dots 2k} m ,$$

étant vérifiés pour une valeur de k , pourront, par la méthode d'induction, se démontrer pour $k + 1$.

Sans donner la démonstration, nous admettons ces formules pour le cas général, tant que $2k < m$.

PROPOSITION 40 DE STEWART. — Soit un polygone régulier de m côtés, circonscrit à un cercle de rayon R ; soit n un nombre quelconque plus petit que m . Si, d'un point quelconque (pris à l'intérieur du polygone si n est impair, et pris partout où l'on voudra si n est pair), on abaisse des perpendiculaires sur les côtés du polygone: la somme des puissances n de ces perpendiculaires sera égale à

$$m(R^n + A v^2 R^{n-2} + B v^4 R^{n-4} + C v^6 R^{n-6} + \dots) ,$$

où v est la distance du point au centre du cercle et où l'on a

$$A = \frac{1}{2} \binom{n}{2} , \quad B = \frac{1.3}{2.4} \binom{n}{4} , \quad C = \frac{1.3.5}{2.4.6} \binom{n}{6} , \dots$$

Démonstration. — Etant donné un polygone régulier de m côtés, soient O et R le centre et le rayon du cercle inscrit et soit \mathcal{P} un point quelconque intérieur au polygone; soit v la distance de \mathcal{P} au centre O .

Désignant par α le plus petit des angles que forme $O\mathcal{P}$ avec

les apothèmes et par d_1, d_2, \dots, d_m , les distances de \mathcal{P} aux côtés du polygone, on a

$$\begin{aligned}
 d_1 &= R - v \cos \alpha \\
 d_2 &= R - v \cos \left(\frac{2\pi}{m} - \alpha \right) \\
 d_3 &= R - v \cos \left(\frac{4\pi}{m} - \alpha \right) \\
 &\dots \dots \dots \\
 d_k &= R - v \cos \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) \\
 &\dots \dots \dots \\
 d_m &= R - v \cos \left(\frac{2(m-1)\pi}{2} - \alpha \right).
 \end{aligned}$$

Si le point \mathcal{P} est extérieur au polygone, il faut remplacer dans les formules précédentes certains d_k par $-d_k$.

Alors, pour n quelconque si \mathcal{P} est intérieur au polygone, et n pair si \mathcal{P} est extérieur au polygone, on a

$$d_k^n = \left\{ R - v \cos \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) \right\}^n,$$

c'est-à-dire

$$d_k^n = \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i \binom{n}{i} R^{n-i} v^i \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right).$$

En effectuant la somme par rapport à l'indice k , on obtient

$$\begin{aligned}
 S = d_1^n + d_2^n + \dots + d_m^n &= \sum_{k=1}^{k=m} \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i \binom{n}{i} R^{n-i} v^i \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) = \\
 &= \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i \binom{n}{i} R^{n-i} v^i \sum_{k=1}^{k=m} \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right).
 \end{aligned}$$

Mais au n°2 nous avons trouvé que

$$\sum_{k=1}^{k=m} \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right)$$

est égal à zéro si i est impair, et égal à $\frac{1.3 \dots (i-1)}{2.4 \dots i} m$ si i est pair; donc en posant $i = 2j$, on a finalement

$$S = m \sum_{j=0}^{j=\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{1.3 \dots (2j-1)}{2.4 \dots 2j} \binom{n}{2j} R^{n-2j} v^{2j},$$

$\left[\frac{n}{2}\right]$ étant la partie entière de $\frac{n}{2}$.

PROPOSITION 42 DE STEWART. — Soit un polygone régulier de m côtés, inscrit dans un cercle de rayon R ; et soit n un nombre entier plus petit que m . Si l'on prend arbitrairement un point du plan du polygone dont la distance au centre du cercle soit v , la somme des puissances $2n$ des distances de ce point à tous les sommets du polygone sera égale à

$$m(R^{2n} + a^2 v^2 R^{2n-2} + b^2 v^4 R^{2n-4} + c^2 v^6 R^{2n-6} + \dots),$$

où

$$a = \binom{n}{1}, \quad b = \binom{n}{2}, \quad c = \binom{n}{3}, \dots$$

Démonstration. — Etant donné un polygone régulier de m côtés, soient O et R le centre et le rayon du cercle circonscrit et soit \mathcal{T} un point quelconque intérieur ou extérieur au polygone; soit v la distance de \mathcal{T} au centre O .

Désignant par α le plus petit des angles que forme v avec les rayons R et par d_1, d_2, \dots, d_m , les distances de \mathcal{T} aux sommets du polygone, on a dans tous les cas:

$$\begin{aligned} d_1^2 &= R^2 + v^2 - 2Rv \cos \alpha \\ d_2^2 &= R^2 + v^2 - 2Rv \cos \left(\frac{2\pi}{m} - \alpha \right) \\ d_3^2 &= R^2 + v^2 - 2Rv \cos \left(\frac{4\pi}{m} - \alpha \right) \\ &\dots \dots \dots \\ d_k^2 &= R^2 + v^2 - 2Rv \cos \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) \\ &\dots \dots \dots \\ d_m^2 &= R^2 + v^2 - 2Rv \cos \left(\frac{2(m-1)\pi}{m} - \alpha \right). \end{aligned}$$

Il s'ensuit que

$$\begin{aligned}
 S &= d_1^{2n} + d_2^{2n} + \dots + d_m^{2n} = \sum_{k=1}^{k=m} \left\{ R^2 + v^2 - 2Rv \cos \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) \right\}^n \\
 &= \sum_{k=1}^{k=m} \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i \binom{n}{i} (R^2 + v^2)^{n-i} 2^i R^i v^i \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right) = \\
 &= \sum_{i=0}^{i=n} (-1)^i 2^i \binom{n}{i} (R^2 + v^2)^{n-i} R^i v^i \sum_{k=1}^{k=m} \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right).
 \end{aligned}$$

Mais

$$\sum_{k=1}^{k=m} \cos^i \left(\frac{2(k-1)\pi}{m} - \alpha \right)$$

est égal à zéro si i est impair, et égal à $\frac{1.3 \dots (i-1)}{2.4 \dots i} m$ si i est pair; donc en posant $i = 2j$, on a

$$S = m \sum_{j=0}^{j=\left[\frac{n}{2}\right]} \binom{n}{2j} 2^{2j} \frac{1.3 \dots (2j-1)}{2.4 \dots 2j} R^{2j} v^{2j} (R^2 + v^2)^{n-2j}.$$

En outre

$$2^{2j} \frac{1.3 \dots (2j-1)}{2.4 \dots 2j} = \binom{2j}{j}$$

et ainsi

$$S = m \sum_{j=0}^{j=\left[\frac{n}{2}\right]} \binom{n}{2j} \binom{2j}{j} R^{2j} v^{2j} (R^2 + v^2)^{n-2j}.$$

Par le développement de $(R^2 + v^2)^{n-2j}$ on obtient

$$S = m \sum_{j=0}^{j=\left[\frac{n}{2}\right]} \sum_{l=0}^{l=n-2j} \binom{n}{2j} \binom{2j}{j} \binom{n-2j}{l} R^{2n-(2j+2l)} v^{2j+2l},$$

et en développant le second membre et ordonnant suivant les puissances de R on a

$$S = m \sum_{t=0}^{t=n} C_t R^{2n-2t} v^{2t},$$

où

$$C_t = \binom{n}{0} \binom{0}{0} \binom{n}{t} + \binom{n}{2} \binom{2}{1} \binom{n-2}{t-1} + \binom{n}{4} \binom{4}{2} \binom{n-4}{t-2} + \dots \\ \dots + \binom{n}{2h} \binom{2h}{h} \binom{n-2h}{t-h} + \dots + \binom{n}{2t} \binom{2t}{t} \binom{n-2t}{0},$$

c'est-à-dire

$$C_t = \sum_{h=0}^{h=t} \binom{n}{2h} \binom{2h}{h} \binom{n-2h}{t-h}.$$

D'autre part

$$\begin{aligned} \binom{n}{2h} \binom{2h}{h} \binom{n-2h}{t-h} &= \frac{n!}{(h!)^2 (t-h)! (n-t-h)!} = \\ &= \frac{n!}{(h!)^2 (t-h)! (n-t-h)!} \frac{(t-h+1)(t-h+2)\dots t}{(t-h+1)(t-h+2)\dots t} = \\ &= \frac{n!}{(h!)^2 (t-h)! (n-t-h)!} \frac{(n-t-h+1)(n-t-h+2)\dots(n-t)}{(n-t-h+1)(n-t-h+2)\dots(n-t)} = \\ &= \frac{n!}{t!(n-t)!} \frac{(n-t)(n-t-1)\dots(n-t-h+1)}{h!} \frac{t(t-1)\dots(t-h+1)}{h!} = \\ &= \binom{n}{t} \binom{n-t}{h} \binom{t}{t-h}, \end{aligned}$$

et ainsi

$$C_t = \sum_{h=0}^{h=t} \binom{n}{t} \binom{n-t}{h} \binom{t}{t-h} = \binom{n}{t} \sum_{h=0}^{h=t} \binom{n-t}{h} \binom{t}{t-h}.$$

Mais

$$\sum_{h=0}^{h=t} \binom{n-t}{h} \binom{t}{t-h} = \binom{n}{t};$$

il s'ensuit

$$C_t = \binom{n}{t}^2.$$

Alors, on a en définitive :

$$S = m \sum_{t=0}^{t=n} \binom{n}{t}^2 R^{2n-2t} v^{2t}.$$

Messine, 8 décembre 1933 (XII).

(Traduction de M. A. Pittet, Genève.)