

<b>Zeitschrift:</b>	L'Enseignement Mathématique
<b>Herausgeber:</b>	Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
<b>Band:</b>	33 (1934)
<b>Heft:</b>	1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE
 <b>Artikel:</b>	 ÉTUDE RATIONNELLE DU PROBLÈME DE LA TRISECTION DE L'ANGLE
<b>Autor:</b>	d'Ocagne
<b>Kapitel:</b>	trisection de l'angle.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-25987">https://doi.org/10.5169/seals-25987</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Les autres, au contraire, comportant un certain tâtonnement dans la mise en place d'une des lignes qui y interviennent (tâtonnement, d'ailleurs, d'une réalisation toujours rapide et que peut faciliter l'emploi d'une courbe d'erreur), aboutiraient, si leur exécution était affranchie de toute erreur, au résultat théoriquement exact. Je dis de celles-ci qu'elles sont *anormales*.

2. — Il va sans dire que s'il s'agit d'un problème d'ordre transcendant, il ne peut être question que de constructions normales. C'est le cas, par exemple, pour la quadrature du cercle, ou, plus généralement, pour la rectification d'un arc de cercle quelconque. On voudra bien, à cette occasion, me permettre de rappeler que j'ai fait connaître<sup>1</sup> de ce dernier problème une solution normale, d'une extrême simplicité, fournissant en pratique toute la précision que l'on peut désirer.

Pour les problèmes d'ordre algébrique, on a le choix entre des solutions normales et des solutions anormales; c'est notamment le cas du problème de la trisection de l'angle, auquel va être consacrée cette étude.

#### LA TRISECTION DE L'ANGLE.

3. — Il convient de remarquer tout d'abord que l'on peut se borner au seul cas des angles aigus, attendu que, s'il s'agit d'un angle obtus, il suffit, pour en avoir le tiers, de retrancher le tiers de l'angle aigu supplémentaire de l'angle de  $60^\circ$  dont la construction est rigoureuse.

La plupart des solutions proposées pour le problème de la trisection sont du type anormal, à commencer par celle, dite de Nicomède, la plus classique, qui peut s'énoncer ainsi: *si un cercle, de rayon r quelconque, ayant pour centre le sommet O de l'angle AOB à trisecter, coupe les côtés de cet angle en A et B<sup>2</sup>, la droite issue de B qui coupe le cercle en C et la droite OA en D, de*

<sup>1</sup> *Nouvelles Annales de Mathématiques*, 4<sup>me</sup> série, t. VII, p. 1; 1907. Voici cette construction: si le point C de la corde AB est tel que  $AC = \frac{2}{3}AB$  et que le rayon OC coupe

l'arc AB en D, on a très sensiblement corde AD =  $\frac{2}{3}$  arc AB.

<sup>2</sup> Le lecteur est prié de faire la figure.

telle sorte que  $CD = r$ , est parallèle à la trisectrice cherchée. En effet, les triangles OBC et COD étant isocèles, on a les égalités d'angles  $\text{AOB} = \text{OBD} + \text{ODB}$ , et  $\text{OBD} = \text{OCB} = 2\text{ODB}$ , d'où  $\text{AOB} = 3\text{ODB}$ .

J'ai, pour ma part, fait connaître<sup>1</sup> une propriété fort simple se traduisant par une autre construction anormale: *si la trisectrice issue de O coupe en E la corde AB du cercle et en F le cercle de centre A et de rayon AO, on a EF = OA*. En effet, si l'on pose  $\text{AOB} = \omega$ , les angles AOF et AFO sont égaux à  $\frac{\omega}{3}$ , OAB et OBA à  $\frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2}$ , on en déduit que  $\text{OAF} = \pi - \frac{2\omega}{3}$ , puis que  $\text{EAF} = \text{OAF} - \text{OAB} = \frac{\pi}{2} + \frac{\omega}{2} - \frac{2\omega}{3}$  et que  $\text{AEF} = \pi - \text{EOB} - \text{OBA} = \frac{\pi}{2} + \frac{\omega}{2} - \frac{2\omega}{3}$ ; donc  $\text{EAF} = \text{AEF}$ ; par suite, le triangle FAE est isocèle et  $EF = AF = r$ .

Mais les solutions les plus intéressantes, au point de vue du tracé, sont les solutions normales; nous allons en examiner ici quelques-unes particulièrement dignes de remarque.

4. — Rappelons tout d'abord qu'il n'est ici question que d'angles  $\omega$  compris entre 0 et  $90^\circ$ . Toute construction normale appliquée à un tel angle fournit un angle  $\theta$  présentant par rapport à  $\frac{\omega}{3}$  un certain écart  $\varepsilon$ , d'ailleurs supposé négligeable, mais qui peut se déterminer mathématiquement et dont la considération conduit à une nouvelle distinction à observer parmi ces solutions normales: suivant que, pour  $\omega$  variant de 0 à  $90^\circ$ ,  $\varepsilon$  croît constamment à partir de 0 jusqu'à une certaine valeur  $\mathcal{E}$ , ou s'annule pour  $\omega = 0$  et  $\omega = 90^\circ$ , en présentant un maximum dans l'intervalle, la solution est dite à *écart ouvert jusqu'à  $\mathcal{E}$* , ou à *écart fermé*. Notre attention va d'abord se porter sur deux solutions à écart fermé, puis sur une troisième à écart ouvert.

#### PREMIÈRE SOLUTION NORMALE (A ÉCART FERMÉ).

5. — Marquons sur l'axe Ox les points  $O''$ ,  $O'$  et  $A$  tels qu'en suivant le sens positif on ait  $O''O' = O'O = OA = 1$ , les

<sup>1</sup> *Revue générale des sciences*, t. XLIV, p. 625; 1933.