

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 33 (1934)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE TRANCHET D'ARCHIMÈDE
Autor: d'Ocagne
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-25989>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SUR LE TRANCHET D'ARCHIMÈDE

PAR

M. d'OAGNE, Membre de l'Institut (Paris).

Voici un exemple particulièrement typique, me semble-t-il, des avantages qu'en tant que moyen de démonstration, peut offrir la méthode de l'inversion, ou des rayons vecteurs réciproques.

1. — Soient A, B, C trois points marqués sur une droite (A entre B et C). D'un même côté de cette droite traçons les demi-cercles de diamètres BC, AC et AB; ils forment un triangle curviligne ABC qui a reçu le nom de *tranchet* ($\alpha\rho\beta\eta\lambda\omega\varsigma$) d'Archimède. Si A_0 , B_0 , C_0 sont les centres de ces cercles, traçons aussi les cercles de diamètres BB_0 et CC_0 ; ils se coupent sur la tangente commune AT aux cercles de diamètres AB et AC; si, en effet, on appelle P le point où l'un ou l'autre de ces deux cercles coupe la droite AT, on obtient dans les deux cas

$$AP^2 = 2bc,$$

lorsqu'on représente par a , b , c les rayons des demi-cercles de diamètres BC, AC et AB, rayons tels, d'ailleurs, que

$$a = b + c. \quad (1)$$

Remarquons en passant que l'aire du tranchet est donnée par

$$\frac{\pi}{2}(a^2 - b^2 - c^2) = \frac{\pi}{2}[(b + c)^2 - b^2 - c^2] = \pi bc.$$

Elle est donc double de celle du cercle de diamètre AP.

2. — U et V étant les points de rencontre des demi-cercles de diamètre BB_0 et CC_0 respectivement avec les demi-cercles AC et AB du tranchet, chacune des transversales constituées par la droite AT et par les arcs de cercle BU et CV divise le tranchet en deux segments, et l'on a ces curieuses propriétés : *dans chacun de ces trois couples de segments, les rayons des cercles inscrits sont égaux.*

Cette propriété est depuis longtemps connue en ce qui concerne les segments formés par la droite AT . Peut-être n'a-t-elle pas encore été remarquée en ce qui concerne ceux formés respectivement par les arcs BU et CV . C'est par l'inversion que nous allons démontrer l'une et l'autre de ces propositions; elle permet d'éviter des calculs assez laborieux.

3. — Etablissons d'abord un lemme. Si r et r' sont les rayons de deux cercles inverses l'un de l'autre par rapport au pôle O ; T et T' , les points de contact de ces cercles avec une de leurs tangentes communes issues de O , on a

$$\frac{r'}{r} = \frac{OT'}{OT} = \frac{OT \cdot OT'}{OT^2},$$

ou, si \mathcal{I} désigne la puissance d'inversion et \mathcal{C} la puissance du point O par rapport au cercle de rayon r ,

$$\frac{r'}{r} = \frac{\mathcal{I}}{\mathcal{C}} \quad (2)$$

4. — En prenant A comme pôle d'inversion avec une puissance égale au produit $AB \cdot AC$, c'est-à-dire, en valeur absolue,

$$\mathcal{I} = 4bc \quad (3)$$

avec des rayons vecteurs réciproques directement opposés, on est ramené, pour trouver les rayons des cercles inscrits, à résoudre des problèmes bien plus faciles que ceux qui se présentent dans la détermination directe.

Dans une telle inversion, la droite AT et le cercle de diamètre BC se conservent, toutefois avec échange pour chacun d'eux de la partie située en-dessus et de la partie située en-dessous de la

droite BC. Les cercles de diamètres AC et AB ont pour inverses respectivement les perpendiculaires à la droite BC en B et en C. Pour le cercle BB₀, les points B et C étant correspondants l'un de l'autre, on obtient comme inverse un cercle de diamètre CD dont le rayon B₁C est donné, en vertu de (2) et (3), par

$$B_1C = \frac{4bc}{2bc} \left(c + \frac{b}{2} \right) = 2c + b = a + c.$$

5. — Déterminons d'abord le rayon du cercle inscrit dans le segment ABT. Il a pour inverse, d'après ce qui vient d'être dit, le cercle, de centre I, tangent à la fois à AT, au cercle BC et à la tangente à celui-ci en C. Le rayon de ce cercle inverse est donc égal à b , et, d'après la formule (2), si \mathcal{C} représente ici la puissance du pôle A par rapport à ce cercle de centre I, le rayon α du cercle inscrit cherché est donné, compte tenu de (3), par

$$\alpha = \frac{4b^2c}{\mathcal{C}}.$$

Or, ici,

$$\mathcal{C} = AH^2 = B_0I^2 = A_0I^2 - A_0B_0^2.$$

Mais

$$A_0I = a + b, \quad A_0B_0 = BB_0 - A_0B = b + 2c - a = a - b.$$

Donc

$$\mathcal{C} = (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

et

$$\alpha = \frac{bc}{a}. \quad (4)$$

Si, au lieu du cercle inscrit dans ABT, on considère celui inscrit dans ACT, il suffit d'intervertir les rôles des cercles AC et BC, c'est-à-dire de permute b et c . La valeur de α reste donc la même et la première proposition — la proposition, depuis longtemps classique, comme nous l'avons déjà dit — est établie.

6. — Cherchons maintenant le rayon du cercle inscrit dans le segment ABU, cercle dont l'inverse, d'après ce qui a été vu au n° 4, est le cercle de centre J tangent à la fois aux per-

perpendiculaires élevées en B et en C à BC, ainsi qu'au cercle CD dont le rayon B_1C est égal à $a + c$. Le rayon de ce cercle (J) est égal à a ; par suite, en vertu des formules (2) et (3), \mathcal{C} étant cette fois la puissance du pôle A par rapport au cercle de centre J, le rayon β du cercle inscrit cherché est donné par

$$\beta = \frac{4abc}{\mathcal{C}}.$$

Or, ici,

$$\mathcal{C} = AJ^2 - a^2,$$

et

$$AJ^2 = A_0J^2 + AA_0^2 = B_1J^2 - A_0B_1^2 + AA_0^2.$$

On a d'ailleurs immédiatement

$$\begin{aligned} B_1J &= B_1F + FJ = a + c + a = 2a + c, \\ A_0B_1 &= CB_1 - CA_0 = a + c - a = c, \\ AA_0 &= A_0B - AB = a - 2c. \end{aligned}$$

Par suite,

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= (2a + c)^2 - c^2 + (a - 2c)^2 - a^2 \\ &= 4(a^2 + c^2), \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\beta = \frac{abc}{a^2 + c^2}. \quad (5)$$

Pour avoir le rayon du cercle inscrit dans le segment BCU, il suffit de permute a et c , ce qui laisse inchangée la valeur de β ; d'où la seconde proposition.

7. — Bien entendu, de la même façon, on aurait, pour le rayon des cercles inscrits dans les segments ACV et CBV, la formule

$$\gamma = \frac{abc}{a^2 + b^2}. \quad (6)$$

Remarquons que les formules (4), (5), (6) peuvent être groupées sous la forme

$$a^2\alpha = (a^2 + c^2)\beta = (a^2 + b^2)\gamma = abc,$$

et qu'on en déduit sans peine les relations remarquables

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c} .$$

