Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 34 (1935)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR CERTAINES ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES DU

SECOND ORDRE DU TYPE PARABOLIQUE

Autor: Guigue, René

Kapitel: I. — Les équations du type parabolique RÉDUCTIBLES À LA FORME

 $\frac{\alpha^2 z}{\det y^2} + X\frac{\partial z}{\det x} = 0$

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-26616

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

 ${\bf X}$ étant une fonction de la seule variable x, car il suffit de faire ensuite

$$x' = -\int \frac{dx}{X}$$

pour obtenir l'équation de la chaleur.

L'examen de ce cas fait l'objet de la première partie de cette étude.

Un autre cas intéressant est celui où l'équation parabolique donnée peut prendre la forme

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + Y \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Comme nous le montrerons dans la Seconde partie il sera bien souvent possible d'obtenir des solutions particulières d'une équation de cette forme.

I. — LES ÉQUATIONS DU TYPE PARABOLIQUE RÉDUCTIBLES À LA FORME

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + X \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

1. — Soient z(x, y) et f(x, y) deux fonctions des deux variables x et y. Nous désignerons par Z(z) la fonction de x et y définie par

$$Z(z) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + f(x, y) \frac{\partial z}{\partial x} . \tag{1}$$

L'opération Z possède évidemment les propriétés suivantes:

$$Z(y) = 0 , (2)$$

$$\mathbf{Z}\left(x\right) = f\left(x\,,\,y\right)\,\,,\tag{3}$$

$$Z(X) = fX', (4)$$

où X désigne une fonction de x seul.

De même

$$Z(Y) = Y'',$$
 $Z(AB) = AZ(B) + BZ(A) + 2A_yB_y.$ (5)

En particulier, si B est fonction de x seul

$$Z(AB) = AZ(B) + BZ(A). (5')$$

Dans la suite nous aurons besoin de $Z(f^{-\frac{1}{2}})$. On montre facilement que

$$Z\left(f^{-\frac{1}{2}}\right) = \frac{3}{4}f^{-\frac{5}{2}}f^{2} - \frac{1}{2}f^{-\frac{3}{2}}f_{yy} - \frac{1}{2}f^{-\frac{1}{2}}f_{x}. \tag{6}$$

2. — Application. — Dans une précédente étude ¹ nous avons montré que la condition pour que l'équation

$$Z(z) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + f(x, y) \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$
 (1')

puisse être ramenée à une équation de la même forme mais dans laquelle le coefficient de $\frac{\partial z}{\partial x}$ dépend de la seule variable x est que l'expression

$$f^{-3} \left(3 f_y^2 - 2 f f_{yy} - 2 f^2 f_x \right)$$

soit fonction de x seul, ce que l'on peut écrire, d'après (6),

$$f^{-\frac{1}{2}}Z(f^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{X'}{X}, \qquad (7)$$

ou encore

$$XZ\left(f^{-\frac{1}{2}}\right) + X'f^{\frac{1}{2}} = 0$$
.

Or il résulte de (5') et de (4) que cette équation s'écrit

$$\mathbf{Z}\left(\mathbf{X}f^{-\frac{1}{2}}\right) = 0 \tag{7'}$$

et alors l'équation (1') pourra être mise sous la forme

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{1}{X^2} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \tag{1"}$$

par un changement convenable 2 de la variable y

$$y' = \mu(x, y) .$$

¹ Lignes asymptotiques et Equation de la Chaleur (L'Enseignement math., 1934). 2 Loc. cit. (1^{re} partie).

Si l'on a, en particulier,

$$\mathbf{Z}\left(f^{-\frac{1}{2}}\right) = 0.$$

c'est que X'=0, X= cte et le changement de variable considéré conduira directement à l'équation de la chaleur.

Théorème I. — En résumé pour que l'équation (1') soit réductible à l'équation de la chaleur il suffit qu'on sache déterminer une fonction X de x telle que $Xf^{-\frac{1}{2}}$ soit une solution de cette équation (1').

3. — Les deux équations (7) et (7') sont équivalentes. Explicitons la première en posant $f^{-\frac{1}{2}} = u$. Elle devient

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{X'}{X} u^{-1} = 0 . \tag{8}$$

Développons de même (7') en posant $Xf^{-\frac{1}{2}} = v$. Elle s'écrit alors

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{X^2}{\varphi^2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 ,$$

puisque $f(x, y) = \frac{X^2}{v^2}$.

Si l'on fait, dans cette dernière $x' = \int \frac{dx}{X^2}$ nous aurons

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial v}{\partial x'} = 0 . ag{8'}$$

Théorème II. — Il résulte de ce qui précède que l'intégration de l'équation du second ordre 1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = F(x) u^{-1}$$
 (9)

se ramène à l'intégration de l'équation de même forme mais dépourvue de second membre

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 . (9')$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial u^2} + \frac{G(x)}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = F(x) u^{-1} .$$

¹ On peut même prendre (9) sous la forme plus générale

Théorème III. — On connaîtra donc toutes les équations de la forme (1') réductibles à l'équation de la chaleur par un changement de variables si l'on sait intégrer l'équation (9'). A toute solution de l'équation (9') correspondra ainsi une équation (1') réductible à l'équation de la chaleur et qu'il sera aisé de former.

Inversement, supposons connue une solution de l'équation de la chaleur. En substituant à la variable y cette solution, l'équation de la chaleur se présentera sous la forme (1'), la fonction f qui figure dans cette dernière possédant la propriété suivante:

à un facteur près, fonction de x seul, $f^{-\frac{1}{2}}$ est solution de (9'). Ceci est une conséquence presque évidente des résultats déjà obtenus. On peut d'ailleurs en donner une vérification directe comme suit:

Soit $\mu(x, y) = y'$ une solution de

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial x} = 0 . ag{\alpha}$$

Si on fait le changement de variables $y' = \mu(x, y)$, x étant conservé, (α) devient

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y'^2} + \frac{1}{\mu_y^2} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 . ag{\beta}$$

Montrons que $\lambda = \mu_y$ est solution de l'équation

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y'^2} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 . (\gamma)$$

On suppose évidemment que λ a été exprimé en fonction de x et y'.

La relation $dy' = \mu_x dx + \mu_y dy$ donne

$$dy = \frac{1}{\mu_y} dy' - \frac{\mu_x}{\mu_y} dx ,$$

d'où

$$\frac{\partial y}{\partial y'} = \frac{1}{\mu_y}, \qquad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{\mu_x}{\mu_y}.$$

Donc

$$egin{aligned} rac{\partial \lambda}{\partial y'} &= rac{\mu_{yy}}{\mu_y} \,, & rac{\partial^2 \lambda}{\partial y'^2} &= rac{\mu_y \mu_{yyy} - \mu_{yy}^2}{\mu_y^3} \,, \ rac{\partial \lambda}{\partial x} &= \mu_{xy} - \mu_{yy} rac{\mu_x}{\mu_y} &= rac{\mu_y \mu_{xyy} - \mu_x \mu_{yy}}{\mu_y} \end{aligned}$$

Si l'on écrit que λ vérifie l'équation (γ) on devra avoir

$$\mu_{y}\,\mu_{yyy} - \mu_{yy}^{2} + \mu_{y}\,\mu_{xy} - \mu_{x}\,\mu_{yy} = 0$$

ou bien

$$\mu_y \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \left(\mu_{yy} \, + \, \mu_x \right) - \mu_{yy} \left(\mu_{yy} \, + \, \mu_x \right) \, = \, 0 \; \; , \label{eq:epsilon}$$

ce qui est bien vérifié puisqu'on suppose que $\mu(x, y)$ est solution de (α) .

Théorème IV. — Donc: A toute solution de l'équation de la chaleur correspond une solution de l'équation (9').

En un mot:

Théorème V. — L'intégration de l'équation de la chaleur et l'intégration de l'équation $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ constituent deux problèmes équivalents, la connaissance d'une solution de l'une entraînant nécessairement la connaissance d'une solution de l'autre.

4. — Aux considérations précédentes se rattachent d'intéressantes applications géométriques. Une famille de courbes Γ étant donnée dans le plan xoy la détermination des surfaces admettant un système d'asymptotiques (ou une famille de géodésiques) dont les projections sur le plan xoy sont les courbes Γ conduit à une équation du second ordre du type parabolique. Un cas important est celui où cette dernière peut être ramenée à l'équation de la Chaleur.

Sur le premier de ces problèmes on pourra consulter mon travail déjà cité (Lignes asymptotiques et Equation de la Chaleur).

J'ai consacré également une étude au second, et j'ai établi que, sous certaine condition à remplir par les courbes Γ , la solution dépendrait de l'intégration de l'équation (9') donc, en dernière analyse, de l'équation de la Chaleur.