

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 36 (1937)
Heft: 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LES DIVISIONS SEMBLABLES TRACÉES SUR LES CÔTÉS D'UN TRIANGLE
Autor: Marchay, R.
Kapitel: IV. — Systèmes orthogonaux.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-28036>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

d'un autre côté

$$\frac{\sin \lambda_1}{\sin \mu_1} = \lim \cdot \frac{\sin \widehat{M'L'V}}{\sin \widehat{L'M'V}} = \lim \cdot \frac{M'V}{L'V} \quad (7)$$

et d'après (4), (5), (6)

$$\frac{\sin \lambda_1}{\sin \mu_1} = \frac{\overline{M_1V} \cdot M'V}{\overline{L_1V} \cdot L'V} \times \frac{l}{m} = \frac{l}{m} \quad (8)$$

$$\lambda_1 = \lambda, \quad \mu_1 = \mu. \quad (9)$$

On aurait de même $\mu_2 = \mu$, $\nu_2 = \nu$, donc zz' et xx' se confondent avec une parallèle à δ .

Les deux coniques (C) et (A) ont cette parallèle pour tangente commune. Le cercle Γ correspondant est une ligne droite qui passe par V et se confond avec xz ; il peut être exclu du groupe des quatre cercles Γ qui passent en général par V.

Donc: *dans tout système convergent, l'enveloppe de la corde commune au cercle variable Γ et à une position fixe Γ_0 quelconque de ce cercle est une conique Σ tangente à Δ_1 , Δ_2 et δ .*

IV. — SYSTÈMES ORTHOGONAUX.

11. — Si Δ_1 , Δ' et δ passent par un même point Ω la conique Σ se réduit à Ω et, par suite, la corde commune à Γ et Γ_0 passe constamment par ce point.

Donc dans tout système convergent, si Δ_1 , Δ' et δ passent par un même point, le cercle Γ reste orthogonal à un cercle fixe, ayant pour centre le point d'intersection de ces trois droites.

Nous dirons alors que le système est *orthogonal*.

12. — Soient l , m , n , les trois paramètres définis au n° 7, et satisfaisant à l'équation (1) de ce numéro.

Proposons-nous de construire un système convergent orthogonal, l'angle φ étant arbitraire.

La direction δ est donnée par les équations (3) n° 8 et δ se trouve comme étant une droite de Simson ($\pi - \varphi$) de direction donnée.

Soient Ω l'intersection de Δ_1 et Δ_2 ; S_1, S_2 les intersections de D avec le cercle circonscrit O , S_3 le troisième point dont la droite de Simpson (φ) passe par Ω ; et Δ_3 cette droite. (D, δ) étant un angle égal à φ , la direction D est connue. Le point S_3 est donné alors par le théorème n° 5, et Ω est déterminé comme intersection de Δ_3 et de δ puisque δ doit passer par Ω .

S_1, S_2 sont alors les intersections de O avec une conique qui passe par S_3, Ω etc... (n° 5, 1^{er} alinéa).

Si $\varphi \neq \pm \frac{\pi}{2}$ il n'y a qu'une position de Ω et par suite de D , le système se trouve alors parfaitement déterminé.

Si $\varphi = \frac{\pi}{2}$ les droites Δ_3 et δ coïncident, et il y a une infinité de positions pour D ; ce qui démontre le théorème de Lemoyne dont le cas précédent est une généralisation.

13. — On peut se demander maintenant si cette généralisation n'est pas illusoire, en d'autres termes si le cercle variable Γ n'est pas toujours circonscrit au triangle podaire ordinaire d'un point qui décrit une droite ou une conique circonscrite.

Or si L, M, N , étaient les projections orthogonales sur a, b, c , d'un même point, les projetantes seraient tangentes à une conique de foyer S et dont le cercle principal aurait pour rayon celui de Γ multiplié par $\cos \cdot \varphi$.

Cette conique aurait trois tangentes qui passeraient par un même point.

En outre le point qui a L pour projection sur a , et le second point d'intersection de Γ avec b , pour projection sur b , ne décrit pas en général une droite.

Donc, les cas où $\varphi \neq \frac{\pi}{2}$ sont bien distincts de celui de Lemoyne.

V. — AUTRE GÉNÉRALISATION.

14. — Par un point donné ne passent que trois positions du cercle podaire d'un point qui décrit une droite. Ceci résulte du n° III-10 puisque les projections du point sur les côtés déterminent un système convergent.