

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 37 (1938)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: FORMULES DU TÉTRAÈDRE
Autor: Delens, Paul
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-28593>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

FORMULES DU TÉTRAÈDRE

PAR

M. Paul DELENS (Le Havre).

Des recherches récentes, exposées en particulier dans *Mathesis* (*Sur la géométrie du tétraèdre*, LI, 1937, p. 119-127 et 444-456; LII, 1938, p. 62-79), m'ont conduit à l'introduction, pour le tétraèdre, d'un système fondamental (surabondant) de sept angles, liés par deux relations identiques. Ceci permet d'établir, à partir d'une grandeur de base, des formules *heptagonométriques* du tétraèdre, suffisamment analogues aux formules trigonométriques du triangle, qui semblent susceptibles de rendre les mêmes services — au moins quand il s'agit de propriétés en rapport avec la géométrie anallagmatique; mais les relations connues relatives aux propriétés projectives, affines et purement métriques du tétraèdre s'expriment simplement aussi avec les angles en question.

Les démonstrations nécessaires ayant déjà été publiées (*loc. cit.*), je me contente ici — à part quelques rappels de relations intermédiaires et quelques adjonctions — de donner un tableau des formules explicites, relatives aux principaux éléments, qui en découlent; tableau qu'on prolongera sans peine en tenant compte de mes Notes précitées et des résultats classiques.

1. Définitions et notations. — Soient $\mathfrak{T} \equiv ABCD$ le tétraèdre de base, V son volume, R le rayon de sa sphère circonscrite \mathcal{O} , l et $\sin \mathfrak{T}$ la corde et le sinus du tétraèdre. Les longueurs des arêtes sont $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, $DA = a'$, $DB = b'$, $DC = c'$.

et je pose $j = a, b, c$, $j' = a', b', c'$. Les angles dièdres de \mathfrak{T} sont $\mathcal{J} = \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, $\mathcal{J}' = \mathcal{A}', \mathcal{B}', \mathcal{C}'$, respectivement *opposés* aux arêtes j, j' .

Je désigne par $J = A, B, C, D$ les sommets de \mathfrak{T} et *les angles des faces opposées avec la sphère* \mathcal{Q} . L'indice J est affecté aux éléments relatifs aux sommets et aux faces opposées; les angles des faces sont ainsi $B_A, C_A, D_A; C_B, D_B, A_B$; etc. De même h_J, s_J, R_J, τ_J , hauteurs de \mathfrak{T} , aires des faces, rayons des cercles circonscrits à ces faces, angles trièdres de \mathfrak{T} ; $\sin \tau_J$, *sinus de l'angle trièdre* τ_J ;

$$\vartheta_J = 4R_J s_J = ab'c', bc'a', ca'b', abc \quad (J = A, B, C, D).$$

L'indice $i = 1, 2, 3$ est relatif aux paires d'arêtes opposées DA et BC, DB et CA, DC et AB; associé aussi aux couples de lettres j, j' et $\mathcal{J}, \mathcal{J}'$; h_i et η_i sont les bihauteurs de \mathfrak{T} et les angles des arêtes opposées

$$\eta_i = (DA, BC), (DB, CA), (DC, AB) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Je désigne par Θ un triangle *associé* à \mathfrak{T} , J_i ses angles, \mathcal{S} sa surface, $\mathcal{R}, \mathcal{R}_0, \mathcal{R}_i$ les rayons des cercles circonscrit, inscrit, exinscrits. Les éléments du triangle associé Θ_s de von STAUDT, de côtés

$$j_i = aa', bb', cc' \quad (i = 1, 2, 3)$$

reçoivent en général l'indice s ($\mathcal{S}_s, \mathcal{R}_s, \mathcal{R}_{0s}, \mathcal{R}_{is}$), et ceux du triangle associé *réduit* (de von STAUDT) Θ_s^0 de côtés $j_i^0 = j_i/2R$, l'indice *supérieur* 0; plus généralement cet indice affectera les éléments *réduits*, obtenus en divisant par $2R$ les quantités homogènes à des longueurs.

Le système d'angles fondamentaux est celui des J_i et J , en relation étroite avec celui des grandeurs j_i et ϑ_J . La grandeur de base choisie dans la suite est $2R$.

Abbreviations:

$\sigma_i, \gamma_i, \theta_i, \chi_i$	pour	$\sin J_i, \cos J_i, \operatorname{tg} J_i, \operatorname{cotg} J_i,$
$\sigma_J, \gamma_J, \theta_J, \chi_J$	pour	$\sin J, \cos J, \operatorname{tg} J, \operatorname{cotg} J,$
$P = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3,$		$S = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3;$
$Q_i(x_J) = x_B x_C + x_D x_A, \quad x_C x_A + x_D x_B, \quad x_A x_B + x_D x_C$		

pour quatre quantités arbitraires x_J , et

$$2 \sum \sigma_i Q_i(x_J) \equiv 2P(x_J) \equiv \sum x_J P_J(x_J) .$$

Pour les χ_J , je pose

$$Q_i(\chi_J) = Q_i, \quad P(\chi_J) = P \quad (\text{identité fondamentale}), \quad P_J(\chi_J) = P_J .$$

Remarques. — Dans les formules qui suivent, les mesures d'angles sont prises en valeur absolue (de 0 à 2π); je ne reviens pas sur les conventions d'orientation que nécessite en particulier la comparaison de divers tétraèdres. Comme en trigonométrie, les formules introduiront pour certaines quantités des évaluations algébriques. Enfin ces formules seront, suivant les cas, écrites avec des lettres ou indices courants (J, i, j, J, \dots) ou particularisés — les formules semblables à celle donnée s'obtenant alors par permutation circulaire.

2. Relations préliminaires. — Les identités angulaires fondamentales sont

$$\Sigma J_i = \pi, \quad \Sigma \sigma_i Q_i = P \quad \left(2P = \Sigma \chi_J P_J, \quad P_J = \frac{\partial P}{\partial \chi_J} \right). \quad (1)$$

La première entraîne de nombreuses identités trigonométriques connues du triangle Θ . Je détaille pour la seconde les deux systèmes de relations inverses.

$$\left\{ \begin{array}{l} P_A = \sigma_3 \chi_B + \sigma_2 \chi_C + \sigma_1 \chi_D, \\ P_B = \sigma_3 \chi_A + \sigma_1 \chi_C + \sigma_2 \chi_D, \\ P_C = \sigma_2 \chi_A + \sigma_1 \chi_B + \sigma_3 \chi_D, \\ P_D = \sigma_1 \chi_A + \sigma_2 \chi_B + \sigma_3 \chi_C, \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2P\chi_A = -P_A + \gamma_3 P_B + \gamma_2 P_C + \gamma_1 P_D, \\ 2P\chi_B = \gamma_3 P_A - P_B + \gamma_1 P_C + \gamma_2 P_D, \\ 2P\chi_C = \gamma_2 P_A + \gamma_1 P_B - P_C + \gamma_3 P_D, \\ 2P\chi_D = \gamma_1 P_A + \gamma_2 P_B + \gamma_3 P_C - P_D, \end{array} \right.$$

D'après l'identité $\Sigma \sigma_i \gamma_i = 2P$ de Θ , on peut encore donner à (1)₂ une des formes

$$\Sigma \sigma_i (\gamma_i - Q_i) = P \quad \text{ou} \quad \Sigma \sigma_i (2Q_i - \gamma_i) = 0 . \quad (1')$$

En posant

$$\Pi_i = Q_i(P_j) = P_B P_C + P_D P_A , \quad P_C P_A + P_D P_B , \quad P_A P_B + P_D P_C ,$$

on déduit de (2) les relations des types

$$\left\{ \begin{array}{l} \Pi_1 = (\Sigma \sigma_i^2) Q_i + 2\sigma_1 \sigma_2 Q_2 + 2\sigma_1 \sigma_3 Q_3 + \sigma_2 \sigma_3 (\Sigma \chi_j^2) , \\ 4P^2 Q_1 = (1 + \Sigma \gamma_i^2) \Pi_1 + 2(\gamma_1 \gamma_2 - \gamma_3) \Pi_2 \\ \quad + 2(\gamma_1 \gamma_3 - \gamma_2) \Pi_3 + (\gamma_2 \gamma_3 - \gamma_1) (\Sigma P_j^2) ; \end{array} \right.$$

d'où, en tenant compte de $\sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1^2 = 2\sigma_2 \sigma_3 \gamma_1 = 2P \chi_1$,

$$\begin{aligned} \sigma_1 \Pi_1 &= P \{ \Sigma \sigma_i^2 + \Sigma \chi_j^2 - 2(\sigma_2 Q_2 + \sigma_3 Q_3) \chi_1 \} , \\ \frac{\sigma_3 \Pi_3 - \sigma_2 \Pi_2}{2P} &= \gamma_3 Q_3 - \gamma_2 Q_2 - P(\chi_3 - \chi_2) . \end{aligned}$$

Finalement, d'après l'identité $P(\chi_3 - \chi_2) = \gamma_3^2 - \gamma_2^2$ de Θ , on obtient

$$\frac{\sigma_3 \Pi_3 - \sigma_2 \Pi_2}{2P} = \gamma_3 (Q_3 - \gamma_3) - \gamma_2 (Q_2 - \gamma_2) . \quad (3)$$

3. Formules usuelles. — Les relations essentielles utilisées ici étant

$$\left\{ \begin{array}{l} v_J = 2s_J \cdot 2R_J , \quad 6V = 2s_J h_J , \\ \frac{v_J}{6V} = \frac{2R_J}{h_J} = \frac{P_J}{P} , \end{array} \right. \quad (4)$$

$$l = \frac{h_A h_B h_C h_D}{6V} , \quad (5)$$

$$2S_s = 6V \cdot 2R \quad \text{ou} \quad 6V = 2S_s^0 \cdot 2R , \quad (6)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} j_1 = aa' = 2\mathcal{R}_s \sigma_1 , \quad j_1 j_2 j_3 = (2\mathcal{R}_s)^3 P = \sqrt{v_A v_B v_C v_D} , \\ a^2 = \frac{v_D v_A}{j_2 j_3} , \quad a'^2 = \frac{v_B v_C}{j_2 j_3} , \end{array} \right. \quad (7)$$

on obtient

$$\begin{aligned}
 2R_J &= 2R\sigma_J, \quad h_J = 2RP\frac{\sigma_J}{P_J}, \\
 6V &= \frac{(2RP)^3}{P_A P_B P_C P_D}, \\
 2s_A &= \frac{(2RP)^2}{\sigma_A P_B P_C P_D}, \quad \sigma_A = 2R\frac{(2RP)^2}{P_B P_C P_D}, \\
 a &= 2R\sqrt{\frac{P\sigma_1}{P_B P_C}}, \quad a' = 2R\sqrt{\frac{P\sigma_1}{P_D P_A}}, \quad j_i = (2R)^2 \frac{P\sigma_i}{\sqrt{P_A P_B P_C P_D}}, \\
 2\mathcal{R}_s &= (2R)^2 \frac{P}{\sqrt{P_A P_B P_C P_D}}, \quad 2\mathcal{S}_s = 2R\frac{(2RP)^3}{P_A P_B P_C P_D}, \\
 l &= 2RP\sigma_A\sigma_B\sigma_C\sigma_D.
 \end{aligned} \tag{I}$$

Ajoutons encore à ces formules

$$\begin{aligned}
 a^2 + a'^2 &= (2R)^2 \frac{P\sigma_1\Pi_1}{P_A P_B P_C P_D}, \\
 \frac{c^2 + c'^2 - (b^2 + b'^2)}{2aa'} &= \frac{\sigma_3\Pi_3 - \sigma_2\Pi_2}{2\sigma_1\sqrt{P_A P_B P_C P_D}}, \quad h_i \sin \eta_i = \frac{2RP^2}{\sigma_i\sqrt{P_A P_B P_C P_D}};
 \end{aligned} \tag{II}$$

le deuxième est l'expression de $\cos \eta_1$, tandis que les quantités $h_i \sin \eta_i$ sont les hauteurs du triangle Θ_s^0 .

4. Autres formules. — On utilisera ici en particulier les relations

$$\frac{\sin \alpha}{a'} = \frac{6V}{2s_B \cdot 2s_C}, \quad \frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sigma_B \sigma_C}{2\mathcal{R}_s^0}, \tag{8}$$

$$l = 2R \sin \mathcal{C} = h_J \sin \tau_J, \tag{9}$$

$$\sin D_A = \frac{\sin \tau_D}{\sin \mathcal{B} \sin \mathcal{C}} = \frac{a}{2R_A}. \tag{10}$$

Les principales formules relatives aux angles sont

$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{P_D P_A \sigma_1}{P}} \cdot \sigma_B \sigma_C, \quad \sin \alpha' = \sqrt{\frac{P_B P_C \sigma_1}{P}} \cdot \sigma_D \sigma_A,$$

$$\sin \alpha \sin \alpha' = \frac{\sqrt{P_A P_B P_C P_D}}{P} \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \sigma_1,$$

$$\sin \beta \sin \gamma = \frac{\sqrt{P_B P_C \sigma_2 \sigma_3}}{P} \sigma_A^2 \sigma_B \sigma_C P_D,$$

$$\cos \alpha = -\gamma_B \gamma_C + \sigma_B \sigma_C \gamma_1, \quad \cos \alpha' = -\gamma_D \gamma_A + \sigma_D \sigma_A \gamma_1, \quad (III)$$

$$\cos \alpha \cos \alpha' = \gamma_A \gamma_B \gamma_C \gamma_D + \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \gamma_1 (\gamma_1 - Q_1),$$

$$\sin \tau = P \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D,$$

$$\sin \tau_D = \sigma_A \sigma_B \sigma_C P_D, \quad \sin D_A = \frac{P}{\sigma_A \sqrt{P_B P_C \sigma_2 \sigma_3}},$$

$$\cos \eta_1 = \frac{\sigma_3 \Pi_3 - \sigma_2 \Pi_2}{2 \sigma_1 \sqrt{P_A P_B P_C P_D}}.$$

On trouvera, en tenant compte de $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \theta_1 \theta_2 \theta_3$, une expression symétrique simple

$$\Sigma \theta_i \cos \mathcal{J} \cos \mathcal{J}' = \gamma_A \gamma_B \gamma_C \gamma_D \theta_1 \theta_2 \theta_3 + \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D P. \quad (11)$$

Pour les angles η_i on a l'identité connue $\Sigma j_i \cos \eta_i = 0$ ou $\Sigma \sigma_i \cos \eta_i = 0$, résultant encore d'une autre identité intéressante; en effet, d'après (III) et (3),

$$\begin{aligned} \cos \mathcal{C} \cos \mathcal{C}' - \cos \mathcal{B} \cos \mathcal{B}' &= \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \{ \gamma_3 (\gamma_3 - Q_3) - \gamma_2 (\gamma_2 - Q_2) \} \\ &= -\sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \frac{\sigma_3 \Pi_3 - \sigma_2 \Pi_2}{2 P} = -\sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \frac{\sqrt{P_A P_B P_C P_D}}{P} \sigma_1 \cos \eta_1, \\ \cos \mathcal{C} \cos \mathcal{C}' - \cos \mathcal{B} \cos \mathcal{B}' &= -\sin \alpha \sin \alpha' \cos \eta_1. \end{aligned} \quad (12)$$

5. Coordonnées tétraédriques. Angles de Brocard. — Rappons, au risque d'une banalité, que la recherche des relations de position doit précéder l'établissement des formules numériques, qui les traduisent de façon fragmentaire. A l'origine de nos formules sont les relations du tétraèdre \mathfrak{T} avec son tétraèdre tangentiel et des systèmes desmiques de tétraèdres reposant sur

un point remarquable, le *deuxième* point de LEMOINE L, et ses points associés. Nous devrions compléter nos tableaux de formules par des tableaux de coordonnées de points et autres éléments. Les relations en cause nous ont en particulier conduit à l'introduction, à côté des coordonnées tétraédriques barycentriques et normales, d'un nouveau système de coordonnées, dites *principales*, dont L est le point-unité. Les coordonnées barycentriques, normales et principales *absolues* d'un point, désignées par μ_j , d_j , ϖ_j , sont liées par les relations

$$\left\{ \begin{array}{l} \varpi_j = \frac{d_j}{\sigma_j} = \frac{h_j}{\sigma_j} \mu_j = \frac{2R \cdot 6V}{\sigma_j} \mu_j, \\ \text{avec } \sum \mu_j = \sum \frac{d_j}{h_j} = 1, \quad \sum \sigma_j \varpi_j = 2R \cdot 6V = 2S_s. \end{array} \right. \quad (13)$$

La comparaison avec (13) donne aussi

$$\varpi_j = \frac{2RP}{P_j} \mu_j, \quad \sum P_j \varpi_j = 2RP, \quad (13')$$

donc *on passe d'un système de coordonnées barycentriques ou normales HOMOGÈNES à un système de coordonnées principales HOMOGÈNES en divisant respectivement les premières par les quantités σ_j , les secondes par les quantités P_j .* Aux divers systèmes de coordonnées tétraédriques se rattachent, comme on sait, les transformations dites inversions tétraédriques (barycentrique, normale, principale¹, ...). Tirons-en quelques conséquences. Les χ_j sont des coordonnées principales homogènes du centre O de la sphère \mathcal{O} ; quels sont les points ayant pour coordonnées principales homogènes les σ_j , ou les P_j ? L'inverse tétraédrique *principal* du premier a ses coordonnées normales égales, donc est le centre I de la sphère inscrite à \mathcal{T} ; celui du second a ses coordonnées barycentriques égales, donc est le centre de gravité G. Ce qui définit bien ces deux points I* et G*.

Je rappelle que la correspondance entre coordonnées barycentriques et principales *absolues* donne

$$\sum \sigma_i Q_i (\varpi_j) \equiv P \sum (a^2 \mu_B \mu_C + a'^2 \mu_D \mu_A);$$

¹ L'inversion principale conserve la sphère \mathcal{O} .

la forme polaire de cette forme quadratique est construite avec les quantités

$$Q_1(\varpi_j, \varpi'_j) = \frac{1}{2} (\varpi_B \varpi'_C + \varpi_C \varpi'_B + \varpi_D \varpi'_A + \varpi_A \varpi'_D), \dots, \dots,$$

et aux coordonnées barycentriques $v_j = \mu_j - \mu_j^*$ d'un vecteur \vec{v} correspondent les coordonnées principales (absolues)

$$\lambda_j = \frac{2RP}{P_j} (\varpi_j - \varpi_j^*) .$$

Ceci étant, le produit scalaire de deux vecteurs et la puissance d'un point pour la sphère \mathcal{O} sont, en coordonnées principales absolues, traduits par

$$\vec{v} \cdot \vec{v}' = -\frac{1}{P} \sum \sigma_i Q_i(\lambda_j, \lambda'_j), \quad p = -\frac{1}{P} \sum \sigma_i Q_i(\varpi_j), \quad (14)$$

d'où le calcul facile de nombreuses expressions métriques.

Je reviens enfin sur l'introduction des angles de BROCARD, U principal, ψ auxiliaire ou normal (ainsi que leurs associés U_i , U_j , ψ_i , ψ_j), conduisant au cercle et à l'ellipsoïde de BROCARD, à la sphère de LEMOINE, aux sphères équibrocadiennes, etc. (*loc. cit.*)

$$\Sigma \chi_j = \cotg U, \quad \Sigma \vartheta_j = 12V \cotg \psi. \quad (15)$$

La relation (15)₂ s'écrit encore, par (4),

$$\Sigma P_j = 2P \cotg \psi, \quad (15')$$

et la comparaison des angles U et ψ , soit

$$\frac{\cotg U}{\cotg \psi} = \frac{\mathcal{R}_0}{\mathcal{R}} = \frac{2P}{S}$$

revient à $\Sigma P_j = S \Sigma \chi_j$, comme cela résulte de (2); je rappelle les inégalités

$$\cotg \psi \geq 2 \cotg U, \quad \cotg U \cot \psi \geq 4. \quad (16)$$

(Pour les angles U_i et ψ_i , on a $\cotg U_i / \cotg \psi_i = -\mathcal{R}_i / \mathcal{R}$.)

6. Tétraèdres particuliers. — J'indique brièvement les simplifications apportées dans les formules pour un tétraèdre isodynamique, ou équifacial, ou régulier (isodynamique et équifacial), ou orthocentrique.

C isodynamique. — On sait que les triangles associés Θ sont équilatéraux, ou $aa' = bb' = cc'$. On a donc

$$\left\{ \begin{array}{l} J_i = \frac{\pi}{3}, \quad \sigma_i = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \gamma_i = \frac{1}{2}, \quad \theta_i = \sqrt{3}, \quad \chi_i = \frac{\sqrt{3}}{3}, \\ P = \frac{3\sqrt{3}}{8}, \quad S = 4P = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad \cotg \psi = 2 \cotg U, \\ P_J = \frac{\sqrt{3}}{2} (\cotg U - \chi_J), \quad \Sigma P_J = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cotg U. \end{array} \right. \quad (17)$$

C équifacial. — Les trois égalités $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$ correspondent à $A = B = C = D$ et les symétries de ce tétraèdre entraînent de nombreuses simplifications, basées sur

$$\begin{aligned} \chi_J &= \sqrt{\frac{P}{2S}}, \quad \cotg U = \sqrt{\frac{8P}{S}}, \quad \cotg \psi = \theta_J, \\ \text{donc } \psi &= \frac{\pi}{2} - J \quad \left(\text{aussi } \psi_i = \frac{\pi}{2} \right), \\ \gamma_J &= \sqrt{\frac{P}{P+2S}}, \quad \sigma_J = \sqrt{\frac{2S}{P+2S}}, \quad \cos J = \cos J' = \frac{-P+2S\gamma_i}{P+2S}, \\ \sin J &= \sin J' = \sqrt{\frac{S\sigma_i}{2}} \cdot \frac{2S}{P+2S}, \\ P_J &= \sqrt{\frac{PS}{2}}, \quad \sqrt{P_A P_B P_C P_D} = \frac{PS}{2}, \\ Q_i &= 2\chi_J^2 = \frac{P}{S}, \quad \Pi_i = 2P_J^2 = PS. \end{aligned} \quad (18)$$

C régulier. — D'après (17) et (18), en particulier

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi_J = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad \cotg U = \sqrt{2}, \quad \cotg \psi = 2\sqrt{2}, \\ \gamma_J = \frac{1}{3}, \quad \sigma_J = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \cos J = \cos J' = \frac{1}{3}, \quad \sin J = \sin J' = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \\ P_J = \frac{3\sqrt{6}}{8}, \quad Q_i = \frac{1}{4}, \quad \Pi_i = \frac{27}{16}. \end{array} \right. \quad (19)$$

Tétraèdre orthocentrique. — Ce tétraèdre est caractérisé par les relations équivalentes

$$a^2 + a'^2 = b^2 + b'^2 = c^2 + c'^2 ,$$

$$\cos \eta_1 = \cos \eta_2 = \cos \eta_3 = 0 ,$$

$$\cos \alpha \cos \alpha' = \cos \beta \cos \beta' = \cos \gamma \cos \gamma' ,$$

comme cela résulte de (II), (III) et (12). Il s'ensuit encore l'équivalence de ces relations et de

$$\sigma_1 \Pi_1 = \sigma_2 \Pi_2 = \sigma_3 \Pi_3 \quad \text{ou} \quad \gamma_1 (\gamma_1 - Q_1) = \gamma_2 (\gamma_2 - Q_2) = \gamma_3 (\gamma_3 - Q_3) . \quad (20)$$

On en tire facilement

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1 = \gamma_1 - \gamma_2 \gamma_3 , \quad Q_2 = \gamma_2 - \gamma_3 \gamma_1 , \quad Q_3 = \gamma_3 - \gamma_1 \gamma_2 , \\ \cos \vartheta \cos \vartheta' = \gamma_A \gamma_B \gamma_C \gamma_D + \sigma_A \sigma_B \sigma_C \sigma_D \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 , \\ \sigma_i \Pi_i = P (4 + \sum \chi_j^2 - \sum \sigma_i^2) = P \left(\sum \frac{1}{\sigma_j^2} - \sum \sigma_i^2 \right) , \end{array} \right. \quad (21)$$

sans qu'il en résulte des simplifications pour l'ensemble des formules données, moins intéressantes pour les propriétés ici en jeu. Mais cet exemple même suffit à marquer la distinction des divers groupes de propriétés du tétraèdre.