Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 4 (1958)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: FONCTIONS ENTIÈRES D'ORDRE FINI ET FONCTIONS

MÉROMORPHES

Autor: Valiron, Georges

Notizen: NOTES

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-34622

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

On a

$$V(X) = \log M(r) = C + \int_{1}^{x} w(u) du$$

C étant une constante et w(u) = v(t) si $u = \log t$. L'intégrale peut s'écrire

$$\int_{1}^{x} u \, \omega \, (u) \, \frac{d \, u}{u}$$

et uw (u) sera croissante. On aura

$$X \otimes (X) < [1 + 0 (1)] ke X^{k(X)}$$

donc

$$w(X) = v(r) < [1 + 0(1)] ke X^{k(X)-1}$$
.

Il existe d'ailleurs une suite de valeurs indéfiniment croissantes de X pour lesquelles

$$w(X) > [1 - 0(1)] k X^{k(X)-1}$$
.

Sil y a croissance parfaitement régulière, donc si

$$V(X) \sim X^{k(X)}$$
,

on a

$$w(X) \sim k X^{k(X)-1}$$
.

On déduira de là des inégalités entre M(r) et $M^1(r)$ analogues à celles relatives à l'ordre positif.

NOTES

¹⁾ Voir VIJAYARAGHAVAN, T., On derivatives of integral functions. J. London Math. Soc., 10, pp. 116-117 (1935).

²⁾ Voir Bose, S. K., On the derivatives of integral functions. *Indian math. Soc.*, 10, nouvelle série, pp. 77-80 (1946), et Valiron, G., Sur le théorème de M. Picard. *L'Enseignement mathématique*, 28, pp. 55-59 (1929).