Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 4 (1958)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR L'EXISTENCE D'UN CERCLE PASSANT PAR UN NOMBRE

DONNÉ DE POINTS AUX COORDONNÉES ENTIÈRES

Autor: Schinzel, André

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-34627

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## SUR L'EXISTENCE D'UN CERCLE PASSANT PAR UN NOMBRE DONNÉ DE POINTS AUX COORDONNÉES ENTIÈRES

par André Schinzel, Varsovie

(Reçu le 29 janvier 1958.)

Le but de cette Note est de démontrer ce

Théorème: Quel que soit le nombre naturel n, il existe dans le plan un cercle dont la circonférence contient précisément n points aux coordonnées entières.

(Ce théorème a été mentionné dans l'article de M. W. Sier-Piński paru dans ce fascicule, page 25.)

Démonstration. — Pour n impair, n=2k+1, où k est un entier  $\geq 0$ , le cercle au centre  $\left(\frac{1}{3},\ 0\right)$  et au rayon  $5^k/3$  satisfait à notre théorème.

En effet, d'après un théorème connu sur le nombre de décompositions en deux carrés, l'équation  $x^2 + y^2 = 5^{2k}$  a 4 (2k + 1) solutions en nombres entiers x et y. Comme  $5^{2k} \equiv 1 \pmod{3}$  pour k = 0, 1, 2, ..., on démontre sans peine que dans chaque telle solution, un et un seul des nombres x et y est divisible par 3. Les solutions se divisent donc en 2k + 1 quadruples disjoints: (x, y), (x, -y), (y, x), (-y, x), où x est un entier divisible par 3 et y un entier qui n'est pas divisible par 3. Dans chaque tel quadruple, une et une seule solution satisfait à la condition que le premier terme de la paire  $\equiv -1 \pmod{3}$  et le second  $\equiv 0 \pmod{3}$ . Il existe donc précisément 2k + 1 = n solutions en nombres entiers z et t de l'équation  $(3z - 1)^2 + (3t)^2 = 5^{2k}$ , c'est-à-dire de l'équation  $\left(z - \frac{1}{3}\right)^2 + t^2 = \left(\frac{5^k}{3}\right)^2$ . Cela prouve qu'il existe précisément n points aux coordonnées entières sur

le cercle déterminé par cette équation, ce qui démontre notre théorème pour n impair.

Pour n pair, n=2k, où k est un nombre naturel, le cercle au centre  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$  et au rayon  $5^{\frac{k-1}{2}}/2$  satisfait à notre théorème. En effet, d'après le théorème mentionné plus haut, l'équation  $x^2+y^2=5^{k-1}$  a précisément 4k solutions en nombres entiers x et y. Or, des nombres x, y, un et un seul est pair et ainsi toutes les solutions se divisent en 2k paires disjointes (x,y) et (y,x) qui ne diffèrent entre elles que par l'ordre de leurs termes. Dans chaque telle paire précisément une solution satisfait à la condition que le premier élément est impair et le second pair. Il existe donc précisément 2k=n solutions en nombres entiers z, t de l'équation  $(2z-1)^2+(2t)^2=5^{k-1}$ , c'est-à-dire à l'équa-

tion  $\left(z-\frac{1}{2}\right)^2+t^2=\left(\frac{5}{2}^{\frac{k-1}{2}}\right)^2$ , ce qui démontre notre théorème pour n pair.

Notre théorème se trouve ainsi démontré.