Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 4 (1958)

**Heft:** 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: FONCTIONS ENTIÈRES D'ORDRE FINI ET FONCTIONS

**MÉROMORPHES** 

Autor: Valiron, Georges

Notizen: NOTES

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-34633

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

il suffit même que l'on ait seulement

$$\overline{\lim}_{r=\infty} \frac{\log M(r, f)}{X^{k(X)}} = 1$$

ce qui donne une majoration analogue du coefficient de  $\theta$  dans (21), et que

 $\lim_{r \to \infty} \frac{\log M(r, f)}{X^{h(X)-1}} = \infty.$ 

(à suivre).

## NOTES

<sup>3)</sup> Voir Hadamard, J.: Sur les fonctions entières. C. R. Acad. Sci., Paris, 135, pp. 1309-1311 (1902), et Valiron G.: Sur le nombre des singularités transcendantes des fonctions inverses d'une classe d'algébroïdes. C. R. Acad. Sci. Paris, 200, pp. 713-715 (1935).

4) Voir Valiron, G.: Sur les fonctions entières d'ordre nul et d'ordre fini et en particulier les fonctions à correspondance régulière (thèse, Paris, Ed. Privat, Toulouse, 1912, paru dans Annales Toulouse (3), 5, pp. 117-257 (1914); à ces résultats on comparera ceux de Ostrowski, A.: Recherches sur la méthode de Graeffe et les zéros des polynômes et des séries de Laurent, Acta Mathematica, 72, pp. 99-257 (1940-1941), notamment les pp. 107, 110, 158, 166, 170 et 173, et Ostrowski, A.: Addition à notre mémoire: « Recherches sur la méthode de Graeffe et les zéros des polynômes et des séries de Laurent », Acta Mathematica, 75, pp. 183-186 (1943), ainsi que ceux de Rey Pastor, J.: Lecciones de Algebra, pp. 89-105, 2º édition, Madrid, 1935, et San Juan, R.: Compléments à la méthode de Graeffe pour la résolution des équations algébriques, Bull. des Sci. Math. (2), LIX, pp. 104-109 (1935), et: Complementos al método de Gräffe para la resolución de ecuaciones algébricas, Revista Mat. Hispano-Americ. (3), I, pp. 1-14 (1939), ainsi que: A propos du mémoire: « Recherches sur la méthode de Graeffe..., etc » par Alexandre Ostrowski, à Bâle, Acta mathematica, 75, pp. 187-190 (1943).

5) Voir Valiron, G.: Théorie des fonctions (p. 388). Masson, Paris, 1942.

6) Voir Brinkmeier, H.: Ueber das Mass der Bestimmtheit des Wachstums einer ganzen transzendenten Funktion durch die absoluten Beträge der Koeffizienten ihrer Potenzreihe. *Math. Annalen*, **96**, pp. 108-118 (1927).

7) Voir Valiron, G.: Sur la croissance des fonctions entières. C. R. Assoc. française

avanc. des Sci., Le Havre, 1929, pp. 110-113.

8) Pour l'introduction de ces notions dans la théorie des fonctions entières, voir Valiron, G.: Sur les fonctions entières d'ordre fini. Bull. des Sciences math. (Darboux Bull.) (2), 45, pp. 258-270 (1921). La terminologie adoptée ici a été proposée par R. NE-VANLINNA qui a étendu les résultats aux fonctions méromorphes.

9) On trouve dans Valiron, G.: Lectures on the general theory of integral functions, Ed. Privat, Toulouse, 1928, Appendix B, p. 182, l'étude de la condition pour qu'une fonction donnée par sa série de Taylor soit de la classe divergente ou convergente.

10) Voir Valiron, G.: loc. cit., 5), p. 432.

11) On a donc  $n>\left|\alpha_{n}\right|^{\rho-\varepsilon}$  pour une suite infinie de n, ce qui entraîne la divergence

de la série  $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\left|\frac{\alpha_{n}}{n}\right|^{\rho-\epsilon}} \quad \text{pour } \epsilon > 0,$  de sorte que l'on a  $\frac{\log n}{n=\infty} \frac{\log n}{\log \left|\frac{\alpha_{n}}{n}\right|} = \rho, \text{ c'est le théorème de Borel.}$ 

12) Voir Valiron, G.: loc. cit, 4). La réciproque a été retrouvée par Titchmarch, E. C.: On integral functions with real negative zeros, Proc. London Math. Soc. (2), 26, pp. 185-200 (1927), dans le cas U (r) = kr\(^p\) (voir Titchmarch, E. C.: The theory of functions, 2nd edition, x-452 pages, Oxford University Press, 1939). Dans une série de travaux récents (Delange, H.: Un théorème sur les fonctions entières à zéros réels et négatifs, J. de Math. pures et appl., 31, pp. 55-78 (1952)), H. Delange a repris ces questions et a étudié le cas de l'ordre entier. Voir aussi un mémoire de M. Heins, M.: Entire functions with bounded minimum modulus; subharmonic function analogues. Annals of Math., 49, pp. 200-213 (1948).