Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 5 (1959)

Heft: 4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR QUELQUES PRINCIPES EXTRÉMAUX DE LA PHYSIQUE

MATHÉMATIQUE

Autor: Hersch, Joseph

Kapitel: 6. Un passage Dirichlet Thomson, à l'aide des lignes de flux d'un

champ vectoriel \sqrt{p} concurrent pour Thomson.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-35495

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

6. Un passage Dirichlet \longrightarrow Thomson, à l'aide des lignes de flux d'un champ vectoriel $\stackrel{\rightarrow}{p}$ concurrent pour Thomson.

Partageons le domaine G en lanières G_j par des lignes de flux \varkappa de \vec{p} , comme au § 4.1; dans le principe de Dirichlet (§ 1.1)

$$D\left(\phi\right) = \operatorname{Min}_v D\left(\phi\right), \phi \text{ continue dans } G, \text{lisse par morceaux} = \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ sur } \Gamma_0 \text{ ,} \\ 1 \text{ sur } \Gamma_1 \text{ ,} \end{array} \right.$$

admettons maintenant à concurrence également les fonctions \tilde{v} discontinues le long des coupures \varkappa ; c'est-à-dire que nous exigeons seulement la continuité dans chaque lanière G_j : le minimum diminue évidemment et l'on a

$$\mathrm{D}(\phi) \, \geqslant \, \mathrm{Min}_{\, \widetilde{\boldsymbol{v}}} \, \mathrm{D} \, \left(\widetilde{\boldsymbol{o}} \right) \, \, .$$

Soit \tilde{v}_j la restriction de \tilde{v} à G_j , et soit de nouveau w_j la solution du problème mixte dans G_j : $w_j = 0$ sur Γ_{0j} , $w_j = 1$ sur Γ_{1j} , $\frac{\partial w_j}{\partial n} = 0$ sur les coupures \varkappa .

$$\operatorname{Min}_{\tilde{v}}\operatorname{D}(\tilde{v}) = \sum_{j} \operatorname{Min}_{\tilde{v}_{j}}\operatorname{D}(\tilde{v}_{j}) = \sum_{j}\operatorname{D}(w_{j}) = \oint_{\Gamma_{1}} \frac{\operatorname{d}w}{\operatorname{d}n} ds = \operatorname{D}(w),$$

comme au § 4. 1; pour des lanières G_j de largeur infinitésimale, on retrouve, comme au § 4. 2, le principe de Thomson:

$$\frac{\left(\oint_{\Gamma_1} \overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{n} \, ds\right)^2}{\iint_{G} \overrightarrow{p^2} \, dx \, dy} \leq D(\omega) ,$$

donc \leq D (φ) en vertu de ce qui précède.

- 7. Un pas vers un principe de Thomson pour la membrane vibrante.
- 7. 1. Cherchons à réaliser, pour le problème de la membrane vibrante (§ 1. 2), un passage analogue à celui du § 6; à