

<b>Zeitschrift:</b>	L'Enseignement Mathématique
<b>Herausgeber:</b>	Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
<b>Band:</b>	5 (1959)
<b>Heft:</b>	4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE
<b>Artikel:</b>	SUR QUELQUES PRINCIPES EXTRÉMAUX DE LA PHYSIQUE MATHÉMATIQUE
<b>Autor:</b>	Hersch, Joseph
<b>Kapitel:</b>	5. Un passage Thomson – Dirichlet, à l'aide des lignes de niveau d'une fonction $v$ concorrente pour Dirichlet.
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-35495">https://doi.org/10.5169/seals-35495</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

tout point; sa grandeur  $p = p(s)$  est fonction de l'arc sur la ligne de flux. L'équation  $\operatorname{div} \vec{p} = 0$  est donc équivalente à une équation différentielle *ordinaire*, linéaire et *homogène*, pour  $p(s)$ ; une solution est  $\operatorname{grad} \varpi$  (c'est-à-dire:  $\operatorname{grad} \varpi_j$  dans la bande infinitésimale  $G_j$ ); donc, dans  $G_j$ ,  $\vec{p} = t_j \operatorname{grad} \varpi_j$  ( $t_j$  est constante dans  $G_j$ ). Il s'ensuit, par l'inégalité de Schwarz, que

$$\frac{\left( \oint_{\Gamma_1} \vec{p} \cdot \vec{n} ds \right)^2}{\iint_G \vec{p}^2 dx dy} = \frac{\left[ \sum_j t_j D(\varpi_j) \right]^2}{\sum_j t_j^2 D(\varpi_j)} \leq \sum_j D(\varpi_j) = \\ = D(\varphi) = I \leq I = J = D(\varphi),$$

nous avons donc bien une interprétation du principe de Thomson.

### 5. UN PASSAGE THOMSON → DIRICHLET, à l'aide des lignes de niveau $\bar{\gamma}$ d'une fonction $\nu$ concurrente pour Dirichlet.

Dans le principe de Thomson ci-dessus, normons  $\vec{p}$  en imposant  $\oint_{\gamma} \vec{p} \cdot \vec{n} ds = 1$  pour toute courbe fermée  $\gamma$  séparant  $\Gamma_0$  de  $\Gamma_1$ ; pour ces champs concurrents  $\vec{p}$ , on a

$$D(\varphi) = \operatorname{Max}_{\vec{p}} \left( \iint_G \vec{p}^2 dx dy \right)^{-1}.$$

Admettons maintenant davantage de champs concurrents: imposons la condition  $\oint_{\bar{\gamma}} \vec{p} \cdot \vec{n} ds = 1$  pour les seules lignes de niveau  $\bar{\gamma}$  de  $\nu$ ; le maximum devient plus grand, et nous avons

$$D(\varphi) \leq \operatorname{Max}_{\vec{p}} \left( \iint_G \vec{p}^2 dx dy \right)^{-1};$$

on peut montrer que le maximum à droite est maintenant égal à  $D(u)$  (cf. § 3. 1), donc  $D(\varphi) \leq D(u) \leq D(\nu)$ , et nous retrouvons bien le principe de Dirichlet.