Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 6 (1960)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** LE PLUS PETIT COUVERCLE CIRCULAIRE DE n POINTS

Autor: Ehrhart, E. Kapitel: Construction

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-36335

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 11.12.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

 $\stackrel{\frown}{\mathrm{BDC}}$  soit minimum (il est aigu et la droite BC passe entre A et D). Le cercle (O<sub>3</sub>) circonscrit à BCD est un couvercle plus petit que (O<sub>2</sub>).

En continuant l'opération avec le triangle BCD, etc., on arrive nécessairement à un triangle acutangle dont les sommets appartiennent à E', puisque le nombre de cercles passant par trois points de E' est limité et que les rayons des cercles successivement rencontrés vont en diminuant.

- 4. Un couvercle circulaire de E', circonscrit à un triangle acutangle ABC dont les sommets appartiennent à E', est nécessairement le plus petit. Il résulte en effet de ce qui précède que le plus petit couvercle des trois points A, B, C est le cercle ABC.
- 5. Soit ABC un triangle acutangle inscrit dans (C) et dont les sommets appartiennent à E'. Les points A, B, C partagent le contour du polygone convexe (P) construit sur E' en trois lignes brisées (AB), (BC), (CA) dont seules les extrémités appartiennent à l'ensemble des trois points A, B, C. Considérons un sommet M de (P) situé sur (AB) pour fixer les idées. Si l'angle en M de (P) était aigu, l'angle AMB le serait également, ce qui est impossible puisque le quadrilatère convexe ACBM est intérieur à (C). Donc tout sommet d'angle aigu de (P) est un sommet du triangle acutangle inscrit dans (C).

## CONSTRUCTION

Je trace le polygone (P) enveloppe convexe des n points donnés. J'envisage, au besoin je construis, le cercle qui a pour diamètre le plus grand des segments de l'ensemble des côtés et des diagonales. S'il ne coupe pas (P), il est la solution (C).

Sinon, je considère les angles aigus de (P). (Il y en a trois au plus, car la somme des angles extérieurs de (P) valant  $2\pi$ , il ne peut y avoir quatre angles extérieurs obtus.)

S'il en a trois, le cercle passant par leurs sommets est (C). S'il en a deux de sommets A, B, je considère le sommet C tel

que ACB soit minimum. Le cercle ABC est (C).

Si j'aperçois un triangle acutangle dont les sommets font partie de l'ensemble E' des sommets de (P), et dont le cercle circonscrit ne coupe (P), ce cercle est (C).

Sinon je choisis un triangle obtusangle ABC satisfaisant à ces conditions. (Si (P) a un angle aigu, je prends A en son sommet.) Si C est le sommet de l'angle obtus du triangle, je le

remplace par C', sommet de (P) tel que ÁC' B soit minimum. Si AC' B est acutangle, son cercle circonscrit est (C).

Si le cercle circonscrit au triangle obtusangle AC' B ne porte pas d'autres points de E', je remplace comme précédemment le sommet de l'angle obtus par le point D de E', qui voit le côté opposé sous le plus petit angle, etc.

Si le cercle circonscrit au triangle obtusangle AC' B porte d'autres points C'', C''' ... de E', et que son centre O est intérieur à l'enveloppe convexe (P') des points A, B, C, C', C'', C''', ... ce cercle est (C). Si O est extérieur à (P') et que MN est le côté de (P') le plus voisin de O, on passe au triangle MND, D étant

le point de E' tel que MDN soit minimum, etc.

Après un certain nombre de ces substitutions de sommets, j'arrive à un triangle acutangle. Son cercle circonscrit est (C).

E. EHRHART, 13a, boulevard de Lyon, Strasbourg.