Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 6 (1960)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LES CORPS QUADRATIQUES

Autor: Châtelet, A.

Kapitel: 18. Divisibilité des idéaux.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-36339

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

On distingue les nombres premiers q_j , qui sont normes d'idéaux principaux premiers (congruence fondamentale impossible) et les nombres premiers p_j qui sont normes d'idéaux canoniques. On en déduit la décomposition:

$$(q) = [\Pi(q_j)^{h_j}] \times \Pi[(p_i, \theta - c_i)^{h_i} \times (p_i, \theta' - c_i)^{h_i}].$$

Pour un idéal fractionnaire, mis sous forme canonique:

$$\mathbf{I} = q \times (m, \theta - c) = (q) \times (m, \theta - c);$$

on décompose les deux facteurs, comme il vient d'être dit, on forme le produit des deux décompositions, on associe éventuellement les puissances d'un même idéal, dont on additionne les exposants; on supprime ceux dont l'exposant devient ainsi nul.

L'existence de cette décomposition peut aussi être établie directement comme conséquence de la définition des idéaux premiers et de la constitution du groupe G_I des idéaux non nuls (14). Le raisonnement est analogue à celui qui est fait ordinairement pour les nombres rationnels et entiers.

La démonstration de la détermination de la décomposition faite pour les nombres rationnels, par comparaison de deux décompositions et par récurrence sur le nombre de facteurs (de l'une d'elles) s'étend de même à la décomposition des idéaux.

18. Divisibilité des idéaux.

On peut étendre aux idéaux (d'un corps quadratique) les propriétés usuelles de la *divisibilité* des nombres fractionnaires et entiers, de l'arithmétique élémentaire.

Pour comparer plusieurs idéaux fractionnaires \mathbf{A} , \mathbf{B} , ..., on peut utiliser un système de h idéaux premiers \mathbf{P}_i , comprenant tous ceux qui figurent dans une décomposition (17) de (au moins) un des idéaux considérés. On peut alors introduire dans ces décompositions, les puissances d'exposant nul (donc égales à l'idéal unité) de ceux des \mathbf{P}_i qui n'y figuraient pas. Chacun des idéaux considérés est ainsi égal à un produit de puissances des h idéaux \mathbf{P}_i :

$$\mathbf{A} = \Pi \mathbf{P}_i^{a_i}; \quad \mathbf{B} = \Pi \mathbf{P}_i^{b_i}; \dots \quad a_i, b_i, \dots \text{ nombres entiers};$$

et ils sont ainsi caractérisés par les systèmes de h exposants $a_i; b_i;$.

Leurs *produits*, ou leurs quotients, sont obtenus en *addition-nant*, ou en retranchant, les exposants, de même indice:

$$(\Pi \mathbf{P}_i^{ai}) \times (\Pi \mathbf{P}_i^{bi}) = \Pi \mathbf{P}_i^{ai+bi}; \quad (\Pi \mathbf{P}_i^{ai}) : (\Pi \mathbf{P}_i^{bi}) = \Pi \mathbf{P}_i^{ai-bi}.$$

Pour qu'un idéal, ainsi représenté, soit entier, il faut et il suffit qu'aucun des exposants ne soit négatif:

$$\{\Pi \mathbf{P}_i^{a_i} \text{ id\'eal entier}\} \Leftrightarrow \{a_i \geqslant 0, \text{ tout } i\}.$$

DÉFINITION. — Un idéal (fractionnaire) \mathbf{M} est divisible par un idéal \mathbf{D} , non nul, —ou est multiple de \mathbf{D} — lorsqu'il est égal au produit de \mathbf{D} par un idéal entier —ou lorsque le quotient $\mathbf{M} \times \mathbf{D}^{-1}$ est un idéal entier—:

$$\{\mathbf{M} = \mathbf{D} \times \mathbf{Q}, \quad \mathbf{Q} \subset (1)\}$$
 ou $\mathbf{M} \times \mathbf{D}^{-1} \subset (1)$.

Deux idéaux fractionnaires \mathbf{M} et \mathbf{D} étant représentés par leurs décompositions avec un même système d'idéaux premiers \mathbf{P}_i , pour que \mathbf{M} soit divisible par \mathbf{D} , il faut et il suffit que ses exposants soient au moins égaux à ceux de \mathbf{D} , de même indice:

$$\{(\Pi \mathbf{P}_i^{m_i}) \text{ divisible par } (\Pi \mathbf{P}_i^{d_i})\} \Leftrightarrow \{m_i \geqslant d_i; \text{ tout } i\}$$

En particulier un *idéal premier* est diviseur d'un *idéal entier* lorsqu'il figure dans sa décomposition (avec un exposant non nul). Il est diviseur d'un produit d'idéaux entiers, si et seulement si il est diviseur de l'un d'eux (au moins).

De la condition de divisibilité, on déduit (comme pour la divisibilité des nombres fractionnaires) la formation du plus grand commun diviseur et du plus petit multiple commun, d'un système d'idéaux fractionnaires, décomposés en produits de puissances d'un même système d'idéaux premiers:

$$\begin{split} \mathbf{U} &= \Pi \mathbf{P}_i^{ui}; \quad \mathbf{V} = \Pi \mathbf{P}_i^{vi}; \dots; \quad u_i, v_i, \dots \text{ entiers}; \\ \text{p.g.c.d. } (\mathbf{U}, \mathbf{V}, \dots) &= \Pi \mathbf{P}_i^{\min(u_i, v_i, \dots)}; \\ \text{p.p.c.m. } [\mathbf{U}, \mathbf{V}, \dots] &= \Pi \mathbf{P}_i^{\max(u_i, v_i, \dots)}. \end{split}$$

On peut en déduire des relations mutuelles; en particulier leur corrélation peut être exprimée par la construction:

l'inverse du p.g.c.d. (ou du p.p.c.m.) est égal au p.p.c.m. (ou au p.g.c.d.) des inverses.

On peut aussi énoncer des propriétés caractéristiques, corrélatives, en utilisant une définition préalable.

Définition. — Des idéaux (fractionnaires) sont premiers entre eux (dans leur ensemble) lorsque leur p.g.c.d. est égal à l'idéal unité.

Il est équivalent de dire qu'ils sont entiers et qu'il n'y a aucun facteur premier commun à leurs décompositions, avec un exposant non nul.

On vérifie immédiatement, en utilisant les systèmes d'exposants que: pour qu'un idéal fractionnaire:

d'un système d'idéaux fractionnaires \mathbf{F}_i , il faut et il suffit que les quotients:

$$\mathbf{F}_i \times \mathbf{D}^{-1}$$
 ou $\mathbf{M} \times \mathbf{F}_i^{-1}$,

soient premiers entre eux (dans leur ensemble).

18 bis. Utilisation du plus grand commun diviseur.

On peut définir et établir les notions de divisibilité en suivant le même ordre que celui qui est couramment employé en Arithmétique élémentaire et qui a été étendu par Dedekind aux idéaux des corps de nombres algébriques.

On peut définir d'abord et directement la divisibilité des idéaux fractionnaires par l'une des propriétés caractéristiques suivantes, dont l'équivalence résulte de l'existence de l'inverse d'un idéal non nul.

L'idéal \mathbf{M} est divisible par l'idéal \mathbf{D} , si le quotient $\mathbf{M} \times \mathbf{D}^{-1}$ est un idéal entier (inclus dans l'idéal unité (1));

ou si M (ensemble d'éléments du corps) est inclus dans D (10.3)

$$\mathbf{M} \times \mathbf{D}^{-1} \subset (1) \Leftrightarrow \mathbf{M} \subset \mathbf{D}.$$

On passe d'une inclusion à l'autre en multipliant les deux membres par \mathbf{D} (inclusion de gauche), ou par \mathbf{D}^{-1} (inclusion de droite).