Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 7 (1961)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LES CORPS QUADRATIQUES

Autor: Châtelet, A.

Kapitel: 37. Corps imaginaires, dont le discriminant a plus de deux facteurs

premiers.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-37125

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

congru à I¹⁸. Les expressions des autres idéaux réduits dont les normes sont composées avec ces nombres premiers s'obtiennent par multiplication.

Comme dans le cas d'un discriminant premier, il semble que ce soit seulement pour des valeurs relativement grandes de |D| qu'il soit possible d'obtenir des groupes de classes non cycliques. Un exemple en est donné dans le tableau XVII, disposé comme le tableau XIV, qui concerne le corps de discriminant —19 451 = $(-43) \times 437$.

Il a dix-huit classes d'idéaux, dont une classe double représentée par l'idéal réduit double de norme 43. Leur groupe n'est pas cyclique: il a une *décomposition minimum* en un produit direct de sous-groupes cycliques d'ordres 3 et 6 et ses éléments peuvent être représentés par les monômes (indiqués dans le tableau):

$$\mathbf{I}^{x} \times \mathbf{J}^{y}$$
; x , mod. 3; y , mod. 6.

La vérification peut être faite comme suit: la décomposition de $F(0) = 17^3$ montre que les idéaux de norme 17, forment avec (1), un sous-groupe cyclique, d'ordre 3. La décomposition de $F(21) = 5^3 \times 43$ montre que les idéaux, de normes 5 et 25 ont leur troisième puissance congru à l'idéal double, de norme 7; ils définissent, par suite, avec cet idéal et (1), un sous-groupe de six classes, cyclique, indépendant du précédent (dont il ne contient pas d'élément, sauf (1)). Le groupe est donc égal au produit direct de ces deux sous-groupes; il n'a aucun élément d'ordre 18 et il n'est pas cyclique.

On peut préciser sa structure en calculant les idéaux réduits congrus aux divers monômes en I et J; c'est ce qui a été indiqué dans le tableau; la première congruence résulte d'un calcul de multiplication d'idéaux canoniques, de normes premières entre elles, obtenus successivement:

$$I \times J$$
; $I \times (I \times J)$; $I \times (I \times J^2)$; $I \times (I \times J^3)$; $I \times J'$.

37. Corps imaginaires, dont le discriminant a plus de deux facteurs premiers.

Le discriminant est alors décomposable, au moins de deux façons, en un produit de deux facteurs. Il en résulte l'existence

TABLEAU XVII.

$$F(x) = x^2 + x + 4913$$
; $D = -19651 = (-43) \times 437$; $r = 40$. (Groupe d'ordre $3 \times$ Groupe d'ordre 6).

0	4 913 = 17 ³
1	$4\ 915 = 5 \times 983$ (5, 0—1) = J
2 3	4919 $4925 = 5^2 \times 197$ (25, θ —3) ~ J^4
4 5 6 7 8 9 10	4933 4943 $4955 = 5 \times 991$ 4969 $4985 = 5 \times 997$ 5003 5023 $5045 = 5 \times 1009$
12	$5\ 069 = 37 \times 137$ $(37, \ \theta - 12) \sim I \times J^3$
13	$5\ 095 = 5 \times 1\ 019$
14	$5\ 123 = 47 \times 109$ (47, θ —14) $\sim I \times J^2$
15	5 153
16	5 185 = $(5 \times 17) \times 61$ (61, θ —16) $\sim I \times J^5$
17 18	$5\ 219 = 17 \times 307$ $5\ 255 = 5 \times 1\ 051$

```
5293 = 67 \times 79
 19
                           (67, \theta—19) \sim I^2 \times J^2
 20
       5 333
       5\,375 = 5^3 \times 43
 21
                           (43, \theta—21) ∼
                                                    \mathbf{J}_3
 22
       5 4 1 9
       5\,465 = 5 \times 1\,093
 23
       5513 = 37 \times 149
 24
       5563
 25
 26
       5615 = 5 \times 1123
 27
       5 669
       5725 = 5^2 \times 229
 28
 29
       5 783
       5 843
 30
       5905 = 5 \times 1181
 31
 32
       5969 = 67 \times 127
       6\ 035 = (5 \times 17) \times 71
 33
                           (71, \theta—33) \sim I \times J
 34
       6\ 103 = 17 \times 359
 35
       6 173
 36
       6\ 245 = 5 \times 1\ 249
       6319 = 71 \times 89
 37
 38
       6395 = 5 \times 1279
 39
       6 473
F(61) = 8695 = (5 \times 47) \times 37
F(86) = 12395 = (5 \times 37) \times 67
F(108) = 16685 = (5 \times 71) \times 47
I \times J \sim (5 \times 17, \ \theta + 34) \sim (71, \ \theta - 33)
```

 $I \times J^2 \sim (5 \times 71, \ \theta - 108) \sim (47, \ \theta - 14)$ $I \times J^3 \sim (5 \times 47, \ \theta - 61) \sim (37, \ \theta - 12)$ $I \times J^4 \sim (5 \times 37, \ \theta - 86) \sim (67, \ \theta + 20)$ $I \times J^5 \sim (5 \times 17, \ \theta + 17) \sim (61, \ \theta - 16)$ d'au moins deux idéaux réduits remarquables, en plus de l'idéal unité. Le groupe des classes, qui contient au moins deux éléments d'ordre 2, n'est pas cyclique.

Le tableau XVIII, disposé comme les tableaux XII et XV, donne trois exemples de tels corps. Pour le premier, de discriminant $-420 = -4 \times 3 \times 5 \times 7$, il y a six idéaux réduits doubles, de normes 2, 3, 5, 7, 10 et un idéal réduit réfléchi, de norme 11 (résultant de la décomposition $420 = 20 \times 21$). Il y a en tout sept classes, chacune d'ordre 2 dans le groupe, qui, avec la classe principale, constituent un groupe d'ordre 8, produit direct de trois groupes cycliques d'ordre 2.

Pour le deuxième exemple, de discriminant $-435 = -3 \times 5 \times 29$, il y a deux idéaux réduits doubles, de normes 3 et 5 et un idéal réduit réfléchi, de norme 11 (résultant de la décomposition $435 = 15 \times 29$). Il y a en tout trois classes, chacune d'ordre 2, qui, avec la classe principale, constituent un groupe, d'ordre 4, produit direct de deux groupes cycliques d'ordre 2 (groupe de Klein).

Pour le troisième exemple, de discriminant $-440 = -8 \times 5 \times 11$, il n'y a pas d'idéal réduit réfléchi, mais seulement trois idéaux réduits doubles, de normes 2, 5, 10, et, en outre quatre couples d'idéaux réduits conjugués, de normes 3, 6, 7, 9. Il y a en tout, $3+2\times 4=11$ classes, qui, avec la classe principale, constituent un groupe, d'ordre 12, produit direct de deux groupes cycliques, d'ordre 6 et 2.

Le tableau XIX donne encore la répartition des corps imaginaires dont le discriminant est de valeur absolue inférieure à 1000, et contient au moins trois facteurs premiers, d'après la structure du groupe de leurs classes d'idéaux. On a distingué les discriminants impairs et les discriminants qui ont un facteur 4 ou 8.

Le discriminant de trois seulement de ces corps contient quatre facteurs: le groupe des classes d'idéaux de chacun de ces corps est le produit direct de deux groupes cycliques d'ordre 2. Pour tous les autres corps, le groupe des classes d'idéaux est le produit direct de deux groupes cycliques.

En généralisant la construction des exemples précédents, on peut aisément vérifier que, pour un corps imaginaire, dont *le* discriminant a n facteurs premiers, différents, le groupe des

TABLEAU XVIII.

Exemples de corps imaginaires dont le discriminant a au moins 3 facteurs premiers.

	D = -420; r = 6		
c			
0	$ \begin{array}{l} 105 = 3 \times 5 \times 7 \\ (1, \theta - 0) = (1) \\ (3, \theta - 0) = J \\ (5, \theta - 0) \sim I \times K \\ (7, \theta - 0) = K \end{array} $		
1	$106 = 2 \times 53$ (2, θ —1) = I		
2	109		
3	$114 = 2 \times 3 \times 19$ $(6, \theta - 3) \sim \mathbf{I} \times \mathbf{J}$		
4	$121 = 11^{2}$ $(11, 0-4) \sim I \times K$		
5	$130 = 2 \times 5 \times 13$ $(10, \theta - 5) \sim \mathbf{I} \times \mathbf{J} \times \mathbf{K}$		
7	$154 = 2 \times 7 \times 11$		

$$(3, \theta) \times (5, \theta) \times (7, \theta)$$

 $\sim (1)$ [$F(0)$]
 $(2, \theta-1) \times (7, \theta) \times (11, \theta+4)$
 $\sim (1)$ [$F(7)$]

3 groupes cycliques d'ordre 2 $\mathbf{I}^x \times \mathbf{J}^y \times \mathbf{K}^z \\ x, y, z, \text{mod. 2}$

	D = -435; r = 6
c	
0	$(1, \theta - 0) = (1)$
1	$111 = 3 \times 37$ $(3, \theta - 1) = 1$
2	$115 = 5 \times 23$ (5, θ —2) = J
3	121 = 11 ² (11, θ —3) \sim I \times J
4	$129 = 3 \times 43$
5	139
7	$165 = 3 \times 5 \times 11$

(3,
$$\theta$$
—1) × (5, θ —2) × (11, θ —7) \sim (1) [F (7)]

2 groupes cycliques d'ordre 2 $\mathbf{I}^y \times \mathbf{J}^z$ x, y, mod. 2

2 groupes cycliques d'ordres 6 et 2

 $\mathbf{I}^x \times \mathbf{J}^y$ x, mod. 6; y, mod. 2

classes d'idéaux est le produit direct d'au moins n-1 groupes cycliques.

C'est ainsi que, pour le corps de discriminant:

$$-5450 = -4 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$$

il y a quinze classes, chacune d'ordre 2 dans le groupe, qui est le produit direct de quatre groupes cycliques, d'ordre 2.

TABLEAU XIX.

Répartition, d'après la structure du groupe des classes, des corps quadratiques imaginaires dont le dicriminant a au moins 3 facteurs premiers.

Produit de deux groupes cycliques d'ordre 2 (groupe de Klein):

```
| D | impair: 3 \times 5 \times 13; 3 \times 5 \times 29; 3 \times 7 \times 23; 3 \times 5 \times 37; 5 \times 7 \times 17; 3 \times 11 \times 19; 5 \times 11 \times 13; 3 \times 5 \times 13;
```

|
$$D$$
 | multiple de 4: $4 \times 3 \times 7$; $4 \times 3 \times 11$; $4 \times 3 \times 19$; $4 \times 5 \times 17$; $4 \times 3 \times 31$; $4 \times 7 \times 19$; $4 \times 3 \times 59$;

|
$$D$$
 | multiple de 8: $8 \times 3 \times 5$; $8 \times 3 \times 7$; $8 \times 5 \times 7$; $8 \times 3 \times 13$; $8 \times 3 \times 17$ $8 \times 5 \times 13$; $8 \times 5 \times 19$;

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 4:

```
|D| impair: 3 \times 7 \times 31; 3 \times 5 \times 61; 3 \times 7 \times 47;
```

| D | multiple de 4:
$$4 \times 5 \times 13$$
; $4 \times 3 \times 23$; $4 \times 7 \times 11$; $4 \times 3 \times 47$; $4 \times 5 \times 29$; $4 \times 5 \times 41$; $4 \times 3 \times 71$; $4 \times 7 \times 31$;

$$\mid D \mid$$
 multiple de 8: $8 \times 3 \times 11$; $8 \times 3 \times 19$; $8 \times 3 \times 23$; $8 \times 7 \times 11$; $8 \times 5 \times 19$;

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 6:

```
\mid D \mid \text{ impair: } 3 \times 7 \times 11; \ 3 \times 5 \times 17;
```

$$D$$
 | multiple de 4: $4 \times 3 \times 43$; $4 \times 3 \times 67$; $4 \times 3 \times 79$; $4 \times 3 \times 83$;

$$|D| \text{ multiple de 8: } 8\times5\times11; \ 8\times5\times17; \ 8\times3\times29; \ 8\times3\times31; \\ 8\times3\times37; \ 8\times3\times41; \\ .$$

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 8:

$$\mid D \mid \text{impair: } 3 \times 7 \times 19; \ 3 \times 13 \times 17; \ 3 \times 7 \times 43;$$

$$\mid D \mid$$
 multiple de 4: $4 \times 7 \times 23$; $4 \times 5 \times 37$; $4 \times 13 \times 17$;

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 10:

```
\mid D \mid \text{ impair: } 5 \times 7 \times 13; \ 3 \times 5 \times 41;
```

$$|D|$$
 multiple de 4: $4 \times 11 \times 19$;

$$\mid D \mid$$
 multiple de 8: $8 \times 5 \times 23$;

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 12:

```
\mid D \mid \text{ impair: } 3 \times 11 \times 23;
```

Produit direct de deux groupes cycliques d'ordres 2 et 14:

```
|D| impair: 5 \times 11 \times 17;
```

Produit direct de trois groupes cycliques d'ordre 2:

```
\mid D \mid multiple de 4: 4 \times 3 \times 5 \times 7; 4 \times 3 \times 5 \times 11;
```

|D| multiple de 8: $8 \times 3 \times 5 \times 7$.