Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 7 (1961)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: LES CORPS QUADRATIQUES

Autor: Châtelet, A.

Kapitel: 43. Idéaux semi réduits remarquables.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-37125

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Un idéal (canonique) semi réduit M, de racine finale c, est caractérisé par:

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= (m, \ \theta - c) = (m, \ \theta - c_1); \quad c_1 \equiv c, \ (\text{mod. } m); \\ 0 &< 2c - S; \quad F(c) = -m \times n; \quad |m - n| < 2c - S[\text{ou } (m + n)^2 < D] \end{aligned}$$

Son idéal associé N (relativement à sa racine finale c), qui est aussi semi réduit, est:

$$N = (n, \theta - c) = (n, \theta - c_2); c_2 \equiv c, \pmod{n}.$$

Son idéal conjugué M', qui est aussi semi réduit, de même norme et de racine finale c', est:

$$\mathbf{M}' = (m, \ \theta - c'); \quad c' \equiv S - c, \ (\text{mod. } m);$$

$$F(c') < 0 < F(c' + m);$$

on peut évidemment remplacer la racine finale c' par tout entier c_1 , congru à c' (ou à S-c), mod. m.

43. Idéaux semi réduits remarquables.

Par analogie avec la notion des idéaux réduits remarquables dans un corps imaginaire (29), on peut donner les définitions suivantes.

Définitions. — Dans un corps quadratique réel, parmi les idéaux semi réduits (42), on peut remarquer, ou appeler remarquels:

- 1. un idéal qui est double (7) et qui est ainsi semi réduit double; il est égal à son conjugué.
- 2. un idéal qui est réfléchi, ou égal à son associé relativement à sa racine finale et qui est ainsi **semi réduit réfléchi** (puisque la différence des normes des idéaux associés qui est nulle est inférieure à 2c-S, qui ne l'est pas).

Théorème d'existence d'un idéal semi réduit double. — Pour qu'un idéal soit semi réduit double, il faut et il suffit que sa norme m soit un diviseur du discriminant D et vérifie les comparaisons:

- 1. Si D est impair, ou si D = 4d, d impair et m pair: $m^2 < D$.
- 2. Si D = 4d et m diviseur de d: $m^2 < d = D$:4.

Comme D ne peut avoir d'autre facteur carré que 4 (éventuellement), m^2 ne peut être égal, ni à D, ni à d = D:4 (il n'y a pas de corps réel, de discriminant égal à 4).

Pour qu'un idéal canonique soit double (7), il faut et il suffit que sa norme divise le discriminant; c'est la conséquence de l'étude de la congruence fondamentale (6). La condition supplémentaire de semi réduction résulte de l'examen des deux cas.

Dans le premier cas, m ne divisant pas D:4, on utilise l'expression du polynôme:

$$4F(x) = (2x-S)^2 - D;$$

on obtient des zéros conjugués, mod. m:

$$c = (S+m):2$$
 $c' = S-c = (S-m):2;$ $(c' = c-m);$

qui sont des racines consécutives de l'idéal, de norme m, pour lesquelles les valeurs du polynôme sont égales:

$$4F(c) = 4F(c') = m^2 - D.$$

Si $m^2 < D$, ces deux valeurs sont négatives, c'est la propriété caractéristique de semi réduction (40) de l'idéal, de norme m et de racines c ou c'.

Si $m^2 > D$, les deux racines c et c' et tous les autres termes de la progression:

$$c'$$
— λm ; $c+\lambda m$; λ entier positif

donnent à F(x) des valeurs positives; l'idéal ne peut être réduit.

Dans le deuxième cas, on utilise l'expression du polynome:

$$F(x) = x^2 - d;$$
 $D = 4d.$

m étant un diviseur de d, les entiers -m, 0, +m sont des racines consécutives de l'idéal double, de norme m.

Si $m^2 < d$, les valeurs:

$$F(-m) = F(+m) = m^2 - d$$

sont négatives, de même que F(0) = -d; l'idéal est semi réduit.

Si $m^2 > d$, la valeur F(0) = -d est encore négative, mais toutes les autres valeurs $F(\lambda m)$, pour tout entier λ non nul, sont positives, il n'existe pas de racines consécutives de l'idéal qui donnent à F(x) des valeurs négatives; l'idéal n'est pas semi réduit.

Théorème d'existence d'un idéal semi réduit réfléchi. — Pour qu'un idéal, de norme m, soit semi réduit réfléchi, il faut et il suffit que le discriminant D soit égal à la somme des carrés de deux nombres entiers, dont un égal à 2m:

$$D = a^2 + 4m^2 \begin{cases} a \text{ impair, si } D \text{ est impair;} \\ a \text{ pair, si } D \text{ est multiple de 8.} \end{cases}$$

Il n'y a pas d'idéal semi réduit réfléchi, dans un corps dont le discriminant est quadruple d'un nombre impair (D=4d; d impair).

Ainsi qu'il a été déjà vérifié (16), la condition de décomposition est manifestement nécessaire et suffisante pour que l'idéal:

$$\mathbf{M} = (m, \theta - c); \quad 2c - S = a;$$

soit réfléchi, relativement à la racine c, qui donne à F(x) la valeur négative $-m^2$.

Il n'y a pas de condition de comparaison: les deux facteurs de la décomposition de -F(c) étant égaux, leur différence est nulle, donc inférieure à 2c-S=a, qui ne peut être nul.

EXEMPLES. — Dans le corps de discriminant impair $145 = 5 \times 29$ (tableau XXII), les facteurs du discriminant D, de carré au plus égal à D sont 1 et 5, qui sont les normes des deux idéaux semi réduits doubles:

$$(1, \theta)$$
 $(5, \theta-2).$

Aux deux décompositions du discriminant:

$$145 = 9^2 + 4 \times 4^2$$
, $145 = 1^2 + 4 \times 6^2$,

correspondent les idéaux semi réduits réfléchis:

$$(4, \theta-4) = (4, \theta); (6, \theta),$$

de racines finales respectives 4 et 0.

Les idéaux conjugués:

$$(4, \theta+5) = (4, \theta-3), (6, \theta+1) = (6, \theta-5),$$

également semi réduits, sont réfléchis, mais relativement à leurs racines initiales —5 et —1 (tableau XXIII).

Dans le corps de discriminant pair $232 = 8 \times 29 = 4 \times 58$ (tableau XXII), la congruence fondamentale, qui a une racine double, mod. 2, est impossible mod. 4. Les normes des idéaux doubles ne peuvent être divisibles par 4 et sont des diviseurs de 58. Les seuls dont le carré est inférieur à 58 sont 1 et 2, qui sont les normes des idéaux réduits doubles (1, θ) et (2, θ).

Aux deux décompositions du discriminant:

$$232 = 6^2 + 4 \times 7^2;$$
 $232 = 14^2 + 4 \times 3^2;$

(qui sont composées des mêmes termes, mais où le quadruple du carré mis en évidence n'est pas le même) correspondent les idéaux semi réduits réfléchis:

$$(7, \theta - 3), (3, \theta - 7) = (3, \theta - 1),$$

de racines finales respectives 3 et 7. Les idéaux conjugués sont encore en évidence dans le tableau XXIII.

L'idéal unité est, dans tous les cas un idéal semi réduit double, sa norme 1 est diviseur de D comme de D:4 et son carré est inférieur à cette valeur. Sa racine finale est le plus grand entier c, qui donne à F(x) une valeur négative; son idéal associé est l'idéal principal (-F(c), $\theta-c$) = $(\theta-c)$.

Si cet entier c donne à F(x) la valeur —1, l'idéal associé est égal à l'idéal unité, qui est alors, à la fois, semi réduit double et réfléchi.

44. Cycles d'idéaux semi réduits.

On va établir que, dans un corps quadratique réel, les idéaux semi réduits peuvent être répartis en (un ou plusieurs) cycles, d'idéaux congrus entre eux. Par cycle, on entend un système de termes, en nombre fini, ordonnés circulairement.

A cet effet on définit et on justifie la relation d'ordre, puis la répartition qui en résulte; on vérifie la congruence, ou l'appartenance à une même classe des idéaux d'un cycle.