Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 11 (1965)

Heft: 4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR QUELQUES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES D'UNE

INÉGALITÉ RELATIVE AUX FONCTIONS CONVEXES

Autor: Steinig, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-39980

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

SUR QUELQUES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES D'UNE INÉGALITÉ RELATIVE AUX FONCTIONS CONVEXES

par J. Steinig

1. Introduction

On sait que les hauteurs $(h) = (h_1, h_2, h_3)$ d'un triangle et les rayons $(r) = (r_1, r_2, r_3)$ de ses cercles exinscrits sont liés par la relation

$$\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3},\tag{1}$$

qui peut s'écrire aussi

$$M_{-1}(h) = M_{-1}(r).$$

 $M_u(x)$ désigne ici la moyenne d'ordre u des nombres réels positifs $(x) = (x_1, x_2, ..., x_n)$, définie par

$$M_{u}(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_{i}^{u}\right)^{1/u} & pour \ u \neq 0\\ \left(\prod_{i=1}^{\lfloor n\rfloor}x_{i}\right)^{1/n} & pour \ u = 0; \end{cases}$$

c'est une fonction continue et croissante de u sur l'intervalle $(-\infty, +\infty)$.

M. A. Makowski a donné une généralisation de (1) en démontrant dans [1] les inégalités

$$\begin{cases}
M_{u}(h) \leq M_{u}(r) \text{ pour } u > -1 \\
M_{u}(h) \geq M_{u}(r) \text{ pour } u < -1.
\end{cases}$$
(2)

Nous nous proposons de démontrer ici quelques autres résultats du même genre à l'aide de l'inégalité de Karamata.

2. L'INÉGALITÉ DE KARAMATA

Rappelons brièvement en quoi consiste cette inégalité. Si les nombres réels $(x) = (x_1, x_2, ..., x_n)$ et $(x') = (x'_1, x'_2, ..., x'_n)$ satisfont aux trois conditions

(I)
$$x_1 \ge x_2 \ge \dots \ge x_n$$
, $x_1^{'} \ge x_2^{'} \ge \dots \ge x_n^{'}$,

(II)
$$x_1 + x_2 + \dots + x_v \leq x_1' + x_2' + \dots + x_v' (1 \leq v < n)$$
,

(III)
$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = x_1' + x_2' + \dots + x_n'$$
,

nous dirons avec les auteurs de [2] que (x') majore (x), et écrirons $(x) \prec (x')$.

M. J. Karamata a démontré [3] que si $(x) \prec (x')$, alors

$$\phi(x_1) + \phi(x_2) + \dots + \phi(x_n) \le \phi(x_1) + \phi(x_2) + \dots + \phi(x_n)$$
 (3)

pour toute fonction ϕ continue et convexe dans un intervalle comprenant (x) et (x'). Si ϕ est deux fois dérivable et $\phi'' > 0$, il n'y a égalité dans (3) que lorsque $(x) \equiv (x')$. L'inégalité (3) est évidemment renversée si ϕ est concave, car $-\phi$ est alors convexe.

M. M. Petrović a montré dans [4] que si la fonction f(x) possède au voisinage de x=0 un développement en série de puissances $a_0+a_1 x+a_2 x^2+\ldots$, avec $a_k \ge 0$ pour $k\ge 2$, alors

$$f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) \le f(x_1 + x_2 + x_3) + 2f(0)$$
,

et M. le Professeur Karamata nous a indiqué que c'est précisément la lecture de cet article qui lui donna l'idée de l'inégalité (3).

3. Quelques applications

Soit A_1 A_2 A_3 un triangle quelconque et a_i le côté opposé au sommet A_i , alors que m_i désigne la médiane passant par A_i et r_i le rayon du cercle exinscrit tangent à a_i .

Nous pouvons supposer que $a_1 \ge a_2 \ge a_3$, et donc que $r_1 \ge r_2 \ge r_3$ et $m_1 \le m_2 \le m_3$.

Nous démontrerons d'abord l'existence d'un nombre s, 0 < s < 1, tel que

$$\begin{cases}
\frac{\sqrt{3}}{2} M_{u}(a) \leq M_{u}(r) \text{ pour } u > s \\
\frac{\sqrt{3}}{2} M_{u}(a) \geq M_{u}(r) \text{ pour } u < s.
\end{cases} \tag{4}$$

En effet, $\frac{\sqrt{3}}{2} M_u(a) - M_u(r)$ est une fonction continue de u, et M. F. Leuenberger a montré [5] qu'elle est positive pour u=0 et négative pour u=1. Il existe donc une valeur s de la variable, 0 < s < 1, pour laquelle $\frac{\sqrt{3}}{2} M_s(a) - M_s(r) = 0$.

De plus, on peut montrer que

$$a_i = \frac{r_i (r_{i-1} + r_{i+1})}{\sqrt{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}},$$
 (5)

les indices étant pris mod 3; il s'ensuit facilement que

$$\frac{\sqrt{3}}{2} a_1 \le r_1 \qquad \text{et} \qquad \frac{\sqrt{3}}{2} a_3 \ge r_3. \tag{6}$$

En raison de ces propriétés, et puisque s > 0, nous avons

$$a_1^s \ge a_2^s \ge a_3^s , \quad r_1^s \ge r_2^s \ge r_3^s ,$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^s a_1^s \le r_1^s ,$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^s (a_1^s + a_2^s) \le r_1^s + r_2^s ,$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^s (a_1^s + a_2^s + a_3^s) = r_1^s + r_2^s + r_3^s .$$

Il suffit maintenant d'appliquer l'inégalité de Karamata en choisissant pour ϕ les fonctions convexes définies par

$$\begin{aligned} \phi \left(x \right) &= & x^{u/s} & (x \! > \! 0) & pour \ u < 0 \ ou \ u > s \,, \\ \phi \left(x \right) &= & - x^{u/s} & (x \! > \! 0) & pour \ 0 < u < s \,, \\ \phi \left(x \right) &= & - \log x \ (x \! > \! 0) \,, \end{aligned}$$

pour voir que (4) a lieu. Si $u \neq s$, il n'y a égalité que lorsque $\sqrt{3} a_i = 2r_i$ pour i = 1, 2, 3, c'est-à-dire lorsque le triangle est équilatéral.

Montrons maintenant en suivant le même raisonnement qu'il existe une valeur t, 0 < t < 1, telle que

$$\begin{cases}
M_{u}(m) \leq M_{u}(r) \text{ pour } u > t \\
M_{u}(m) \geq M_{u}(r) \text{ pour } u < t;
\end{cases}$$
(7)

c'est évidemment une inégalité plus précise que celle de Makowski pour $u \ge t$.

Les inégalités $M_o(m) \ge M_o(r)$ et $M_1(m) \le M_1(r)$ sont démontrées dans [5]. Il ne reste donc plus à montrer que $m_1 \ge r_3$ et $m_3 \le r_1$.

Pour prouver la première de ces inégalités, rappelons que

$$4m_{i}^{2} = 2 \left(a_{i-1}^{2} + a_{i+1}^{2}\right) - a_{i}^{2},$$
d'où
$$4m_{i}^{2} \ge \left(a_{i-1} + a_{i+1}\right)^{2} - a_{i}^{2},$$
soit
$$m_{i} \ge \sqrt{r_{i-1} r_{i+1}},$$
et en particulier
$$m_{1} \ge \sqrt{r_{2} r_{3}} \ge r_{3}.$$
(8)

D'autre part, on voit en appliquant les formules (5) et (8) que l'inégalité $m_3 \le r_1$ est équivalente à

$$2\left[r_2^2(r_1+r_3)^2+r_1^2(r_2+r_3)^2\right]-r_3^2(r_1+r_2)^2 \leq 4r_1^2 \cdot \sum_{i < j} r_i r_j,$$

ou encore à

$$r_1^2 r_3^2 + r_2^2 r_3^2 + 4r_1^2 r_2^2 + 4r_1 r_2^2 r_3 \le 4r_1^2 (r_1 r_2 + r_1 r_3) + 2r_1 r_2 r_3^2,$$
 ce qui peut s'écrire aussi

$$4r_1 r_3 (r_1^2 - r_2^2) + (r_1 - r_2) \left[4r_1^2 r_2 - r_3^2 (r_1 - r_2) \right] \ge 0.$$
 (9)

Or, on a manifestement $r_1 r_2 \ge r_3^2$ et $4r_1 > r_1 - r_2$, et le produit de ces deux inégalités positives donne $4r_1^2 r_2 > r_3^2 (r_1 - r_2)$. Puisqu'on a encore $r_1 \ge r_2$, aucun des termes du côté gauche de (9) n'est négatif, ce qui démontre cette inégalité.

Nous avons donc

$$M_0(r) \leq M_0(m)$$
 et $M_1(r) \geq M_1(m)$,
 $r_3 \leq m_1$ et $r_1 \geq m_3$;

c'est dire qu'il existe un t^{1}), 0 < t < 1, tel que $(m^{t}) < (r^{t})$.

L'inégalité (7) se trouve ainsi démontrée, et il est facile de voir qu'il n'y a égalité que dans le cas d'un triangle équilatéral.

Pour conclure, remarquons qu'il ne peut exister d'inégalité générale entre $\frac{\sqrt{3}}{2}$ $M_{u}(a)$ et $M_{u}(m)$; ceci est une conséquence

immédiate d'un théorème d'Euler [6] qui affirme qu'on peut construire avec les médianes m_i du triangle $A_1 A_2 A_3$ un nouveau triangle dont les médianes sont alors $\frac{3}{4} a_i$. Par contre, on sait qu'il existe certaines égalités; on voit aisément avec (8) qu'on a toujours

$$\frac{\sqrt{3}}{2} M_2(a) = M_2(m) \text{ et } \frac{\sqrt{3}}{2} M_4(a) = M_4(m).$$

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. Makowski, « Inequalities for a Triangle », El. Math. 16 (1961), 60-61.
- [2] G. H. HARDY, J. E. LITTLEWOOD, G. PÓLYA. « Inequalities », Cambridge University Press (second edition, 1959), aux pages 45 et 89.
- [3] J. Karamata, «Sur une inégalité relative aux fonctions convexes», Publ. math. Univ. Belgrade, 1 (1932), 145-148.
- [4] M. Petrović, « Sur quelques fonctions des côtés et des angles d'un triangle », Enseignement math. 18 (1916), 153-163.
- [5] F. Leuenberger, «Gegensätzliches Verhalten der arithmetischen und geometrischen Mittel», El. Math. 16 (1961), 127-129.
- [6] Leonhardi Euleri, Opera Omnia, Series I, Vol. 4 (Commentationes Arithmeticae 3), aux pages XXI et 298.

(Reçu le 30 juin 1964)

J. Steinig 5, rue Toeffer Genève

¹⁾ La valeur exacte de t, comme celle de s, dépendra du choix de a); par exemple, $s > \frac{1}{4}$ lorsque (a) = (3, 4, 5), au lieu que $s < \frac{1}{4}$ si (a) = (2, 24, 24).