Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 11 (1965)

Heft: 2-3: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE LINÉAIRE A

COEFFICIENTS VARIABLES

Autor: Badesco, Radu / Dumitresco, Eugeniu / Saulesco, Constantin

Kapitel: 6. GÉNÉRALISATION DE LA MÉTHODE.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-39970

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

e) La solution (17) existe aussi pour a = c, racine de $P_n(x)$, (d'ordre de multiplicité m) si la fonction f(x) admet une dérivée au voisinage de c où celle-ci se présente sous la forme

$$f'(x) = (x-c)^q f_1(x)$$

avec $f_1(c) \neq 0, \infty$ et $q \geq m$, car c est une singularité apparente pour $\frac{f'(t)}{P_n(t)}$. Le cas m-1 < q < m conduit à des intégrales généralisées, les solutions effectives de (3) étant données par (17) (pour a=c), et seulement le cas $q \leq m-1$ est à rejeter une fois que les intégrales correspondantes de (17) sont divergentes au voisinage de c.

6. Généralisation de la méthode.

Le problème étudié s'étend d'une manière naturelle au cas des équations (3) qui peuvent être réduites par p dérivations à l'équation

$$Y^{(n+p)} = \frac{f_0^{(p)}(x)}{P_n(x)} \tag{19}$$

M. Const. Saulesco, étudiant IIIe année, s'est proposé de trouver ces équations et a montré qu'elles se présentaient sous la forme

$$T_{p}(y) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^{i} C_{p+i-1}^{p-1} P_{n}^{(i)}(x) y^{(n-i)}(x) = f_{0}(x) \quad (20)$$

où $P_n(x)$ est un polynome arbitraire du n-ième degré et C_a^b le nombre des combinaisons b à b de a objets. Une suite de p intégrations permet immédiatement d'effectuer le passage de (19) à (20), ce qui constitue une vérification directe.

Par l'introduction des polynomes de la classe Appell $P_n(x)$, $(n=0,1,\dots)$, qui satisfont aux relations

$$P_n^{(i)}(x) = n(n-1)...(n-i+1)P_{n-i}(x), (i = 0, 1, ..., n) (21)$$

l'équation (20) prend la forme généralisant (3)

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^{i} \frac{(p+i-1)!}{(n-i)! i!} P_{n-i}(x) \cdot y^{(n-i)}(x) = f(x)$$
 (22)

où

$$f(x) = \frac{(p-1)!}{n!} f_0(x).$$

Nous donnerons ici seulement les résultats obtenus par M. Saulesco qui peuvent être établis d'une manière analogue au cas traité dans cet article pour l'équation (3).

7. Résolution de l'équation homogène $T_p(y) = 0$.

La solution y_0 de l'équation homogène (19) $[f_0(x) \equiv 0]$,

$$y_0 = Q_{n+p-1}(x) = \sum_{j=0}^{n+p-1} q_j x^j$$
 (23)

qui dépend des p+n constantes arbitraires q_j , ne peut vérifier l'équation homogène correspondante $T_p(y)=0$ que si l'on introduit p conditions supplémentaires entre ces constantes. Intégrant p fois cette dernière équation, apparaît un polynome du (p-1)-ème degré et son identification à zéro donne les p conditions cherchées portant sur les coefficients de $P_n(x)$ [introduits par (8)], et sur ceux de y_0

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^{i} (n-i+j)! (p+i-j-1)! a_{n-i} q_{n+j-i} = 0$$

$$(j=0, 1, ..., p-1).$$
(24)

Ces conditions peuvent être mises par une autre voie sous une forme plus restreinte dans laquelle figure la fonction connue g(t) de (8). Observons pour cela que l'opérateur $T_p(y_0)$ peut s'écrire, tenant compte de (8) et exprimant le polynome y_0 par son développement taylorien en (x-t),

$$T_{p}(y_{0}) = (-1)^{n} \frac{n!}{(p-1)!} \sum_{j=0}^{p-1} C_{p-1}^{j} x_{0}^{j} g(t) \cdot t^{n+p-j} \left[\frac{y_{0}^{(j)}(t)}{t^{n+1}} \right]^{(p-j-1)} dt$$
(25)