

**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique  
**Herausgeber:** Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique  
**Band:** 12 (1966)  
**Heft:** 4: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Artikel:** FIBRES SUR LE BRANCHEMENT SIMPLE  
**Autor:** Godbillon, C. / Reeb, G.

**Bibliographie**  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-40748>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

$] -\infty, 0]$  tel que  $\alpha(x) - \beta(f(x))$  se prolonge à  $\mathfrak{R}$ ; ils sont équivalents si  $\alpha(x) - \beta(x)$  se prolonge à  $\mathfrak{R}$ . Par exemple les fibrés définis par  $\alpha(x) = \frac{1}{x}$  et  $\beta(x) = -\frac{1}{x^2}$  sont isomorphes, mais ne sont pas équivalents dans  $T$ ; les fibrés définis par  $\alpha(x) = \frac{1}{x}$  et  $\beta(x) = \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$  ne sont pas isomorphes dans  $T$  (mais sont équivalents dans  $G^+$ ).

On peut aussi réduire le groupe de structure au sous-groupe  $H$  des difféomorphismes de  $\mathfrak{R}$  et au sous-groupe  $H^+ = H \cap G^+$ .

Si l'on suppose de plus que  $X$  est muni d'une structure différentiable, on peut aussi se restreindre aux applications  $f$  dans  $H$  (ou  $H^+$ ) qui déterminent des applications différentiables du produit de la source de  $f$  par  $\mathfrak{R}$  dans  $\mathfrak{R}$ . Avec cette restriction, on démontre, comme dans le cas continu, le même théorème de classification des fibrés différentiables séparés sur  $X$ .

Par contre on ne peut pas déduire de ce résultat une classification différentiable simple des feuilletages différentiables du plan. Il existe en effet des structures feuilletées différentiables du plan ayant le branchement simple pour espace des feuilles, et induisant sur  $X$  des structures différentiables non difféomorphes [1].

#### REFERENCES

- [1] HAEFLIGER, A. et G. REEB, Variétés (non séparées) à une dimension et structures feuilletées du plan. *Ens. Math.*, 3, 1957, pp. 107-125.
- [2] KAPLAN, W., Regular curve-families filling the plane. Part I: *Duke Math. J.*, 7, 1940, pp. 154-185; part II: *Duke Math. J.*, 8, 1941, pp. 11-46.
- [3] STEENROD, N., *The topology of fibre-bundles*. Princeton University Press, 1951.

(Reçu le 1<sup>er</sup> décembre 1966)

Institut de Recherche mathématique avancée  
Université de Strasbourg.

**Vide-leer-empty**