Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 14 (1968)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: CONVEXITÉ ET ENCHAÎNEMENT

Autor: Bantegnie, Robert

Bibliographie

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-42357

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

que $d_{\varepsilon}(x,y) \leqslant (C_{\varepsilon}) < (1+\eta) d_{\varepsilon}(x,y) \mathcal{L} \leqslant (1+\eta) d(x,y)$ ce qui montre que (E,d) est 1-presque bien enchaîné, donc totalement presque convexe d'après le théorème 1. Ce qui concerne l'équivalence des métriques est immédiat.

(c) Si l'espace est 1-presque bien enchaîné on a pour tout $\varepsilon > 0$, $d_{\varepsilon}(x,y) = d(x,y)$ donc $\hat{d}(x,y) = d(x,y)$ pour toutc ouple (x,y). Réciproquement c'est encore plus évident.

On dit qu'un espace (E, d) est rectifiablement lié si pour tout couple (x, y) de points de E on peut trouver un arc rectifiable Γ joignant x et y dans E. On pose alors $d_i(x, y) = \inf \mathcal{L}(\Gamma)$, la borne inférieure étant celle des longueurs des arcs comme ci-dessus, d_i définit sur E une métrique appelée métrique intrinsèque associée à d.

Proposition 7.

Tout espace métrique (E,d) localement compact complet enchaîné sans détour et rectifiablement bien enchaîné est rectifiablement lié. Par rapport à sa métrique intrinsèque d_i il est compact à distance finie et segmenté.

Preuve. (E, d) est aussi localement compact et complet; il est totalement presque convexe d'après la proposition 6, donc compact à distance finie et segmenté d'après le corollaire 1 du théorème 3 de [2]. Mais alors (E, d) est rectifiablement lié et d_i et d coïncident, d'où le résultat.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Bantegnie, R., Sur certains espaces métriques. Proc. Kon. Ned. Akad. van Wetensch. A 70, *Indag. Math.* 29, 74-75 (1967).
- [2] χ-régularité et compacité à distance finie. C.R. Ac. Sci. Paris, 265 A, 772-775 (1967).
- [3] GREEN, J. W. et W. GUSTIN, Quasiconvex sets. Can. J. of Math. 2, 489-507 (1950).
- [4] Menger, K., Untersuchungen über allgemeine Metrik I, II, III. Math. Ann. 100, 75-163 (1928).
- [5] RINOW, W., Die innere Geometrie den metrischen Raumes. Springer, Berlin, Gôttingen, Heidelberg (1961).

(Reçu le 25 mars 1969.)

R. Bantegnie

- 2.A., rue des Jardins
- 25 Besançon (France)