Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 14 (1968)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: CLASSES DE CHERN D'UN ESPACE HOMOGÈNE PRESQUE

**COMPLEXE** 

Autor: Maumary, S.

**Bibliographie** 

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-42358

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

produit scalaire quelconque dans  $\xi$ , paramétré par les fibres. Si P est le  $U_n$ -fibré principal formé par les bases orthonormées de  $\xi$ , alors  $DU(\xi) = E(P)/T$ , avec

$$T = \begin{pmatrix} U_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & & U_1 \end{pmatrix}.$$

2) Le principe de clivage reste valable pour les fibrés vectoriels réels, à condition de remplacer les coefficients entiers par  $Z_2$ . En effet, dans la démonstration ci-dessus, on doit remplacer  $P\mathbf{C}^k$  par  $P\mathbf{R}^k$  et la formule de Künneth ne reste juste que pour les coefficients  $Z_2$ . (Rappelons que  $H^i(P\mathbf{R}^k; \mathbf{Z}) \approx Z_2$  pour i impair < k).

## **RÉFÉRENCES**

- [1] CHEVALLEY, C. Theory of Lie groups.
- [2] Serre, J.-P. Algèbres de Lie semi-simples complexes.
- [3] HUSEMOLLER, D. Fibre bundles.
- [4] BOREL, A. and F. HIRZEBRUCH. « Characteristic classes and homogeneous spaces I, II, III ». Am. J. of Math. 1958, 59, 60.
- [5] Steenrod, N. The topology of fibre bundles.

(Reçu le 18 mars 1969)

Serge Maumary
Institute for Advanced Studies
Princeton, New-Jersey
U. S. A.