Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 16 (1970)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: NOTE RELATIVE AUX THÉORÈMES DES S-UNITÉS ET DES S-

CLASSES

Autor: Joly, Jean-René
Kapitel: 1. Introduction

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-43865

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

NOTE RELATIVE AUX THÉORÈMES DES S-UNITÉS ET DES S-CLASSES

par Jean-René Joly

1. Introduction

Soit K un corps de nombres algébriques de degré n sur \mathbb{Q} , et désignons par A l'anneau des entiers de K, par U le groupe des unités de A et par r_1 (resp. $2r_2$) le nombre de plongements réels (resp. non réels) de K dans \mathbb{C} ; on a $n = r_1 + 2r_2$, et $a = r_1 + r_2$ est égal au nombre de places archimédiennes de K. Si alors $|\cdot|_1, |\cdot|_2, ..., |\cdot|_a$ sont les valeurs absolues normalisées correspondant à ces places, le classique théorème des unités de Dirichlet s'énonce:

(1) Soit $L: U \to \mathbb{R}^a$ l'homomorphisme défini par

$$x \mapsto (\log |x|_1, \log |x|_2, ..., \log |x|_a).$$

Le noyau de L est le groupe W (fini, cyclique) des racines de l'unité appartenant à K, et l'image L (U) est un réseau de rang r=a-1 dans \mathbf{R}^a . Le groupe U est donc produit direct de W par un groupe abélien libre de rang r.

Ce théorème se double du théorème de la finitude du groupe des classes :

(2) L'ordre h du groupe des classes d'idéaux de A est fini.

Ces deux théorèmes se démontrent facilement, on le sait, à l'aide du théorème des corps convexes de Minkowski: voir par exemple [3], chap. 12, ou [7], chap. 2, ou encore [10], chap. 4. Ils ont été généralisés par Hasse et Chevalley (voir [1]) de la façon suivante: soit S un ensemble fini de places de K contenant toutes les places archimédiennes, et soit D l'ensemble des places discrètes de K appartenant à S; si s = Card S et si d = Card D, on a donc s = a + d. Notons $p_1, p_2, ..., p_d$ les idéaux premiers de A correspondant aux places de D, $v_1, v_2, ..., v_d$ les valuations discrètes normalisées et $|\cdot|_{a+1}, |\cdot|_{a+2}, ..., |\cdot|_s$ les valeurs absolues normalisées associées à ces places (voir [3], chap. 3), A_S l'anneau des S-entiers de K, c'est-à-dire l'anneau (de Dedekind) formé des $x \in K$ tels que $v(x) \ge 0$ pour toute

valuation discrète normalisée v autre que $v_1, v_2, ..., v_d$, et U_S le groupe des S-unités de K, c'est-à-dire le groupe des unités de A_S . Avec ces notations, Hasse et Chevalley ont donc démontré le théorème des S-unités:

(3) Soit $\Lambda: U_S \to \mathbf{R}^s$ l'homomorphisme défini par

$$x \mapsto (\log |x|_1, ..., \log |x|_a, \log |x|_{a+1}, ..., \log |x|_s).$$

Le noyau de Λ est le groupe W des racines de l'unité appartenant à K, et l'image Λ (U_S) est un réseau de rang s-1=r+d dans \mathbf{R}^s . Le groupe U_S est donc produit direct de W par un groupe abélien libre de rang s-1.

Ce théorème se complète par le théorème des S-classes:

(4) L'ordre h_S du groupe des classes d'idéaux de A_S est fini (en fait, h_S divise h). De plus, pour S « suffisamment grand », h_S est égal à 1, autrement dit, A_S est principal.

Ces deux théorèmes (des S-unités et des S-classes) ont l'intérêt de permettre, grâce au lemme de Herbrand, une démonstration non analytique et relativement simple des deux inégalités fondamentales de la théorie du corps de classes (voir par exemple [4], chap. 5 et 6, ou [8], chap. VIII, §8-9). Les démonstrations de ces deux théorèmes qu'on trouve dans la littérature s'inspirent en général de l'article d'Artin-Whaples [2], et s'appuient sur des calculs de volumes et de densités: voir par exemple [5], [6]; dans cet ordre d'idées, la méthode la plus élégante consiste d'ailleurs à prouver tout d'abord la compacité du groupe J_K^1/K^* des classes d'idèles de volume 1, et à déduire de là les théorèmes (3) et (4): c'est la technique adoptée dans [8] et [9] (voir aussi [5], pp. 219-222).

Le but de la présente note est de donner des théorèmes (3) et (4) une démonstration directe à partir des classiques théorèmes (1) et (2) de Dirichlet; en plus de son caractère naturel, cette méthode a l'avantage de bien faire voir le mécanisme de la « dilatation » du groupe des S-unités et de la « contraction » du groupe des S-classes lorsqu'on « dilate » l'ensemble S. Le §2 est consacré à l'étude de l'anneau A_S . Les théorèmes (3) et (4) sont démontrés respectivement aux §3 et 4. Le §5 illustre par un exemple les démonstrations données aux §3 et 4.