Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

Band: 18 (1972)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: L'ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DE CAUCHY RIEMANN SUR UN

DOMAINE STRICTEMENT PSEUDO-CONVEXE SOLUTIONS

BORNÉES

Autor: Jambon, M.

Kapitel: §7. Solution de l'équation

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-45380

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

§ 7. SOLUTION DE L'ÉQUATION

1. $G, G_v, \varphi, W, \Omega_{nq}, A_{nq}$ sont définis comme dans le chapitre précédent. Soit $\beta \in \mathscr{C}_{0,q+1}^{\infty}(G)$ bornée sur G pour la norme définie au § 1.5.

Nous posons

$$\gamma_{\nu}(y) = \frac{-1}{(2\pi i)^n} \int_{x \in G_{\nu}} \beta(x) \wedge B_{nq}(x, y),$$

$$\zeta_{\nu}(y) = \frac{(-1)^{q+1}}{(2\pi i)^n} \int_{x \in \partial G_{\nu}} \beta(x) \wedge A_{nq}(x, y),$$

$$v \in \mathbb{N}, 0 \leq q \leq n-1$$
.

Notons qu'on ne peut a priori remplacer G_v par G car β n'est pas définie sur ∂G .

2. Lemme 7.1. La suite $\gamma_v(y)$ converge localement uniformément sur G ainsi que toutes ses dérivées vers

$$\gamma(y) = \frac{-1}{(2\pi i)^n} \int_{x \in G} \beta(x) \wedge B_{nq}(x, y)$$
$$\gamma \in \mathscr{C}_{0, q}^{\infty}(G).$$

et

Ceci résulte du fait que β est bornée et du lemme 4.4.

- 3. Nous nous occupons des propriétés correspondantes pour ζ_{ν} . Puisqu'on peut différentier sous le signe intégrale à un ordre quelconque, il vient aussitôt:
- Lemme 7.2. Les formes ζ_{ν} sont indéfiniment différentiables sur G_{ν} . Le lemme 7.3 n'est pas tout aussi trivial.
- Lemme 7.3. La suite ζ_v converge avec toutes ses dérivées localement uniformément sur G.

Démonstration. Soit $G' \subset G_{vo}$ et $\mu > \nu > \nu_o$.

$$\zeta_{\mu}(y) - \zeta_{\nu}(y) = (-1)^{q+1} \int_{\partial G_{\mu} - \partial G_{\nu}} \beta(x) \wedge A_{nq}$$
$$= (-1)^{q+1} \int_{\partial (G_{\mu} \setminus G_{\nu})} \beta(x) \wedge A_{nq}$$

$$= (-1)^{q+1} \int_{G_{\mu} \setminus G_{\nu}} d_{x} (\beta(x) \wedge A_{nq})$$

$$= (-1)^{2[q+1]} \int_{G_{\mu} \setminus G_{\nu}} \beta(x) \wedge \bar{\partial}_{x} A_{nq}(x, y),$$

à cause de $\bar{\partial}\beta = 0$.

Maintenant d'après la construction de g(x, y), la forme $\bar{\partial}_x A_{nq}(x, y)$ pour $x \in G \backslash G_{vo}$ et $y \in G'$ est bornée, donc avec une constante convenable

$$|\zeta_{\mu}(y) - \zeta_{\nu}(y)| \leq K \int_{G_{\mu} \setminus G_{\nu}} \bigwedge_{\lambda=1}^{n} (dx'_{\lambda} \wedge dx''_{\lambda}).$$

Cela montre la convergence uniforme sur G' de la suite ζ_{ν} . Par différentiation de $\bar{\partial}_x A_{nq}(x, y)$ sous le signe intégral par rapport à y, on constate la convergence uniforme locale de toutes les dérivées de $\zeta_{\nu}(y)$.

4. Nous posons maintenant

$$\zeta(y) = \lim_{y \to \infty} \zeta_{v}(y), \ \zeta \in \mathscr{C}^{\infty}_{(o,q)}(G).$$

Nous formulons alors le résultat de ce chapitre.

Théorème 9.

Soit $\beta \in \mathscr{C}^{\infty}_{0, q+1}(G)$, telle que β est bornée sur G et $\bar{\partial}\beta = 0$. Alors la (0, q)-forme $\alpha = \gamma + \zeta$ satisfait à $\bar{\partial}\alpha = \beta$, où l'on rappelle

$$\gamma(y) = \frac{-1}{(2\pi i)^n} \int_{x \in G} \beta(x) \wedge B_{nq}(x, y),$$

$$\zeta(y) = \lim_{v \to \infty} \frac{(-1)^{q+1}}{(2\pi i)^n} \int_{x \in \partial G_v} \beta(x) \wedge A_{nq}(x, y).$$

Démonstration. A cause de la pseudo-convexité de G, il existe $\eta \in \mathscr{C}_{oq}^{\infty}(G)$ telle que $\bar{\partial}\eta = \beta$; η n'a pas besoin d'être borné mais possède d'après le théorème 8 la représentation

$$\eta(y) = \zeta_{v}(y) + \gamma_{v}(y) + \frac{1}{(2\pi i)^{n}} \left[\int_{x \in \partial G_{v}} \eta(x) \Omega_{nq}(x, y) + \bar{\partial}_{y} \Gamma(y) \right]$$

pour $y \in G_{vo}$ et $v > v_o$.

De là il s'ensuit

$$\beta(y) = \bar{\partial}\eta(y) = \bar{\partial}\zeta_{y}(y) + \bar{\partial}\gamma_{y}(y)$$
.

Faisons dans cette équation $v \to \infty$; ainsi, pour $y \in G_{vo}$,

$$\bar{\partial}\zeta_{\nu}(y) + \bar{\partial}\gamma_{\nu}(y) \rightarrow \bar{\partial}\zeta(y) + \bar{\partial}\gamma(y)$$
,

d'après les lemmes 7.3 et 7.1. Le raisonnement vaut pour tout v_o , donc $\forall y \in G, \ \bar{\partial} \ \alpha = \beta$.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION POUR LA NORME UNIFORME

§ 8

1. Rappelons que la norme uniforme a été définie au § 1.5 pour des éléments de $\mathscr{B}\mathscr{C}^{\infty}_{oq}(G)$; on obtient

$$\forall y \in G, \mid \alpha(y) \mid = \sup_{|x_1| \le 1 \dots |x_q| \le 1} \alpha(y) [x_1, \dots, x, q],$$
$$\mid \alpha \mid = \sup_{y \in G} |\alpha(y)|.$$

Le but de ce chapitre est de prouver, avec les notations du chapitre précédent: si $\bar{\partial}\beta = 0$, $\exists \alpha, K > 0$ tels que $\bar{\partial}\alpha = \beta$ et $|\alpha| \leq K |\beta|$.

2. Majoration de γ

On avait
$$\gamma(y) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{x \in G} \beta(x) \wedge B_{nq}(x, y)$$
.

On en tire
$$|\gamma(y)| \leq \frac{|\beta|}{(2\pi)^n} \int_{x \in G} \frac{K_1}{|x-y|^{2n-1}} \bigwedge_{\lambda=1}^n (d\bar{x}_{\lambda} \wedge dx_{\lambda}).$$

Soit S la sphère de rayon R = (diamètre G) et centrée en 0.

$$|\gamma(y)| \leq \frac{K_1 |\beta|}{(2\pi)^n} \int_{S} \bigwedge_{\lambda=1}^n \frac{(d\bar{z}_{\lambda} dz_{\lambda})}{|z|^{2n-1}} \leq K |\beta|,$$

où K est indépendant de y, d'où $|\gamma| \leq K |\beta|$.

La majoration de ζ est beaucoup plus difficile à obtenir; nous aurons d'abord besoin de certaines évaluations sur la fonction g du théorème 5.