**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 19 (1973)

**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE CONTRÔLE OPTIMAL DE SYSTÈMES DISTRIBUÉS

Autor: Lions, J. L.

**Kapitel:** 3.1. Un système hyperbolique

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-46289

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## 3. Cas linéaire quadratique — Remarques sur le système d'optimalité

### 3.1. Un système hyperbolique

On reprend ici certains points de Lions [3]: dans un ouvert borné  $\Omega$  de  $\mathbb{R}^n$  de frontière  $\Gamma$  régulière, on considère l'opérateur  $\Lambda$  défini par:

(3.1) 
$$A\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_{i}(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}}$$

où les fonctions  $a_i \in C^1(\overline{\Omega})$ ; [on pourrait aussi bien considérer des fonctions dépendant de x et t; nous nous bornons au cas où les  $a_i$  ne dépendent pas de t uniquement pour un peu simplifier l'exposé]. On introduit:

$$\Gamma_{-} = \left\{ x \mid x \in \Gamma , \sum_{i=1}^{n} a_{i}(x) \vee_{i} \leqslant 0 \right\}$$

$$\Gamma_{+} = \left\{ x \mid x \in \Gamma , \sum_{i=1}^{n} a_{i}(x) \vee_{i} \geqslant 0 \right\}$$

où  $v = \{v_i\}$  désigne la normale à  $\Gamma$  dirigée vers l'extérieur de  $\Omega$ .

On suppose que l'état y = y(v) = y(x, t; v) du système est défini par la solution du problème mixte hyperbolique:

(3.2) 
$$\frac{\partial y}{\partial t} + Ay = f + v \text{ dans } Q = \Omega \times ]0, T[,$$

(3.3) 
$$y = 0 \text{ sur } \Sigma_{-} = \Gamma_{-} \times ]0, T[,$$

$$(3.4) y(x, 0) = y_0(x), x \in \Omega$$

où f et  $y_0$  sont donnés avec:

$$(3.5) f \in L^2(Q), y_0 \in L^2(\Omega)$$

et où  $v \in \mathcal{U}_{ad}$  avec:

(3.6) 
$$\mathcal{U}_{ad}$$
 = ensemble convexe fermé non vide de  $L^2(Q)$ .

Remarque 3.1.

Il s'agit donc dans le problème précédent d'un contrôle distribué. (Cf. à ce sujet la Remarque 3.3. ci-après).

La fonction coût est donnée par:

(3.7) 
$$J(v) = \int_{Q} |y(v) - z_{d}|^{2} dx dt + N \int_{Q} v^{2} dx dt,$$

où  $z_d$  est donnée dans  $L^2(Q)$  et où N est donné > 0. Le problème

(3.8) 
$$\inf J(v)$$
$$v \in \mathcal{U}_{ad}$$

admet une solution unique (vérification immédiate) pour laquelle nous allons écrire le « système d'optimalité ».

# 3.2. Système d'optimalité

Soit u la solution de (3.8). On pose y(u) = y et l'on définit l'état adjoint p par p:

$$(3.9) -\frac{\partial p}{\partial t} + A^*p = y - z_d,$$

(3.10) 
$$p = 0 \operatorname{sur} \Sigma_{+} = \Gamma_{+} \times ]0, T[,$$

$$(3.11) p(x,T) = 0 sur \Omega.$$

Le contrôle u est caractérisé par:

(3.12) 
$$\int_{Q} (y-z_d) (y(v)-y) dx dt + N \int_{Q} u (v-u) dx dt \ge 0, \forall v \in \mathcal{U}_{ad}$$

Mais on déduit facilement de (3.9), (3.10), (3.11) que:

$$\int_{Q} (y-z_d) (y(v)-y) dx dt = \int_{Q} p(v-u) dx dt$$

<sup>1)</sup>  $A^*$  est défini par  $A^* \varphi = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (a_i \varphi)$ .