**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 19 (1973)

**Heft:** 1-2: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE CONTRÔLE OPTIMAL DE SYSTÈMES DISTRIBUÉS

Autor: Lions, J. L.

**Kapitel:** 4.2. Cas non différentiable

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-46289

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## 4.2. Cas non différentiable

Voici un exemple de problème de contrôle intervenant également en biochimie. L'état est donné par l'équation:

$$(4.12) \qquad \frac{\partial y}{\partial t} - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \sigma \frac{y}{1+y} = f + v , x \in ]0,1[,t \in ]0,T[,$$

donc équation analogue à (4.1), avec cette fois le contrôle distribué  $v \in \mathcal{U}_{ad}$ , où

(4.13)  $\overline{\mathcal{U}}_{ad}$  = ensemble fermé convexe non vide de  $L^2(Q)$ , contenu dans les fonctions p.p.  $\geqslant 0$  dans Q.

La condition initiale est identique à (4.2). Les conditions aux limites sont les suivantes: soit  $h \ge 0$  donné; alors c étant une constante > 0,

$$(4.14) \quad -\frac{\partial y}{\partial x}(0,t) = -c(y-h)^{+}\Big|_{x=0}, \frac{\partial y}{\partial x}(1,t) = -c(y-h)^{+}\Big|_{x=1}.$$

On vérifie encore que le problème (4.12) (4.2) (4.14) admet une solution unique, soit y = y(v). Si la fonction coût est encore donnée par (4.7), le problème:

$$(4.15) Inf  $J(v), v \in \overline{\mathcal{U}}_{ad}$$$

admet encore une solution (au moins), soit u.

Mais la fonction  $\lambda \to \lambda^+$  n'étant pas différentiable à l'origine, l'application  $v \to y(v)$  de  $L^2(Q) \to L^2(Q)$  n'est plus différentiable, et l'obtention de conditions d'optimalité semble une question ouverte.

# Remarque 4.3.

Du point de vue numérique (Cf. Yvon [1]) on introduit une fonction  $\lambda \to \gamma(\lambda)$  approximation différentiable de  $\lambda \to \lambda^+$  et l'on remplace (4.14) par:

(4.16) 
$$-\frac{\partial y}{\partial x}(0,t) = -c\gamma(y(0,t)-h),$$
 
$$\frac{\partial y}{\partial x}(1,t) = c\gamma(y(1,t)-h).$$