

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 21 (1975)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: NOTES ON THE CONGRUENCE $y^2 \equiv x^5 - a \pmod{p}$
Autor: Rajwade, A. R.

Bibliographie
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-47329>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

(iv). If π is a complex prime factor of a $p \equiv 1, 4 \pmod{5}$ and σ of a $q \equiv 1, 4 \pmod{5}$, then $\overline{(\pi/\sigma)_{10}} = (\bar{\pi}/\bar{\sigma})_{10}$.

2. The symbol $(\alpha/\beta)_5$ is defined in the same way and has similar properties.

3. The symbol $(a/p)_{\mathbf{Z}}$ is simply the ordinary Legendre symbol, the subscript \mathbf{Z} is used to distinguish it from the symbol $(\alpha/\beta)_2$ which denotes the quadratic character of α modulo β in a given ring, e.g. if $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}[i]$

$$\text{then } (\alpha/\beta)_{\mathbf{Z}[i]} = \begin{cases} 1 & \text{if } x^2 \equiv \alpha \pmod{\beta} \text{ is solvable in } \mathbf{Z}[i], \\ -1 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

REFERENCES

- [1] DICKSON, L. E. Cyclotomy, higher congruences and Waring's problem. *American Journal of Mathematics*, 57 (1935), pp. 391-424.
- [2] RAJWADE, A. R. On rational primes p congruent to 1 (mod 3 or 5). *Proc. Camb. Phil. Soc.* 66 (1969), pp. 61-70.
- [3] ——— On the congruence $y^2 \equiv x^5 - a \pmod{p}$. *Proc. Camb. Phil. Soc.* (to appear).

(Reçu le 7 janvier 1975)

A. R. Rajwade

Department of Mathematics
Panjab University
Chandigarh, India