

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 21 (1975)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: NOMBRE DE CLASSES D'UN ORDRE D'EICHLER ET VALEUR AU POINT -1 DE LA FONCTION ZËTA D'UN CORPS QUADRATIQUE RÉEL
Autor: Vigneras, Marie-France
Kapitel: Chapitre 2. Partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)$
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-47331>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CHAPITRE 2. PARTIE FRACTIONNAIRE DE $\zeta_k(-1)$

1. Théorème général

La relation $2H/h_k \in \mathbf{Z}$ du corollaire 1.1 nous donne une formule pour la partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)$ dans laquelle ne subsiste apparemment aucun lien avec les quaternions. Cette formule est la base de ce chapitre et nous la redonnons avec suffisamment de détails pour qu'il ne soit pas utile de se référer au chapitre précédent.

D'après la proposition 1.3 démontrée dans le chapitre précédent, la relation $2H/h_k \in \mathbf{Z}$ s'écrit :

$$\zeta_k(-1) \Phi_k(D_1, D_2) 2^{2-n_k} + \sum_O \frac{w(O) - 1}{w(O)} E_{D_1, D_2}(O) h'(O) \in \mathbf{Z}$$

ou encore

PROPOSITION 2.1. *On a pour tout corps de nombres k totalement réel*

$$(21) \quad \zeta_k(-1) \Phi_k(D_1, D_2) 2^{2-n} \equiv \sum_O E_{D_1, D_2}(O) \frac{h'(O)}{w(O)} \pmod{1}.$$

Dans cette relation,

n est le degré absolu de k et $\zeta_k(\cdot)$ sa fonction zêta,

D_1 est un produit d'idéaux premiers de k , sans facteurs carrés, dont le nombre a même parité que le degré n du corps k

D_2 est aussi un produit d'idéaux premiers de k , sans facteurs carrés et $(D_1, D_2) = 1$.

La somme \sum_O porte sur tous les ordres O des extensions quadratiques de k totalement imaginaires tels que $w(O) = [O^* : R^*]$ soit supérieur strictement à 1. Cette somme est donc finie. Si $h(O)$ est le nombre de classes des idéaux inversibles de O , on pose $h'(O) = h(O)/h_k$.

Enfin, on a

$$\Phi_k(D_1, D_2) = \prod_{p|D_1} (1 - Np) \prod_{p|D_2} (1 + Np)$$

$$E_{D_1, D_2}(O) = \prod_{p|D_1} \left(1 - \left\{\frac{O}{p}\right\}\right) \prod_{p|D_2} \left(1 + \left\{\frac{O}{p}\right\}\right)$$

où $\left\{\frac{O}{p}\right\} = 1$ si p divise le conducteur $f(O)$ de O , sinon

$$\left\{ \frac{O}{\mathfrak{p}} \right\} = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathfrak{p} \text{ est ramifié dans } k(O) \\ 1 & \text{si } \mathfrak{p} \text{ est décomposé dans } k(O) \\ -1 & \text{si } \mathfrak{p} \text{ est inerte dans } k(O) \end{cases}$$

Soit p un nombre premier. Tout nombre rationnel x peut s'écrire de façon unique sous la forme $\frac{a}{p^n} + b$ où n est un entier positif ou nul, a un entier premier à p , compris entre 1 et $p^n - 1$ (si $n = 0$, on prend $a = 0$) et b un nombre rationnel p -entier, $\frac{a}{p^n}$ s'appelle la p -partie fractionnaire de x .

Pour p impair (resp. $p = 2$) on note ξ_p une racine de l'unité d'ordre p (resp. d'ordre 4).

On note w_p l'indice des unités de k dans celles de $k(\xi_p)$ et s_p le nombre d'idéaux premiers $\mathfrak{p} \mid p$ inertes dans $k(\xi_p)$. Si $h_{k(\xi_p)}$ est le nombre de classes de $k(\xi_p)$ on pose $h'_p = h_{k(\xi_p)}/h_k$.

THÉOREME II.1. *Soit p un nombre premier impair ; la valeur au point -1 de la fonction zêta d'un corps de nombres totalement réel k est entière en p si $[k(\xi_p) : k] > 2$ ou s'il existe un idéal premier $\mathfrak{p} \mid p$ de k décomposé dans $k(\xi_p)$. Sinon, la p -partie fractionnaire de $2^{2-n} \zeta_k(-1)$ est celle de*

$$\frac{h'_p 2^{s_p}}{w_p \prod_{\mathfrak{p} \mid p} (1 - N\mathfrak{p})}.$$

S'il existe un idéal premier $\mathfrak{p} \mid 2$ de k décomposé dans $k(\xi_2)$ alors $\zeta_k(-1)/2^{n-3}$ est entier en 2, sinon sa partie fractionnaire est celle de

$$\frac{h'_2 2^{s_2+1}}{w_2 \prod_{\mathfrak{p} \mid 2} (1 - N\mathfrak{p})}.$$

La partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)$ a été également calculée par Brown [1] et Greenberg [5]. Le théorème ne donne que la 2-partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)/2^{n-3}$; nous avons étudié des cas particuliers: corps quadratiques réels, corps cyclotomiques et obtenus la 2-partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)/2^{n-1}$.

Démonstration du théorème II.1.

Premier cas : p est un nombre premier impair. On choisit $D_2 = (1)$, D_1 un produit d'idéaux premiers $\mathfrak{p} \mid p$ (en nombre convenable). Alors

$$\Phi_k(D_1, 1) = \prod_{p|D_1} (1 - Np)$$

est premier à p , la p -partie fractionnaire de $\zeta_k (-1) 2^{2-n}$ est celle de :

$$\frac{1}{\Phi_k(D_1, 1)} \sum_{\xi_p \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}$$

car si $\xi_p \notin O$, alors $\frac{1}{w(O)}$ est entier en p .

La condition sur le degré $[k(\xi_p) : k] = 2$ pour qu'il existe une p -partie fractionnaire est claire puisque la somme porte sur des ordres O d'extensions quadratiques de k . S'il existe $p | D_1$ décomposé dans $k(\xi_p)$, alors

$$E_{D_1,1}(O) = \prod_{p|D_1} \left(1 - \left\{\frac{O}{p}\right\}\right) = 0$$

et $\zeta_k (-1) 2^{2-n}$ est entier en p . Si $p_o | p$ est décomposé dans $k(\xi_p)$, il est toujours possible de choisir D_1 divisible par p_o , en tenant compte de la parité de n , sauf si n est pair et si p_o est l'unique idéal premier de k au-dessus de p . Dans ce cas, en choisissant $D_1 = (1)$ nous allons montrer que la contribution de la somme qui détermine la p -partie fractionnaire de $\zeta_k (-1)$

$$\sum_{\xi_p \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}$$

est entière. Les ordres O contenant ξ_p sont les ordres de conducteur $1, p_o, \dots, p_o^m$ où p_o^m est le conducteur de l'ordre $R[1, \xi_p]$ dans l'ordre maximal de $k(\xi_p)$. Si $p^{n(p)}$ est la plus grande puissance de p divisant w_p , on a $m \geq p^{n(p)-1}$. D'autre part si O est un ordre de conducteur p_o^r , on a

$$\frac{h'(O)}{w(O)} = \frac{h'_p}{w_p} N p_o^r \left(1 - \frac{1}{N p_o}\right).$$

Pour tous les ordres O ,

$$E_{1,1}(O) = 1$$

d'où

$$\begin{aligned} \sum_{\xi_p \in O} E_{1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)} &= \frac{h'_p}{w_p} \left[1 + \left(1 - \frac{1}{N p_o}\right) \left(N p_o + \dots + N p_o^m\right)\right] \\ &= \frac{h'_p}{w_p} N p_o^m. \end{aligned}$$

Il est clair puisque $m \geq p^{n(p)-1}$ que cette somme est entière en p .

Dans les autres cas, nous cherchons la p -partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)$. Si le nombre d'idéaux premiers de k divisant p a même parité que le degré n , on choisit $D_1 = \prod_{p|p} p$. Ce choix a l'avantage de réduire la somme

$\sum_{\xi_p \in O}$ à l'unique terme correspondant à l'ordre maximal de $k(\xi_p)$, tout ordre non maximal O contenant ξ_p ayant un conducteur non premier à D_1 , on a

$$E_{D_1,1}(O) = \prod_{p|D_1} \left(1 - \left\{\frac{O}{p}\right\}\right) = 0 \quad \text{si } O \text{ n'est pas maximal,}$$

$$E_{D_1,1}(O) = 2^{s_p} \quad \text{si } O \text{ est maximal,}$$

où s_p est le nombre d'idéaux premiers au-dessus de p qui sont inertes dans $k(\xi_p)$. La p -partie fractionnaire de $\zeta_k(-1) 2^{2-n}$ est donc celle de

$$\frac{1}{\prod_{p|p} (1 - Np)} \frac{2^{s_p} h'_p}{w_p}$$

Si la parité de n ne nous permet pas de choisir $D_1 = \prod_{p|p} p$ nous isolons

$p_o | p$ et nous prenons $D_1 = \prod_{\substack{p|p \\ p \neq p_o}} p$. Ce choix a l'avantage de réduire la

somme $\sum_{\xi_p \in O}$ aux ordres contenant ξ_p dont le conducteur est une puissance

de p_o . Si p_o^m est la plus grande puissance de p_o divisant le conducteur de l'ordre $R[1, \xi_p]$, la somme $\sum_{\xi_p \in O}$ est effectuée sur les ordres de conducteur

$1, p_o \dots p_o^m$.

On a

$$E_{D_1,1}(O) = 2^{s'_p}$$

où $s'_p = s_p - \varepsilon$, avec:

$$\varepsilon = \begin{cases} 1 & \text{si } p_o \text{ est inerte dans } k(\xi_p) \\ 0 & \text{si } p_o \text{ est ramifié dans } k(\xi_p). \end{cases}$$

On a

$$\sum_{\xi_p \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)} = \frac{h'_p 2^{s'_p}}{w_p} \left[1 + \left(1 + \frac{\varepsilon}{Np_o}\right) (Np_o + \dots Np_o^m) \right]$$

$$= \begin{cases} \frac{h'_p 2^{s'_p}}{w_p(1 - Np_o)} (1 - Np_o^{m+1}) & \text{si } \varepsilon = 0 \\ \frac{h'_p 2^{s'_p}}{w_p(1 - Np_o)} (+2 - Np_o^m - Np_o^{m+1}) & \text{si } \varepsilon = 1. \end{cases}$$

Dans les 2 cas la p -partie fractionnaire de $\sum_{\xi_p \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}$ est celle de $\frac{h'_p 2^{sp}}{w_p(1-Np_o)}$ donc $\frac{1}{\Phi(D_1, 1)} \sum_{\xi_p \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}$ a comme p -partie fractionnaire celle de

$$\frac{h'_p 2^{sp}}{w_p \prod_{p|p} (1-Np)}.$$

Deuxième cas : $p = 2$. Contrairement au cas où p est impair, la somme

$$S = \sum_{\xi_p \in O} E_{D_1, D_2}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}$$

n'est pas 2-entière, mais

$$w(O) = [O^* : R_k^*] = [O^* : W(O) R_k^*] [W(O) R_k^* : R_k^*]$$

$$w(O) = \omega(O) \frac{Q(O)}{2}$$

où $\omega(O)$, $Q(O)$ désignent l'ordre du groupe des racines de l'unité contenues dans O et où $Q(O)$ est l'indice des unités de O (I.5). On a $Q(O) = 1$ ou 2 et $\omega(O) \not\equiv 0 \pmod{4}$ si $\xi_2 \notin O$, donc $2/w(O)$ est 2-entier. Nous obtenons que la 2-partie fractionnaire de $\zeta_k(-1) 2^{3-n}$ est celle de

$$\frac{2}{\Phi(D_1, 1)} \sum_{\xi_2 \in O} E_{D_1,1}(O) \frac{h'(O)}{w(O)}.$$

Les calculs se poursuivent alors de façon analogue au cas p impair.

Si toute unité totalement positive de k est un carré, la somme S est 2-entière, et on obtient en fait la 2-partie fractionnaire de $\zeta_k(-1) 2^{2-n}$.

2. Corps cyclotomique

Nous supposons que k est le sous-corps réel maximal d'un corps cyclotomique. La structure arithmétique de ces corps étant mieux connue, nous pouvons améliorer le théorème général.

Si k est le sous-corps réel maximal du 2^m -ième corps cyclotomique, $m > 2$, toute unité totalement positive étant un carré (théorème de Weber) et le nombre de classes relatif h'_2 étant impair, la 2-partie fractionnaire de $\zeta_k(-1) 2^{2-n}$ est celle de $-h'_2 2^{1-m}$ et l'exposant de 2 dans $\zeta_k(-1)$ est

$n - m - 1 = 2^{m-2} - m - 1$. On peut retrouver ce résultat à l'aide des nombres de Bernoulli [6]. On montre que pour $m \geq 5$, $\zeta_k(-1)$ est entier en 3, donc le nombre de classes relatif de $\mathbf{Q}(\xi_{2^m}, \xi_3)$ est divisible par 3.

Si k est le sous-corps réel maximal du p^m -ème corps cyclotomique (p premier impair), l'indice des unités de $k = \mathbf{Q}(\xi_{p^m} + \xi_{p^m}^{-1})$ dans $\mathbf{Q}(\xi_{p^m})$ est égal à p^m (théorème de Hasse: $Q = 1$) donc la p -partie fractionnaire de $\zeta_k(-1) 2^{2-n}$ est celle de

$$\frac{h'_p}{p^m(1-p)}.$$

Si p est un nombre premier régulier, on sait que h'_p est premier à p (théorème d'Iwasawa), donc l'exposant de p dans $\zeta_k(-1)$ est $-m$.

Si k est le sous-corps réel maximal de N -ème corps cyclotomique où N est un nombre composé, l'indice des unités de $k = \mathbf{Q}(\xi_N + \xi_N^{-1})$ dans $\mathbf{Q}(\xi_N)$ est égal à N ou $2N$ selon que N est pair ou impair (théorème de Hasse, $Q = 2$). On obtient des résultats explicites analogues.

3. Corps quadratique

Nous donnerons dans le chapitre 3 le calcul de l'expression:

$$\sum_0 \frac{w(O) - 1}{2 w(O)} E_{D_1, D_2}(O) h(O)$$

de la proposition 1.3 pour les corps quadratiques réels et nous obtiendrons une formule du nombre de classes d'idéaux

$$H_{D_1, D_2} = \frac{h_k \zeta_k(-1) \Phi_k(D_1, D_2)}{2} + \sum_0 \frac{w(O) - 1}{2 w(O)} E_{D_1, D_2}(O) h(O)$$

dont nous déduirons la partie fractionnaire de $\zeta_k(-1)/2$ en écrivant que $H_{1,1}/h_k$ est un entier. Nous obtiendrons les résultats suivants:

PROPOSITION 2.2. Soit $k = \mathbf{Q}(\sqrt{m})$ un corps quadratique réel et $\zeta_m(-1)$ la valeur au point -1 de sa fonction zêta. On note $h(d)$ le nombre de classes d'idéaux du corps $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$. On a

$$\frac{\zeta_m(-1)}{2} + \alpha(m) \frac{h(-m)}{8} + \beta(m) \frac{h(-3m)}{6} + \gamma(m) \frac{h(n) h(n')}{4} \in \mathbf{Z}$$

avec

$$(22) \quad \alpha(m) = \left\{ \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} -3 \quad m \equiv -2(4) \\ 2 \quad m \equiv 3(8) \\ 0 \quad m \equiv -1(8) \end{array} \right\} \text{ si } Q_2 = 2 \\ \left. \begin{array}{l} 1 \quad m \equiv 1(4) \\ 3 \quad m \equiv 2(4) \\ 2 \quad m \equiv 3(8) \\ 4 \quad m \equiv -1(8) \end{array} \right\} \text{ si } Q_2 = 1 \end{array} \right.$$

$$\beta(m) = \left\{ \begin{array}{l} -1 \quad m' \equiv -1(3) \quad m \equiv -1, 2(4) \\ 0 \quad m' \equiv -1(3) \quad m \equiv 1(4) \\ 1 \quad m' \equiv 1(3) \quad m \equiv 1(8) \\ 2 \quad m' \equiv 1(3) \quad m \equiv 5(8) \\ 3 \quad m' \equiv -1(3) \quad m \equiv 1, 2(8) \end{array} \right.$$

$$\gamma(m) = \left\{ \begin{array}{l} 1 \quad m \not\equiv 0(3) \\ 3 \quad m = 3m' \quad m' \equiv -1(3) \quad \text{si } Q_3 = 1 \\ 5 \quad m = 3m' \quad m' \equiv -1, 2(4) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad n \equiv 1(8) \quad \text{ou } n \equiv n' \equiv 5(8) \\ 1 \quad n \equiv n' \not\equiv 1(4) \\ 2 \quad n \equiv 5(8) \quad \text{mais } n \not\equiv 1, 5(8) \\ 3 \quad n \equiv -1(4) \quad n' \equiv 2(4) \end{array} \right.$$

où Q_2 et Q_3 désignent l'indice des unités de $\mathbf{Q}(\sqrt{-m}, \sqrt{-1})$ et $\mathbf{Q}(\sqrt{-3m}, \sqrt{-3})$, où $\gamma(m)$ est défini lorsque $\varepsilon \geq 0$ et alors $n = 2 - \text{Tr } \varepsilon$ (modulo les carrés) et $nn' = m$ ou $4m$.

Cas particulier: $m = p$ est un nombre premier. La formule précédente, dans ce cas particulier, est

$$p \equiv 1(4) \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} + \frac{h(-p)}{8} \in \mathbf{Z}$$

$$p \equiv 3(8) \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} + \frac{h(-p)}{4} + \frac{h(-2p)}{4} \in \mathbf{Z}$$

$$p \equiv -1(8) \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} + \frac{h(-2p)}{4} \in \mathbf{Z}$$

Les congruences suivantes sont bien connues :

$$p \equiv 3 \pmod{8} \quad h(-2p) \equiv 2 \pmod{4} \quad \text{donc} \quad \frac{h(-2p)}{4} - \frac{h(-p)}{2} \in \mathbf{Z}$$

$$p \equiv -1 \pmod{8} \quad h(-2p) \equiv 0 \pmod{4} \quad \text{donc} \quad \frac{h(-2p)}{4} \in \mathbf{Z}$$

et nous obtenons :

COROLLAIRE 2.1. *Soit p un nombre premier. Les quantités suivantes sont des entiers :*

$$(23) \quad \begin{aligned} p \equiv 1 \pmod{4} & \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} + \frac{h(-p)}{8} \\ p \equiv 3 \pmod{8} & \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} + \frac{3}{4} h(-p) \\ p \equiv -1 \pmod{8} & \quad \frac{\zeta_p(-1)}{2} + \frac{h(-3p)}{6} \end{aligned}$$

Ces nombres représentent la caractéristique d'Euler-Poincaré du groupe modulaire de $k = \mathbf{Q}(\sqrt{p})$ calculée par Hirzebruch [8].

CHAPITRE 3. NOMBRE DE CLASSES D'UN ORDRE D'EICHLER SUR UN CORPS QUADRATIQUE

On explicite la formule (16) du nombre de classes d'idéaux d'un ordre d'Eichler sur un corps quadratique.

Soit m un entier positif et $k = \mathbf{Q}(\sqrt{m})$; on note respectivement R_m , $h(m)$, $\zeta_m(-1)$, $N_m(\cdot)$, l'anneau des entiers, le nombre de classes, la valeur au point -1 de la fonction zêta, la norme absolue du corps $\mathbf{Q}(\sqrt{m})$; soit D_1 un produit d'un nombre pair d'idéaux premiers distincts de $\mathbf{Q}(\sqrt{m})$ et soit D_2 un autre produit d'idéaux premiers distincts de $\mathbf{Q}(\sqrt{m})$, premier à D_1 . Le nombre de classes des ordres d'Eichler sur $\mathbf{Q}(\sqrt{m})$ d'invariant (D_1, D_2) est égal à

$$H = H_m(D_1, D_2) = \frac{h(m) \Phi_m(-1) \zeta_m(D_1, D_2)}{2} +$$